•生物编目•

利用红外相机调查四川卧龙国家级自然保护区鸟兽多样性

施小刚¹ 胡强¹ 李佳琦⁴ 唐卓¹ 杨建¹
李文静¹ 申小莉³ 李晟^{2*}

1 (卧龙国家级自然保护区, 四川汶川 623004)

2 (北京大学生命科学学院, 北京 100871)

3 (中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室, 北京 100093)

4 (环境保护部南京环境科学研究所, 南京 210042)

摘要: 卧龙国家级自然保护区位于邛崃山脉东南坡, 地处邛崃山自然保护区群的核心地带。2014–2016年, 我们在卧龙保护区内使用红外相机技术开展大中型兽类与鸟类的本底调查。经过10,961个相机工作日的调查, 完成有效调查位点83个, 覆盖58个公里网格。共鉴定出分属6目15科的32种野生兽类和4种家畜, 探测数总计2,095次, 其中国家一、二级重点保护野生动物分别有5、11种, 被IUCN红色名录评估为濒危(EN)、易危(VU)、近危(NT)的动物分别有4、6、4种。野生兽类中, 食肉目物种数最多, 共6科16种, 其次为偶蹄目(4科8种)和啮齿目(2科5种)。偶蹄目是有效拍摄数最多的类群(占总探测数的63.33%), 其次为食肉目(20.01%)和啮齿目(5.73%)。食肉目中相对多度最高的物种是猪獾(*Arctonyx collaris*, RAI = 12.23), 偶蹄目中最高的物种是毛冠鹿(*Elaphodus cephalophus*, RAI = 32.21)。记录到雪豹(*Panthera uncia*)、狼(*Canis lupus*)、豺(*Cuon alpinus*) 3种大中型顶级食肉兽类。鸟类探测数655次, 鉴定出分属5目18科的59种鸟类, 其中国家一、二级重点保护野生动物分别有3、9种, 保护区新记录鸟类4种。鸡形目是探测数最高的类群, 占全部鸟类探测数的56.76%。本次调查了解了区内兽类和鸟类的物种组成、空间分布和相对多度, 提供了区内大中型兽类和鸟类群落的初步本底信息, 为后续的保护管理规划和长期监测提供了数据支持和指导。

关键词: 卧龙国家级自然保护区; 邛崃山; 生物多样性编目; 红外相机; 野生动物监测

Camera-trapping surveys of the mammal and bird diversity in Wolong National Nature Reserve, Sichuan Province

Xiaogang Shi¹, Qiang Hu¹, Jiaqi Li⁴, Zhuo Tang¹, Jian Yang¹, Wenjing Li¹, Xiaoli Shen³, Sheng Li^{2*}

1 Wolong National Nature Reserve, Wenchuan, Sichuan 623004

2 School of Life Sciences, Peking University, Beijing 100871

3 State Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093

4 Nanjing Institute of Environmental Sciences, Ministry of Environmental Protection, Nanjing 210042

Abstract: Wolong National Nature Reserve is the core nature reserve in the reserve network found in the Qionglai Mountains. Between 2014 and 2016, we conducted a baseline survey in Wolong on large fauna using camera-trapping. After an extensive survey effort comprised of 10,961 camera-days from 83 camera stations in 58 survey blocks (1 km × 1 km each), we recorded 32 wild and 4 domestic mammal species (belonging to 6 orders and 15 families) with 2,095 detections. Five and eleven mammals were listed as Class I and Class II Nationally Protected Wildlife, respectively, and 4, 6, and 4 species were listed as EN, VU, and NT species, respectively, according to the IUCN Red List. Among the recorded wild mammals, Carnivora was

收稿日期: 2017-06-29; 接受日期: 2017-10-09

基金项目: 中国科学院西南生物多样性评估与产业开发策略(Y5213G1001)和环境保护部多样性保护专项(MM-2016-026)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: shengli@pku.edu.cn

the order with the greatest species richness (16 from 6 families), followed by Artiodactyla (8 from 4 families) and Rodentia (5 from 2 families), whereas Artiodactyla was the order with greatest detection (accounting for 63.33% of all mammal detections), followed by Carnivora (20.01%) and Rodentia (5.73%). The most detected species in Carnivora was the hog badger (*Arctonyx collaris*, RAI = 12.23), and tufted deer (*Elaphodus cephalophus*, RAI = 32.21) in Artiodactyla. Three large apex carnivores were detected in Wolong, including snow leopard (*Panthera uncia*), wolf (*Canis lupus*) and dhole (*Cuon alpinus*). We recorded 59 bird species (belonging to 5 orders and 18 families) with a total detection of 655, including 4 newly recorded species in the reserve. Pheasants (Galliformes) had the highest detection of bird groups and accounted for 56.76% of all bird detections. Our results provide basic information on the community structure, spatial distribution and relative abundance of terrestrial wild mammals and birds in Wolong, which provide support and guidelines for reserve management and long-term monitoring of Wolong.

Key words: Wolong National Nature Reserve; Qionglai Mountains; biodiversity inventory; camera-trapping; wildlife monitoring

中国是世界上兽类和鸟类多样性最高、同时也是受威胁最严重的国家之一(蒋志刚等, 2015; 马克平, 2015)。自然保护区是保护珍稀濒危物种和关键生态系统的重要基础, 甚至是一些珍稀濒危物种和生态系统最后的避难所。自然保护区网络是开展生物多样性调查与监测的重要基础之一, 基于自然保护区网络的调查与监测, 可提供我国生物多样性分布与现状的基本信息, 为区域性和全国性生物多样性保护策略的制定奠定基础。20 世纪 90 年代中期以来, 红外相机调查技术在自然保护区的兽类野外研究与监测中得到了广泛应用(李勤等, 2013; 李晟等, 2014)。由于红外相机技术具有能够在野外持续工作、不惊扰动物等优点, 非常适合用于记录活动隐秘、数量稀少的物种(李晟等, 2014)。近年来, 众多自然保护区使用新一代红外相机调查技术和设备, 开展了大量的鸟兽本底调查, 为区域性生物多样性编目和全国尺度的生物多样性监测提供了大量高精度的一手数据(李晟等, 2014)。

卧龙国家级自然保护区地处成都平原西缘、邛崃山脉东南坡, 是以保护大熊猫(*Ailuropoda melanoleuca*)等珍稀野生动物及高山森林生态系统为主的综合性自然保护区, 位于大熊猫栖息地世界自然遗产地的中心区域。保护区始建于 1963 年, 是我国建立最早的以保护大熊猫、四川羚牛(*Budorcas tibetanus*)、川金丝猴(*Rhinopithecus roxellana*)及其森林生态系统为主的综合性保护区之一。1975 年经国务院批准, 保护区由原来的 200 km² 扩展为 2,000 km²。保护区内动植物资源丰富, 有较高的兽类和鸟类多样性。历史文献记录显示, 卧龙保护区分布有兽类 103 种(邓其祥等, 1992), 鸟类 281 种, 其中雉类 11

种(余志伟等, 1992)。李晟等于 2005–2007 年间, 在卧龙首次尝试将红外相机用于大熊猫及其伴生动物的调查, 记录到 24 种兽类和 21 种鸟类, 其中雉类 6 种(Li et al, 2010a, b, 2012); 随后唐卓等(2017a, b)在卧龙保护区开展了一些小规模红外相机专项调查, 例如对雪豹(*Panthera uncia*)与绿尾虹雉(*Lophophorus lhuysii*)的初步研究。在卧龙有历史分布记录的众多野生动物中, 有部分物种已经多年未见有确凿的野外记录。为了进一步掌握保护区内现有兽类与鸟类多样性及空间分布, 我们通过系统性布设红外相机获得了大中型兽类和鸟类的分布数据与本底信息, 为后续的保护管理规划、长期监测和科研项目提供科学依据。

1 研究方法

1.1 研究区域

四川卧龙国家级自然保护区位于 102°52'–103°24' E, 30°45'–31°25' N, 东西长 52 km, 南北宽 62 km, 区内最低海拔 1,150 m, 最高海拔 6,250 m, 相对高差达 5,100 m。由于北、西、南三面环山, 山体高大, 高差悬殊, 阻止了冬季南下的气流, 而夏季湿润的东南季风可以从东部进入而停留, 带来了丰富的降水。年平均气温 8.9℃, 年均降水量 888.0 mm, 丰水期在 5–10 月, 枯水期在 11 月至次年 4 月, 洪峰期多在 7–8 月。

保护区内植被随海拔的上升表现出明显的垂直分带。从低海拔河谷到高海拔山脊, 区内的植被带依次为常绿阔叶林带(海拔 1,600 m 以下)、常绿落叶阔叶混交林带(1,600–2,000 m)、针阔混交林带(2,000–2,600 m)、针叶林带(2,600–3,800 m)、高山灌

从草甸带(3,800–4,400 m)和高山流石滩稀疏植被带(4,400–5,000 m)。

卧龙保护区分为皮条河、正河、中河、西河 4 个片区,受道路条件、后勤和人员限制,本项调查主要集中在皮条河片区,涵盖其他 3 个片区的部分区域。调查范围覆盖保护区内所有的植被类型。

1.2 方案设计

调查方案设计依照四川省《野生动物红外相机监测技术规程》(DB51/T22872016)。根据卧龙自然保护区边界,使用 GIS 生成覆盖全区的 1 km × 1 km 的标准网格阵列,以这些网格作为野外调查单元。每个网格中设置 1–2 个红外相机调查位点。同一周期布设的调查位点间距不小于 300 m,同一方格内不同时间布设的调查位点间距不小于 100 m。

在每个调查位点上放置 1 台被动式红外触发数码相机(易安卫士 L710 或猎科 Ltl Acorn 6210)。相机设置为每次触发后连续拍摄 3 张数码照片和 1 段视频。红外相机由野外工作人员根据地形、动物活动痕迹等实地情况选择,通常设置在有动物活动痕迹的兽径旁,固定在距离地面 40–60 cm 高的树干或岩石上。在相机前方 1–2 m 处布撒气味引诱剂(Carman's Magna-Glan Lure, PA, USA),以期让动物从相机前方经过时减缓速度或稍作停留,降低红外相机的漏拍率。记录各调查位点的经纬度坐标、植被类型、地形地貌、林灌结构等小生境信息。

每个调查位点上的相机工作周期一般为 3–4 个月。由于自然原因的限制,某些调查位点上的调查周期适当延长。在每个调查周期结束时,更换电池和存储卡,把相机移动到下一个随机选出的调查方格内。如果随机选出的方格由于地形或后勤原因难以到达,则放弃此方格。

1.3 数据分析

将红外相机拍摄到的照片和视频根据拍摄对象归为以下 7 类:兽类、鸟类、家畜、工作人员、其他人员、空白、其他。使用 Microsoft Access 录入和管理数据。野外调查收回的数据由专职工作人员进行汇总与核对,并对调查位点按照时间先后顺序进行统一编号。使用 Bio-Photo (V2.1)软件对红外相机拍摄的照片进行批量处理,自动提取其中的拍摄日期、时间等信息,并按照统一格式对照片进行系统重命名,批量导入 Access 数据库。对于所有动物记录,由专业人员进行物种识别与鉴定,将鉴定

结果录入数据库,最后由动物分类专家进行审核。

单台红外相机在野外持续工作 24 h 记为 1 个相机日。使用相对多度指数(relative abundance index, RAI)评估动物相对种群数量(李勤等, 2013; 李晟等, 2014), 计算方法为:

$$RAI = (\text{有效探测数} / \text{总有效相机工作日}) \times 1,000$$

其中,有效探测的定义如下:(1)单个位点上红外相机拍摄到某物种就记为对此物种的 1 次有效探测;(2)从拍摄到此物种的第一张照片开始,之后 30 min 内这个位点上连续拍摄到的相同物种(不管是否相同个体)的照片都算作同一次探测;(3)探测数与单张照片或单次探测中拍摄到的动物个体数量无关。

野外调查工作于 2014–2016 年进行。共布设调查位点 102 个,覆盖 65 个 1 km × 1 km 方格。其中,19 个调查位点由于红外相机故障或丢失而没有获得有效数据。共完成有效调查位点 83 个,有效调查方格 58 个,覆盖海拔范围为 1,400–4,600 m (图 1)。

2 调查结果

在 58 个有效调查方格内,共完成 10,961 个相机日的调查工作量,单个位点平均有效工作日 132 天。拍摄到野生兽类照片与视频 10,738 份,有效探测数 2,029 次(含不能识别到具体物种或目、科单元的记录);家畜照片与视频 1,142 份,有效探测数 66 次;鸟类照片与视频 3,119 份,有效探测数 655 次(含不能识别到具体物种或目、科单元的记录)。

2.1 兽类物种多样性与组成

在红外相机记录到的有效照片与视频中,共记录到分属 7 目 17 科的兽类(附录 1)。其中,野生兽类 32 种,家畜 4 种(家狗、家羊、家牛、家马),分属 6 目 15 科。其余未能鉴定出具体物种的兽类记录多为小型翼手目、食虫目和啮齿目动物。

在记录到的 32 种野生兽类中,食肉目物种最多,共 6 科 16 种;其次为偶蹄目(共 4 科 8 种)和啮齿目(2 科 5 种);其他还包括灵长目 1 科 2 种和兔形目 1 科 1 种。就有效探测数而言,偶蹄目是红外相机记录到次数最多的类群(1,304 次),占可鉴定野生兽类总探测数的 63.33%,其次是食肉目(412 次, 20.01%)和啮齿目(118 次, 5.73%),这 3 个类群兽类合计探测数占总探测数的 89.07% (附录 1)。

这 32 种野生兽类中,被列为国家一级重点保

图 1 卧龙国家级自然保护区 2014–2016 年红外相机调查的公里网格

Fig. 1 Surveyed 1 km × 1 km blocks in the Wolong National Nature Reserve (NR) using camera-trapping in 2014–2016.

护野生动物的有 5 种, 分别是川金丝猴、大熊猫、雪豹、林麝(*Moschus berezovskii*)与四川羚牛; 被列为国家二级重点保护野生动物的有 11 种, 分别是藏酋猴(*Macaca thibetana*)、黑熊(*Ursus thibetanus*)、黄喉貂(*Martes flavigula*)、石貂(*M. foina*)、狼(*Canis lupus*)、豺(*Cuon alpinus*)、小熊猫(*Ailurus fulgens*)、水鹿(*Rusa unicolor*)、岩羊(*Pseudois nayaur*)、中华斑羚(*Naemorhedus griseus*)和中华鬣羚(*Capricornis milneedwardsii*)。在 IUCN 物种红色名录 (<http://www.iucnredlist.org/>) 中, 被评估为濒危(EN)的有 4 种, 分别是川金丝猴、豺、小熊猫和林麝; 被评估为易危(VU)的有 6 种, 分别是大熊猫、黑熊、雪豹、水鹿、四川羚牛和中华斑羚; 被评估为近危(NT)的有 4 种, 分别是藏酋猴、香鼬(*Mustela altaica*)、毛冠鹿(*Elaphodus cephalophus*)和中华鬣羚。

食肉目和偶蹄目是本次调查记录到的野生兽类中相对多度最高的 2 个类群。在食肉目中, 相对多度指数最高的是猪獾(*Arctonyx collaris*, RAI = 12.23), 其次是黄喉貂(RAI = 6.48)和花面狸(*Paguma larvata*)(RAI = 5.84); 相对多度指数最低的是狼(RAI = 0.09)和鼬獾(*Melogale moschata*, RAI = 0.09), 均仅在 1 个位点上记录到 1 次。在偶蹄目中, 相对多度指数最高的是毛冠鹿(RAI = 32.21), 其次是水鹿(RAI = 27.46)和中华斑羚(RAI = 23.90); 相对多度指数最低的是林麝(RAI = 3.47)。

2.2 鸟类物种多样性与组成

共鉴定出鸟类 59 种, 分属 5 目 18 科(附录 1)。其余未能鉴定出具体物种的鸟类记录大多为体型较小的雀形目鸟类。

在记录到的鸟类物种中, 鸡形目探测数比例最高(357 次), 占鸟类总探测数的 56.76%; 雀形目为记录到物种数最高的类群(43 种), 占鸟类总物种数的 72.88%。在科的水平上, 雉科为探测数比例最高的类群(357 次), 占鸟类总探测数的 56.76%, 鸨科为记录到物种数最高的类群(13 种), 占鸟类总物种数的 22.03%。

在这些鸟类物种中, 被列为国家一级重点保护野生动物的有 3 种, 分别是雉鹑(*Tetraophasis obscurus*)、绿尾虹雉、金雕(*Aquila chrysaetos*), 国家二级重点保护野生动物有 9 种, 分别是血雉(*Ithaginis cruentus*)、红腹角雉(*Tragopan temminckii*)、勺鸡(*Pucrasia macrolopha*)、藏雪鸡(*Tetraogallus tibetanus*)、白马鸡(*Crossoptilon crossoptilon*)、白腹锦鸡(*Chrysolophus amherstiae*)、红腹锦鸡(*C. pictus*)、鹰雕(*Spizaetus nipalensis*)和雀鹰(*Accipiter nisus*)。在 IUCN 物种红色名录中, 被评为易危(VU)的鸟类有 1 种, 为绿尾虹雉; 被评估为近危(NT)的鸟类有 1 种, 为白马鸡; 其余鸟类均被评估为无危(LC)。其中, 白腹锦鸡、鹰雕、蓝短翅鸨(*Brachypteryx montana*)与光背地鸨(*Zoothera mollissima*)为卧龙自然保护区鸟类新记录。

鸡形目是本次调查记录到的鸟类中相对多度最高的类群, 其中相对多度最高的物种是红腹角雉(RAI = 10.95), 其次为血雉(RAI = 7.57)与雪鹑(*Lerwa lerwa*, RAI = 5.20); 相对多度最低的物种是白腹锦鸡(RAI = 0.18)。

3 讨论

本次调查中共记录到野生兽类 32 种, 分属 5 目 14 科。经查阅国内正式发表的利用红外相机调查兽类多样性的论文, 在单个保护区尺度上, 本次调查是记录到野生兽类物种数量最高的一次。这一结果表明卧龙保护区内兽类物种多样性水平较高。尤其值得关注的是, 本次调查中共记录到处于食物链顶端、以肉食为主的 3 种大中型食肉动物, 即雪豹、狼、豺。大中型食肉兽类可以通过捕食来调控处于较低营养级的食草动物种群, 进而间接对植被的结构和更新产生影响; 其存在与否和数量多少可以作为整个生态系统健康程度的快速评价指标。本次调查结果显示, 在卧龙保护区内, 有蹄类动物的种类和数量非常丰富, 可以为当地的大型食肉动物种群提供充足的猎物来源。以上结果显示出卧龙整个生态系统的食物链结构处于较为完整和相对健康的状态。自保护区建立以来, 卧龙主要以大熊猫为保护管理的旗舰物种, 并以此为导向投入了大量的保护资源。本研究所显示的卧龙较为完整与健康的生态系统和食物链结构, 应是部分得益于保护区长期以来的保护投入, 间接显示出大熊猫作为生态系统“伞护种”的效力。

从大尺度的生物进化历史来看, 大中型食肉动物本身就是容易受到绝灭威胁的动物类群(Cardillo et al, 2005); 从较小的时间和空间尺度来看, 这些森林生态系统中的大中型食肉动物一般具有活动范围大、种群密度低的特点, 因此相对于其他类群的大中型兽类来说, 对于人类活动的压力(包括猎捕压力和人类生产生活造成的栖息地丧失、片断化)更为敏感, 通常是面对这些威胁时生态系统中最先消失的组成元素(Ripple et al, 2014)。同时, 人类饲养的家畜、宠物所携带的病毒、细菌等病原体的传入, 对于已经处在片断化栖息地中、没有免疫力的食肉动物种群来说往往也是严重甚至致命的威胁。本次调查中虽然记录到 3 种大中型食肉动物, 但各物种的相对多度均较低, 其中豺只在 2 个位点有记录, 狼仅在 1 个位点记录到 1 次。考虑到卧龙保护区为整个邛崃山系内面积最大、保护历史最长、栖息地质量最优的保护区, 这些结果表明, 卧龙保护区内乃至整个邛崃山系的大中型食肉动物的种群数量和密度均可能处于较低水平。长期以来的人为

偷猎压力, 以及由于这些食肉动物捕食家畜而引起的报复性猎杀, 可能是导致其种群快速下降的主要原因。从生物多样性和生态系统保护的角度来说, 大中型食肉兽类种群及其生态功能的恢复和重建应当是我们保护管理工作的一个长期目标。

红外相机调查技术适合于记录地栖性的大中型兽类和鸟类, 而对非地栖的和体型较小的兽类(例如食虫目、翼手目和大部分啮齿目物种)与鸟类来说则不是一种有效的调查手段(李晟等, 2014)。在本研究区域, 食肉目、偶蹄目兽类和鸡形目鸟类是其主要的适用类群。与卧龙保护区历史记录的兽类与鸟类名录(邓其祥等, 1992; 余志伟等, 1992)相比, 本次调查缺失的物种包括 9 种食肉目兽类, 即狗獾(*Meles leucurus*)、大灵猫(*Viverra zibetha*)、小灵猫(*Viverricula indica*)、豹(*Panthera pardus*)、云豹(*Neofelis nebulosa*)、猞猁(*Lynx lynx*)、金猫(*Catopuma temminckii*)、兔狲(*Otocolobus manul*)、藏狐(*Vulpes ferrilata*), 4 种偶蹄目兽类, 即马麝(*Moschus chrysogaster*)、小麝(*Moschus moschiferus*)、白唇鹿(*Cervus albirostris*)、马鹿(*Cervus elaphus*)。本次调查所记录到的鸡形目白腹锦鸡为保护区新记录种, 而在历史记录的 12 种鸡形目鸟类中, 本次调查记录到其中 9 种, 缺失斑尾榛鸡(*Bonasa sewerzowi*)、蓝马鸡(*Crossoptilon auritum*)和雉鸡(*Phasianus colchicus*)。其中雉鸡主要分布在保护区低海拔范围的农-林交错生境中, 未在此次调查所覆盖的生境类型中。一些缺失物种, 如马麝, 由于自然原因(适宜栖息地面积较小)或外在原因(麝类承受较大偷猎压力), 在卧龙范围的种群密度非常低, 因此被红外相机记录到的概率非常小; 另一些缺失物种, 如兔狲、猞猁、白唇鹿, 记录可能来自于空间尺度较粗糙的早期文献记载; 随着过去数十年间自然环境与人类活动强度发生的巨大变化, 部分物种, 尤其是一些食肉目物种, 如豹、云豹、金猫, 历史上确实在保护区内有分布, 但野生种群现在可能已经从本区域消失(区域性绝灭), 或仅残存极少数个体(功能性绝灭)。但同时需要考虑到, 本次调查中设置的红外相机调查位点对保护区内的空间区域、海拔范围、生境类型的覆盖仍较为有限, 且大多均为人类相对容易到达的区域, 所记录到的数据可能难以全面反映保护区食肉目、偶蹄目兽类和鸡形目鸟类的物种组成和空间分布。综上, 非常有必要建立覆盖保护区全区

及周边的系统监测体系,依据最新的调查数据,对保护区的动物名录及时进行动态更新,以反映区内野生动物多样性的真实现状。

致谢: 本项目得到卧龙国家级自然保护区管理局的大力支持和帮助。北京大学、中国科学院植物研究所、环境保护部南京环境科学研究所为本项目提供了资金与设备支持。卧龙自然保护区的曾永兵、杨文刚、金国志、明强、林红强、王茂麟、苏晓龙、周刚、秦伟光、张亮、张涛等参加了野外数据收集,谨此一并致谢!

参考文献

- Cardillo M, Mace GM, Jones KE, Bielby J, Bininda-Emonds ORP, Sechrest W, Orme CDL, Purvis A (2005) Multiple causes of high extinction risk in large mammal species. *Science*, 309, 1239–1241.
- Deng QX, Yu ZW, Wu Y, Li HC, Qu MC (1992) Mammals of Wolong Nature Reserve. In: *The Resources and Conservation of Fauna and Flora in Wolong Nature Reserve* (ed. Zhang KW), pp. 195–209. Sichuan Science and Technology Press, Chengdu. (in Chinese) [邓其祥, 余志伟, 吴毅, 李洪成, 瞿明成 (1992) 卧龙自然保护区的兽类. 见: 卧龙自然保护区动植物资源及保护 (张科文主编), 195–209页. 四川科学技术出版社, 成都.]
- Jiang ZG, Ma Y, Wu Y, Wang YX, Zhou KY, Feng ZJ, Liu SY, Luo ZH, Li CW (2015) China's mammalian diversity. *Biodiversity Science*, 23, 351–364. (in Chinese with English abstract) [蒋志刚, 马勇, 吴毅, 王应祥, 周开亚, 冯祚建, 刘少英, 罗振华, 李春旺 (2015) 中国哺乳动物多样性. *生物多样性*, 23, 351–364.]
- Li Q, Wu JG, Kou XJ, Feng LM (2013) Applications of camera trap in wildlife population ecology. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 24, 947–955. (in Chinese with English abstract) [李勤, 邬建国, 寇晓军, 冯利民 (2013) 相机陷阱在野生动物种群生态学中的应用. *应用生态学报*, 24, 947–955.]
- Li S, McShea WJ, Wang DJ, Shao LK, Shi XG (2010a) The use of infrared-triggered cameras for surveying phasianids in Sichuan Province, China. *IBIS*, 152, 299–309.
- Li S, McShea WJ, Wang DJ, Lu Z, Gu XD (2012) Gauging the impact of management expertise on the distribution of large mammals across protected areas. *Diversity and Distributions*, 18, 1166–1176.
- Li S, Wang DJ, Lu Z, McShea WJ (2010b) Cats living with pandas: the status of wild felids within giant panda range, China. *Cat News*, 52, 20–23.
- Li S, Wang DJ, Xiao ZS, Li XH, Wang TM, Feng LM, Wang Y (2014) Camera-trapping in wildlife research and conservation in China: review and outlook. *Biodiversity Science*, 22, 685–695. (in Chinese with English abstract) [李晟, 王大军, 肖治术, 李欣海, 王天明, 冯利民, 王云 (2014) 红外相机技术在我国野生动物研究与保护中的应用与前景. *生物多样性*, 22, 685–695.]
- Ma KP (2015) Species catalogue of China: a remarkable achievement in the field of biodiversity science in China. *Biodiversity Science*, 23, 137–138. (in Chinese) [马克平 (2015) 中国生物多样性编目取得重要进展. *生物多样性*, 23, 137–138.]
- Ripple WJ, Estes JA, Beschta RL, Wilmers CC, Ritchie EG, Hebblewhite M, Berger J, Elmhagen B, Letnic M, Nelson MP, Schmitz OJ, Smith DW, Wallach AD, Wirsing AJ (2014) Status and ecological effects of the world's largest carnivores. *Science*, 343, 151.
- Tang Z, Yang J, Liu XH, Wang PY, Li ZY (2017a) Research on snow leopard (*Panthera unica*) using camera-trapping in Wolong National Nature Reserve, China. *Biodiversity Science*, 25, 62–70. (in Chinese with English abstract) [唐卓, 杨建, 刘雪华, 王鹏彦, 李周园 (2017a) 基于红外相机技术对四川卧龙国家级自然保护区雪豹(*Panthera uncia*)的研究. *生物多样性*, 25, 62–70.]
- Tang Z, Yang J, Liu XH, Wang PY, Li ZY, Liu CS (2017b) Activity pattern of *Lophophorus lhuysii* by camera-trapping in Wolong National Nature Reserve, China. *Sichuan Journal of Zoology*, 36, 582–587. (in Chinese with English abstract) [唐卓, 杨建, 刘雪华, 王鹏彦, 李周园, Liu Cheng Simon (2017b) 利用红外相机研究卧龙国家级自然保护区绿尾虹雉的活动规律. *四川动物*, 36, 582–587.]
- Yu ZW, Deng QX, Li HC, Wang PY (1992) Birds of Wolong Nature Reserve. In: *The Resources and Conservation of Fauna and Flora in Wolong Nature Reserve* (ed. Zhang KW), pp. 245–268. Sichuan Science and Technology Press, Chengdu. (in Chinese) [余志伟, 邓其祥, 李洪成, 王培勇 (1992) 卧龙自然保护区的鸟类区系研究. 见: 卧龙自然保护区动植物资源及保护 (张科文主编), 245–268页. 四川科学技术出版社, 成都.]

(责任编辑: 丁平 责任编辑: 闫文杰)

附录 Supplementary Material

附录1 卧龙国家级自然保护区2014–2016年红外相机调查记录到的兽类与鸟类物种

Appendix 1 Mammal and bird species detected during the camera-trapping survey in Wolong National Nature Reserve, Sichuan Province, 2014–2016

<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2017193-1.pdf>

施小刚, 胡强, 李佳琦, 唐卓, 杨建, 李文静, 申小莉, 李晟. 利用红外相机调查四川卧龙国家级自然保护区
鸟兽多样性. 生物多样性, 2017, 25 (10): 1131–1136.

<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2017193>

附录 1 卧龙国家级自然保护区 2014–2016 年红外相机调查记录到的兽类与鸟类物种

Appendix 1 Mammal and bird species detected during the camera-trapping survey in Wolong
National Nature Reserve, Sichuan Province, 2014–2016

物种 Species	国家保护级 别 National protected category	IUCN 级 别 IUCN Red List category	探测数 No. of detectio ns	记录网格数 No. of detected 1km ² blocks	相对多度指数 RAI
兽类 Mammals					
(一)翼手目 Chiroptera					
(1)蝙蝠科 Vespertilionidae					
蝙蝠 Bat [*]			1		0.09
(二)兔形目 Lagomorpha					
(2)鼠兔科 Ochotonidae					
1. 藏鼠兔 <i>Ochotona thibetana</i>		LC	109	6	9.94
(三)灵长目 Primates					
(3)猴科 Cercopithecidae					
2. 川金丝猴 <i>Rhinopithecus roxellana</i>	一级	EN	13	5	1.19
3. 藏酋猴 <i>Macaca thibetana</i>	二级	NT	14	4	1.28
(四)啮齿目 Rodentia					
(4)鼠科 Muridae					
鼠 Rat			35	9	3.19
(5)松鼠科 Sciuridae					
4. 岩松鼠 <i>Sciurotamias davidianus</i>		LC	48	12	4.38
5. 珀氏长吻松鼠 <i>Dremomys pernyi</i>		LC	2	1	0.18
6. 隐纹花鼠 <i>Tamias swinhoei</i>		LC	3	3	0.27
7. 喜马拉雅旱獭 <i>Marmota himalayana</i>		LC	28	5	2.55
(6)豪猪科 Hystricidae					
8. 中国豪猪 <i>Hystrix hodgsoni</i>		LC	37	11	3.38
(五)食肉目 Carnivora					
(7)熊科 Ursidae					
9. 大熊猫 <i>Ailuropoda melanoleuca</i>	一级	VU	28	9	2.55
10. 黑熊 <i>Ursus thibetanus</i>	二级	VU	6	5	0.55
(8)灵猫科 Viverridae					
11. 花面狸 <i>Paguma larvata</i>		LC	64	7	5.84
(9)鼬科 Mustelidae					
12. 猪獾 <i>Arctonyx collaris</i>		LC	134	24	12.23
13. 鼬獾 <i>Melogale moschata</i>		LC	1	1	0.09
14. 黄喉貂 <i>Martes flavigula</i>	二级	LC	71	14	6.48
15. 黄鼬 <i>Mustela sibirica</i>		LC	27	9	2.46
16. 香鼬 <i>Mustela altaica</i>		NT	14	6	1.28
17. 伶鼬 <i>Mustela nivalis</i>		LC	2	1	0.18
18. 石貂 <i>Martes foina</i>	二级	LC	12	3	1.09
(10)猫科 Felidae					
19. 雪豹 <i>Panthera uncia</i>	一级	VU	13	6	1.19
20. 豹猫 <i>Prionailurus bengalensis</i>		LC	23	12	2.10
(11)犬科 Canidae					

施小刚, 胡强, 李佳琦, 唐卓, 杨建, 李文静, 申小莉, 李晟. 利用红外相机调查四川卧龙国家级自然保护区
 鸟兽多样性. 生物多样性, 2017, 25 (10): 1131–1136.

<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2017193>

21. 狼 <i>Canis lupus</i>	二级	LC	1	1	0.09
22. 豺 <i>Cuon alpinus</i>	二级	EN	4	3	0.36
23. 赤狐 <i>Vulpes vulpes</i>		LC	12	7	1.09
24. 家狗 Domestic dog	—	—	1	1	0.09
(12)小熊猫科 Ailuridae					
25. 小熊猫 <i>Ailurus fulgens</i>	二级	EN	23	7	2.10
(六)偶蹄目 Artiodactyla					
(13)猪科 Suidae					
26. 野猪 <i>Sus scrofa</i>		LC	92	25	8.39
(14)鹿科 Cervidae					
27. 毛冠鹿 <i>Elaphodus cephalophus</i>		NT	353	36	32.21
28. 水鹿 <i>Rusa unicolor</i>	二级	VU	301	30	27.46
(15)麝科 Moschidae					
29. 林麝 <i>Moschus berezovskii</i>	一级	EN	38	3	3.47
(16)牛科 Bovidae					
30. 四川羚牛 <i>Budorcas tibetanus</i>	一级	VU	54	14	4.93
31. 中华斑羚 <i>Naemorhedus griseus</i>	二级	VU	262	29	23.90
32. 中华鬣羚 <i>Capricornis milneedwardsii</i>	二级	NT	49	20	4.47
33. 岩羊 <i>Pseudois nayaur</i>	二级	LC	155	10	14.14
34. 家羊 Domestic goat/sheep	—	—	16	5	1.46
35. 家牛 Domestic cow/yak	—	—	45	7	4.11
(七)奇蹄目 Perissodactyla					
(17)马科 Equidae					
36. 家马 Domestic horse	—	—	4	1	0.36
兽类总计 Mammal total			2,095	58	

鸟类 Birds

(一)鸡形目 Galliformes

(1)雉科 Phasianidae

1. 雪鹑 <i>Lerwa lerwa</i>		LC	57	8	5.20
2. 雉鹑 <i>Tetraophasis obscurus</i>	一级	LC	18	7	1.64
3. 藏雪鸡 <i>Tetraogallus tibetanus</i>	二级	LC	7	1	0.64
4. 血雉 <i>Ithaginis cruentus</i>	二级	LC	83	13	7.57
5. 绿尾虹雉 <i>Lophophorus lhuysii</i>	一级	VU	37	10	3.38
6. 白马鸡 <i>Crossoptilon crossoptilon</i>	二级	NT	15	2	1.37
7. 红腹角雉 <i>Tragopan temminckii</i>	二级	LC	120	20	10.95
8. 勺鸡 <i>Pucrasia macrolopha</i>	二级	LC	14	4	1.28
9. 红腹锦鸡 <i>Chrysolophus pictus</i>	二级	LC	4	1	0.36
10. 白腹锦鸡 <i>Chrysolophus amherstiae</i>	二级	LC	2	2	0.18

(二)隼形目 Falconiformes

(2)鹰科 Accipitridae

11. 金雕 <i>Aquila chrysaetos</i>	一级	LC	3	1	0.27
12. 鹰雕 <i>Spizaetus nipalensis</i>	二级	LC	1	1	0.09
13. 雀鹰 <i>Accipiter nisus</i>	二级	LC	1	1	0.09

(三)鸻形目 Charadriiformes

施小刚, 胡强, 李佳琦, 唐卓, 杨建, 李文静, 申小莉, 李晟. 利用红外相机调查四川卧龙国家级自然保护区
鸟兽多样性. 生物多样性, 2017, 25 (10): 1131–1136.

<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2017193>

(3) 鹞科 Scolopacidae				
14. 丘鹞 <i>Scolopax rusticola</i>	LC	1	1	0.09
(四) 鸢形目 Piciformes				
(5) 啄木鸟科 Picidae				
15. 赤胸啄木鸟 <i>Dendrocopos cathpharius</i>	LC	1	1	0.09
16. 黄颈 啄木鸟 <i>Dendrocopos darjellensis</i>	LC	2	2	0.18
(五) 雀形目 Passeriformes				
(6) 鹨科 Motacillidae				
17. 粉红胸鹨 <i>Anthus roseatus</i>	LC	1	1	0.09
(7) 鸺科 Sittidae				
18. 白脸鸺 <i>Sitta leucopsis</i>	LC	1	1	0.09
(8) 伯劳科 Laniidae				
19. 灰背伯劳 <i>Lanius tephronotus</i>	LC	1	1	0.09
(9) 鸦科 Corvidae				
20. 红嘴蓝鸦 <i>Urocissa erythrorhyncha</i>	LC	1	1	0.09
21. 星鸦 <i>Nucifraga caryocatactes</i>	LC	2	2	0.18
22. 大嘴乌鸦 <i>Corvus macrorhynchos</i>	LC	1	1	0.09
23. 红嘴山鸦 <i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	LC	1	1	0.09
(10) 岩鹨科 Prunellidae				
24. 棕胸岩鹨 <i>Prunella strophiata</i>	LC	4	4	0.36
25. 褐岩鹨 <i>Prunella fulvescens</i>	LC	1	1	0.09
26. 领岩鹨 <i>Prunella collaris</i>	LC	19	6	1.73
(11) 鹪鹩科 Troglodytidae				
27. 鹪鹩 <i>Troglodytes troglodytes</i>	LC	3	2	0.27
(12) 鸫科 Turdidae				
28. 蓝短翅鸫 <i>Brachypteryx montana</i>	LC	1	1	0.09
29. 紫啸鸫 <i>Myophonus caeruleus</i>	LC	33	5	3.01
30. 长尾地鸫 <i>Zoothera dixonii</i>	LC	36	8	3.28
31. 光背地鸫 <i>Zoothera mollissima</i>	LC	9	4	0.82
32. 灰头鸫 <i>Turdus rubrocanus</i>	LC	4	4	0.36
33. 棕背黑头鸫 <i>Turdus kessleri</i>	LC	6	3	0.55
34. 金色林鸫 <i>Tarsiger chrysaeus</i>	LC	2	1	0.18
35. 白眉林鸫 <i>Tarsiger indicus</i>	LC	1	1	0.09
36. 蓝额红尾鸫 <i>Phoenicurus frontalis</i>	LC	30	7	2.74
37. 赭红尾鸫 <i>Phoenicurus ochruros</i>	LC	5	2	0.46
38. 红胁蓝尾鸫 <i>Tarsiger cyanurus</i>	LC	8	6	0.73
(13) 鹎科 Muscicapidae				
39. 方尾鹎 <i>Culicicapa ceylonensis</i>	LC	1	1	0.09
40. 棕腹大仙鹎 <i>Niltava davidi</i>	LC	1	1	0.09
(14) 画眉科 Timaliidae				
41. 大噪鹛 <i>Garrulax maximus</i>	LC	24	6	2.19
42. 斑背噪鹛 <i>Garrulax lunulatus</i>	LC	3	2	0.27

施小刚, 胡强, 李佳琦, 唐卓, 杨建, 李文静, 申小莉, 李晟. 利用红外相机调查四川卧龙国家级自然保护区
鸟兽多样性. 生物多样性, 2017, 25 (10): 1131–1136.

<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2017193>

43. 丽色噪鹛 <i>Garrulax formosus</i>	LC	4	4	0.36
44. 眼纹噪鹛 <i>Garrulax ocellatus</i>	LC	9	5	0.82
45. 橙翅噪鹛 <i>Garrulax elliotii</i>	LC	7	4	0.64
46. 黑顶噪鹛 <i>Garrulax affinis</i>	LC	12	7	1.09
47. 褐头雀鹛 <i>Alcippe cinereiceps</i>	LC	2	1	0.18
48. 灰眶雀鹛 <i>Alcippe morrisonia</i>	LC	1	1	0.09
(15) 鸦雀科 Paradoxornithidae				
49. 红嘴鸦雀 <i>Conostoma oemodium</i>	LC	6	4	0.55
50. 三趾鸦雀 <i>Paradoxornis paradoxus</i>	LC	1	1	0.09
51. 黄额鸦雀 <i>Paradoxornis fulvifrons</i>	LC	1	1	0.09
(17) 山雀科 Paridae				
52. 黑冠山雀 <i>Parus rubidiventris</i>	LC	1	1	0.09
(18) 燕雀科 Fringillidae				
53. 暗胸朱雀 <i>Carpodacus nipalensis</i>	LC	1	1	0.09
54. 白眉朱雀 <i>Carpodacus thura</i>	LC	12	4	1.09
55. 酒红朱雀 <i>Carpodacus vinaceus</i>	LC	1	1	0.09
56. 斑翅朱雀 <i>Carpodacus trifasciatus</i>	LC	1	1	0.09
57. 拟大朱雀 <i>Carpodacus rubicilloides</i>	LC	1	1	0.09
58. 白斑翅拟蜡嘴雀 <i>Mycerobas</i> <i>carnipes</i>	LC	3	2	0.27
59. 林岭雀 <i>Leucosticte nemoricola</i>	LC	1	1	0.09
不能识别鸟类 Unidentified birds	—	26	—	—
鸟类总计 Bird total		655	58	

* 不能鉴定出具体物种的记录, 使用此类群的英文名称。下同。