•红外相机观测专栏•

利用红外相机技术对安徽省鹞落坪国家级自然保护区大中型兽类及林下鸟类的调查

周磊¹ 万雅琼² 洪欣¹ 张恒¹ 钱立富¹ 王陈成¹
孔政¹ 赵凯³ 李佳琦^{2*} 张保卫^{1*}

1 (安徽大学生命科学学院, 合肥 230601)

2 (生态环境部南京环境科学研究所, 南京 210042)

3 (安庆师范大学资源与环境学院, 安徽安庆 246011)

摘要: 鹞落坪国家级自然保护区位于大别山脉南麓的核心地带。2014–2017年, 作者采用红外相机技术对鹞落坪国家级自然保护区的大中型兽类及林下鸟类进行调查。研究共布设了72个相机位点, 累计完成16,658个相机工作日, 获得独立有效照片2,142张, 共记录野生兽类9种、鸟类15种, 隶属8目15科。包括国家一级重点保护野生动物1种, 即安徽麝(*Moschus anhuiensis*), 国家二级重点保护野生动物2种, 分别是勺鸡(*Pucrasia macrolopha*)和白冠长尾雉(*Syrnaticus reevesii*)。相对多度排名前五的兽类分别为小鹿(*Muntiacus reevesi*)、野猪(*Sus scrofa*)、赤腹松鼠(*Callosciurus erythraeus*)、猪獾(*Arctonyx collaris*)和岩松鼠(*Sciurotamias davidianus*)。相对多度排名前五的鸟类为白冠长尾雉、勺鸡、松鸦(*Garrulus glandarius*)、灰背鸫(*Turdus hortulorum*)、红嘴蓝鹊(*Urocissa erythroryncha*)。此外红外相机还拍摄到大量人类活动照片, 表明当地人类活动较为严重, 应加强管理。本研究初步了解了保护区内大中型兽类和林下鸟类群落信息及人类活动的干扰情况, 为保护区未来的保护和管理提供了数据基础。

关键词: 鹞落坪国家级自然保护区; 红外相机技术; 兽类; 鸟类; 生物多样性

Camera-trapping surveys of the large and medium-sized mammal and understory bird diversity in Yaoluoping National Nature Reserve, Anhui Province

Lei Zhou¹, Yaqiong Wan², Xin Hong¹, Heng Zhang¹, Lifu Qian¹, Chencheng Wang¹, Zheng Kong¹, Kai Zhao³, Jiaqi Li^{2*}, Baowei Zhang^{1*}

1 School of Life Science, Anhui University, Hefei 230601

2 Nanjing Institute of Environmental Sciences, Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, Nanjing 210042

3 College of Resources and Environment Sciences, Anqing Normal University, Anqing, Anhui 246011

Abstract: Yaoluoping National Nature Reserve is located on the southern slope of the Dabie Mountains. To describe the diversity of large and medium-sized mammal and understory bird diversity in Yaoluoping National Nature Reserve, from 2014 to 2017 a baseline survey was conducted using a camera-trapping approach. Over 16,658 camera trapping days at 72 camera locations, 2,142 usable images were obtained. Nine mammal species and 15 bird species were identified, belonging to 8 orders and 15 families. One species, *Moschus anhuiensis*, is listed as national first-class protected wild animal, whereas two species, *Pucrasia macrolopha* and *Syrnaticus reevesii*, were listed as national second-class protected wild animals. The top five mammals in relative abundance were *Muntiacus reevesi*, *Sus scrofa*, *Callosciurus erythraeus*, *Arctonyx collaris* and *Sciurotamias davidianus*, and the top five birds in relative abundance were *S. reevesii*, *P. macrolopha*, *Garrulus glandarius*, *Turdus hortulorum* and *Urocissa erythroryncha*. We also found evidence of intensive human activities in the reserve, which may have potential impacts on wildlife. This

收稿日期: 2018-06-13; 接受日期: 2018-09-21

基金项目: 国家重点研发计划(2016YFC1200700)和环境保护部南京环境科学研究所基本科研业务专项(GYZX170308)

* 共同通讯作者 Co-authors for correspondence. E-mail: zhangbw@ahu.edu.cn, lijiaqihao@163.com

study provides basic information on the species composition of terrestrial mammals and understory birds in Yaoluoping National Nature Reserve; it will form the foundation of future monitoring research and will provide data information to wildlife management and protection efforts.

Key words: Yaoluoping National Nature Reserve; camera-trapping; mammal; bird; biodiversity

鹞落坪国家级自然保护区(以下简称鹞落坪保护区)位于安徽省岳西县西北部(30°57'–31°06' N, 116°02'–116°11' E), 地处大别山脉南坡。保护区总面积123.0 km², 其中核心区21.2 km², 缓冲区28.4 km², 实验区73.4 km²。属北亚热带季风气候, 空气湿润, 气温较低, 雨量充沛, 年均气温15℃左右, 年均降水量为1,400–2,000 mm (李珍等, 2008)。保护区的主要植被类型随海拔而变化, 从低到高依次生长有灌木和次生林(400–1,000 m)、落叶林(800–1,100 m)、针阔混交林(900–1,200 m)、针叶林(1,200 m 以上) (王松等, 2009)。

近年来对鹞落坪保护区的研究共报道鸟类113种(刘彬等, 2009; 李莉等, 2017)。但是对该区域兽类的研究一直未见报道。由于近年来鹞落坪保护区及周边区域生态旅游等活动日益频繁, 加之当地社区居民的其他经济活动, 对野生动物带来的潜在影响不断增加。为了解该保护区动物资源现状, 我们利用红外相机在此开展了为期4年的野生动物调查与监测, 以期获得大中型兽类和林下鸟类资源现状的第一手资料, 为保护区大中型兽类的管理和保护提供重要的数据基础。

1 研究方法

基于对鹞落坪保护区的长期观察, 根据所掌握的保护区内野生动物空间分布信息, 我们选择野生动物活动比较频繁的区域, 将红外相机按3 km × 3 km公里网格布设。根据保护区实际地形地貌特征和人类活动情况等, 每个网格布设1–3台红外相机。样方内布设多台相机时, 相机间隔250 m以上。为了提

高拍摄率, 将相机布设在动物频繁活动的区域, 如山脊、兽径、水源地和动物夜宿地等小生境, 尽量回避人类经常活动的区域。红外相机一般固定在树干上, 距离地面0.5–1.0 m, 镜头与地面保持平行, 拍摄区域避免阳光直射。相机工作模式设置为连拍3张, 拍摄时间间隔为15 s, 全天监测。

2014–2017年, 先后三次在鹞落坪保护区内布设红外相机(表1)。2014–2016年的秋冬季布设红外相机(SG-007型) 20台, 其中核心区内布设了16台, 缓冲区1台, 实验区3台(图1)。2016年8–10月, 在保护区内野生动物活动的高发区域另布设红外相机12台(SG-007型)。2016年12月又在整个保护区范围内增加了40台红外相机(LTL-6210型)(2016.12–2017.12) (图1, 表1)。

回收照片后, 按相机编号建立文件夹, 导入相应相机所拍摄的照片, 筛选出有物种信息的独立有效照片, 确定物种信息和干扰信息等。有效照片的鉴定采用O'Brien等(2003)提出的独立有效照片标准: 即同一相机所拍摄的同一种在相隔30 min以上的照片确定为独立有效照片。鸟类物种的鉴定参考《中国鸟类野外手册》(约翰·马敬能等, 2000), 兽类参考《安徽兽类志》(王岐山, 1990)和《中国兽类野外手册》(Smith和解焱, 2009), 物种名称和分类系统分别参考《中国鸟类分类与分布名录(第2版)》(郑光美, 2011)和《中国哺乳动物多样性》(蒋志刚等, 2015)。物种保护级别及其他相关信息分别参考《国家重点保护野生动物名录》(<http://www.forestry.gov.cn>)、CITES 附录 (<http://www.cites.gov.cn/>) 和 IUCN红色名录(IUCN, 2016)。

表1 安徽鹞落坪国家级自然保护区红外相机布设次数和时间
Table 1 Camera-trapping numbers and times in Yaoluoping National Nature Reserve, Anhui Province

	相机型号 Camera type	数量 Number	监测时间 Monitoring time	海拔范围 Altitude range (m)
第一次 The first time	SG-007	20	2014.11–2015.1 2015.11–2016.1 2016.12–2017.2	1,101–1,407
第二次 The second time	SG-007	12	2016.8–2016.10	621–1,358
第三次 The third time	LTL-6210	40	2016.12–2017.12	425–1,622

图1 安徽鹞落坪国家级自然保护区红外相机放置位点图

Fig. 1 Camera-trapping locations in Yaoluoping National Nature Reserve, Anhui Province

采用相对多度指数(relative abundance index, RAI)(O'Brien et al, 2003; 肖治术等, 2014)评估物种的相对种群数量。计算公式为: $RAI = P_j / N \times 100$, 其中, P_j 代表第 j 类($j = 1, 2, \dots, 24$)动物出现的独立有效照片数, N 为总有效相机工作日。

2 结果

2014–2017年先后布设72个相机位点, 除去人为干扰和恶劣天气等因素导致未能正常工作的相机位点6个, 共有66个相机位点正常工作, 累计监测16,658个相机工作日, 共获得独立有效照片2,142张, 其中兽类照片1,428张(占总数的66.7%), 鸟类照片206张(9.6%), 人类和家畜活动照片218张(10.2%), 未能鉴定出物种的照片290张(13.5%), 其中多为啮齿目和食虫目的小型兽类, 以及部分雀形目的鸟类。研究中共鉴定物种28种, 隶属8目18科, 其中兽类4目10科13种, 鸟类4目8科15种(附录1, 附

录2, 附录3)。

鉴定出的兽类物种中包括4种家畜。9种野生兽类中, 偶蹄目和食肉目各3种, 啮齿目2种, 兔形目1种。偶蹄目独立有效照片数最多(924张), 其次是啮齿目(284张), 兔形目最少(72张)。安徽麝(*Moschus anhuiensis*)为大别山特有种, 是国家一级重点保护野生动物, 在IUCN红色名录中被评估为“濒危(EN)”级, 猪獾(*Arctonyx collaris*)和果子狸(*Paguma larvata*)被列为“近危(NT)”, 而其余兽类均为“无危(LC)”。相对多度指数最高的5种兽类依次为小鹿(*Muntiacus reevesi*)、野猪(*Sus scrofa*)、赤腹松鼠(*Callosciurus erythraeus*)、猪獾和岩松鼠(*Sciurotamias davidianus*)。它们同时也是相机位点出现率排名前五的物种。

鉴定出的鸟类物种中, 雀形目的物种最多, 共5科10种。雀形目(100张)和鸡形目(92张)的独立有效照片数接近, 分别占鸟类独立有效照片总数的

图2 红外相机所记录物种数随相机工作日的累计曲线

Fig. 2 Accumulative curve of species number with increasing camera trap days

48.5%和44.7%。白冠长尾雉(*Syrnaticus reevesii*)和勺鸡(*Pucrasia macrolopha*)为国家二级重点保护野生动物;在IUCN红色名录中,白冠长尾雉被列为“易危(VU)”,其他14种鸟类均为“无危(LC)”。相对多度指数最高的前5种鸟类依次为白冠长尾雉、勺鸡、松鸦(*Garrulus glandarius*)、灰背鸫(*Turdus hortulorum*)、红嘴蓝鹊(*Urocissa erythrorhyncha*),而相机位点出现率最高的鸟类依次为勺鸡、白冠长尾雉、红嘴蓝鹊、松鸦和画眉(*Garrulax canorus*)。

根据物种累计曲线中捕获物种数与有效相机日之间的关系,物种数量随着相机日的增加而快速增加,在第62个相机日后增速开始减缓,而在280个相机日后物种数不再增加(图2)。

3 讨论

据《安徽兽类志》记载,大别山区共分布有肉食动物10种,即狼(*Canis lupus*)、赤狐(*Vulpes vulpes*)、豺(*Cuon alpinus*)、貉(*Nyctereutes procyonoides*)、黄喉貂(*Martes flavigula*)、小灵猫(*Viverricula indica*)、食蟹獾(*Herpestes urva*)、豹(*Panthera pardus*)、豹猫(*Prionailurus bengalensis*)、黄鼬(*Mustela sibirica*)。而本研究仅发现了体型最小的黄鼬,未发现其他大、中型食肉动物。根据本课题组和其他研究人员对此区域的长期野外调查,以及对保护区工作人员和当地社区居民的走访,大别山地区的兽类在过去几十年间发生了巨大变化,这些大中型兽类在该地区可能已经灭绝,或种群数量处于极低水平。小鹿和野猪目前是鹞落坪保护区中兽类的优势物种,相对多度指数最高,且超过75%的相机位点

(分别为81.8%和77.3%)都拍摄到它们。安徽麝是大别山区特有的濒危兽类,本研究在两个相机位点上拍摄到3张安徽麝的独立有效照片,证实了在大别山南麓依然有安徽麝种群存在,但其独立有效照片数量尚不到小鹿的1%,说明其种群处于非常低的水平,建议保护区加大对这一物种的保护力度。

研究中拍摄到鸟类4目15种,均在近期对鹞落坪保护区鸟类报道的范围之内(刘彬等, 2009; 李莉等, 2017)。本研究中发现的鸟类数较少,主要原因是红外相机适合拍摄林下活动的地栖性鸟类,如鸡形目、雀形目的鸫科、鸦科等类群,而对活动于林间和林冠的鸟类则难以记录(Tobler et al, 2009)。其次,本研究相机布设位置多选择兽类偏好的栖息环境(山脊、兽径、水源地、夜宿地等),而非鸟类偏好的栖息地。另外,研究中红外相机的拍摄时间侧重于秋冬季,对春夏季活动的鸟类记录不足,也是导致鸟类拍摄种类较少的一个原因。

由于保护区内的林场多归当地社区居民所有,加之近年来游客渐多,鹞落坪保护区的人为干扰相对较强,调查中拍摄到185张人类活动的照片(附录1)。另外,保护区还发现有家养动物的活动(附录1),牛、羊等圈养动物散养取食野生植物,与野生偶蹄类食草动物在生存空间及食物资源上产生直接竞争,可能会侵占有蹄类动物的营养生态位(初红军等, 2008),不利于区域内濒危物种(安徽麝)的保护;同时,家犬和猫可能对保护区的啮齿类、食虫类和鸟类带来威胁。另外,家养动物进入保护区可能会传播疫病(洪起平等, 2007),增加疾病传播潜在风险。因此,如何尽可能减少当地社区居民和家畜对野生动物的影响,值得研究者进一步深入研究。

致谢: 本研究得到了鹞落坪国家级自然保护区管理局和安庆师范大学资源环境学院师生的无私帮助,在此一并致谢!

参考文献

- Chu HJ, Jiang ZG, Lan WX, Wang C, Tao YS, Jiang F (2008) Dietary overlap among kulan *Equus hemionus*, goitered gazelle *Gazella subgutturosa* and livestock. *Acta Zoologica Sinica*, 54, 941–954. (in Chinese with English abstract) [初红军, 蒋志刚, 兰文旭, 王臣, 陶永善, 蒋峰 (2008) 蒙古野驴、鹅喉羚和家畜的食物重叠. *动物学报*, 54, 941–954.]

- Hong QP, Ding P, Ding BY (2007) Investigation and Research of Natural Resources in Fengyang Mountain. China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese) [洪起平, 丁平, 丁炳扬 (2007) 凤阳山自然资源考察与研究. 中国林业出版社, 北京.]
- IUCN (2016) The IUCN Red List of Threatened Species, Version 2015-4. <http://www.iucnredlist.org>. (accessed on 2016-07-25)
- Jiang ZG, Ma Y, Wu Y, Wang YX, Feng ZJ, Zhou KY, Liu SY, Luo ZH, Li CW (2015) China's mammalian diversity. *Biodiversity Science*, 23, 351–364. (in Chinese with English abstract) [蒋志刚, 马勇, 吴毅, 王应祥, 冯祚建, 周开亚, 刘少英, 罗振华, 李春旺 (2015) 中国哺乳动物多样性. 生物多样性, 23, 351–364.]
- Li L, Cui P, Xu HG, Wan YQ, Yong F, Hou YX, Ma HH, Yu L (2017) A comparative study of bird species diversity in breeding season at Anhui Yaoluoping National Nature Reserve. *Chinese Journal of Wildlife*, 38, 52–62. (in Chinese with English abstract) [李莉, 崔鹏, 徐海根, 万雅琼, 雍凡, 侯银续, 马号号, 虞磊 (2017) 安徽鹞落坪繁殖季节鸟类物种组成比较研究. 野生动物学报, 38, 52–62.]
- Li Z, Zhou ZZ, Wang WG, Shen SB (2008) The floristic analysis of vascular plants in Yaoluoping Nature Reserve from Anhui Province. *Journal of Biology*, 25(6), 26–30. (in Chinese with English abstract) [李珍, 周忠泽, 汪文革, 沈三宝 (2008) 安徽鹞落坪自然保护区维管植物区系分析. 生物学杂志, 25(6), 26–30.]
- Liu B, Zhou LZ, Wang WG, Shen SB, Han DM (2009) Seasonal dynamics of the avian guild structure of mountain secondary forest in Dabieshan Mountain. *Zoological Research*, 30, 277–287. (in Chinese with English abstract) [刘彬, 周立志, 汪文革, 沈三宝, 韩德明 (2009) 大别山山地次生林鸟类群落集团结构的季节变化. 动物学研究, 30, 277–287.]
- MacKinnon J, Phillipps K, He FQ (2000) A Field Guide to the Birds of China. Hunan Education Publishing House, Changsha. (in Chinese) [约翰·马敬能, 卡伦·菲利普斯, 何芬奇 (2000) 中国鸟类野外手册. 湖南教育出版社, 长沙.]
- O'Brien TG, Kinnaird MF, Wibisono HT (2003) Crouching tigers, hidden prey: Sumatran tiger and prey populations in a tropical forest landscape. *Animal Conservation*, 6, 131–139.
- Smith AT, Xie Y (2009) A Guide to the Mammals of China. Hunan Education Press, Changsha. (in Chinese) [Smith AT, 解焱 (2009) 中国兽类野外手册. 湖南教育出版社, 长沙.]
- Tobler MW, Carrillo-Percastegui SE, Powell G (2009) Habitat use, activity patterns and use of mineral licks by five species of ungulate in south-eastern Peru. *Journal of Tropical Ecology*, 25, 261–270.
- Wang QS (1990) The Mammal Fauna of Anhui. Anhui Science and Technology Publishing House, Hefei. (in Chinese) [王岐山 (1990) 安徽兽类志. 安徽科学技术出版社, 合肥.]
- Wang S, Bao FY, Mei BM, Ding SC (2009) Vertical distribution and community diversity of butterflies in Yaoluoping National Nature Reserve, Anhui, China. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 20, 2262–2270. (in Chinese with English abstract) [王松, 鲍方印, 梅百茂, 丁仕超 (2009) 安徽鹞落坪国家级自然保护区蝶类的垂直分布及其群落多样性. 应用生态学报, 20, 2262–2270.]
- Xiao ZS, Hu L, Wang X, Shang T, Zhu DH, Zhao ZL, Huang XQ (2014) Wildlife diversity after Wenchuan Earthquake: A case from Guangguangshan Valley of Longxi-Hongkou National Nature Reserve, Southwest China. *Biodiversity Science*, 22, 794–797. (in Chinese) [肖治术, 胡力, 王翔, 尚涛, 朱大海, 赵志龙, 黄小群 (2014) 汶川地震后鸟兽资源现状: 以都江堰光光山峡谷区为例. 生物多样性, 22, 794–797.]
- Zheng GM (2011) A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China, 2nd edn. Science Press, Beijing. (in Chinese) [郑光美 (2011) 中国鸟类分类与分布名录, 第2版. 科学出版社, 北京.]

(责任编辑: 蒋学龙 责任编辑: 闫文杰)

附录 Supplementary Material

附录1 利用红外相机在鹞落坪国家级自然保护区拍摄到的兽类和鸟类名录

Appendix 1 List of mammals and birds recorded by camera-trapping in Yaoluoping National Nature Reserve
<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2018166-1.pdf>

附录2 鹞落坪国家级自然保护区红外相机拍摄的重要兽类和鸟类照片

Appendix 2 Important mammals and birds recorded by camera-trapping in the Yaoluoping National Nature Reserve
<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2018166-2.pdf>

附录3 鹞落坪国家级自然保护区红外相机拍摄的野生兽类和鸟类物种坐标记录

Appendix 3 Coordinate record of wild mammals and birds recorded by camera-trapping in the Yaoluoping National Nature Reserve
<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2018166-3.xlsx>

周磊, 万雅琼, 洪欣, 张恒, 钱立富, 王陈成, 孔政, 赵凯, 李佳琦, 张保卫. 利用红外相机技术对安徽省鹞落坪国家级自然保护区大中型兽类及林下鸟类的调查. 生物多样性, 2018, 26 (12): 1338–1342.

附录1 利用红外相机在鹞落坪国家级自然保护区拍摄到的兽类和鸟类名录

物种 Species	独立有效照 片数 No. of independent photos	拍摄位点数量 No. of sites					相对多度指数 Relative abundance index				保护级别 Protection category			
哺乳纲 MAMMALIA														
食肉目 Carnivora														
I 鼬科 Mustelidae														
1. 黄鼬 <i>Mustela sibirica</i>	8	3	(2	0	1)	0.048	(0.117	0	0.04)	LC				
2. 猪獾 <i>Arctonyx collaris</i>	121	21	(7	2	12)	0.726	(0.728	1.499	0.562)	NT				
II 灵猫科 Viverridae														
3. 果子狸 <i>Paguma larvata</i>	19	8	(2	1	5)	0.114	(0.056	0.136	0.129)	NT				
鲸偶蹄目 Cetartiodactyla														
III 猪科 Suidae														
4. 野猪 <i>Sus scrofa</i>	403	51	(14	10	27)	2.409	(4.522	6.26	1.569)	LC				
IV 鹿科 Cervidae														
5. 小麂 <i>Muntiacus reevesi</i>	518	54	(15	10	29)	3.109	(2.837	6.812	2.968)	LC				
V 麝科 Moschidae														
6. 安徽麝 <i>Moschus anhuiensis</i>	3	2	(1	0	1)	0.024	(0.842	0	0.008)	I	EN	Appendix II		
啮齿目 Rodentia														
VI 松鼠科 Sciuridae														
7. 赤腹松鼠 <i>Callosciurus erythraeus</i>	190	30	(12	0	18)	1.141	(1.854	0	1.001)	LC				
8. 岩松鼠 <i>Sciurotamias davidianus</i>	94	13	(7	0	6)	0.564	(1.516	0	0.348)	LC				
兔形目 Lagomorpha														

周磊, 万雅琼, 洪欣, 张恒, 钱立富, 王陈成, 孔政, 赵凯, 李佳琦, 张保卫. 利用红外相机技术对安徽省鹞落坪国家级自然保护区大中型兽类及林下鸟类的调查. 生物多样性, 2018, 26 (12): 1338–1342.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2018166>

物种 Species	独立有效照 片数 No. of independent photos	拍摄位点数量 No. of sites				相对多度指数 Relative abundance index				保护级别 Protection category
VII 兔科 Leporidae										
9. 蒙古兔 <i>Lepus tolai</i>	72	11	(5	0	6)	0.432	(1.126	0	0.259)	LC
鸟纲 AVES										
鸽形目 Columbiformes										
I 鸽鸠科 Columbidae										
1. 山斑鸠 <i>Streptopelia orientalis</i>	13	4	(0	0	4)	0.078	(0	0	0.105)	LC
雀形目 Passeriformes										
II 鸫科 Turdidae										
2. 虎斑地鸫 <i>Zoothera dauma</i>	10	6	(3	0	3)	0.060	(0.14	0	0.04)	LC
3. 灰背鸫 <i>Turdus hortulorum</i>	18	2	(0	0	2)	0.108	(0	0	0.146)	LC
4. 斑鸫 <i>Turdus eunomus</i>	1	1	(1	0	0)	0.006	(0.028	0	0)	LC
5. 紫啸鸫 <i>Myophonus caeruleus</i>	2	1	(0	0	1)	0.012	(0	0	0.056)	LC
III 鹟科 Muscipida										
6. 红胁蓝尾鸫 <i>Tarsiger cyanurus</i>	1	1	(1	0	0)	0.006	(0.028	0	0)	LC
IV 山雀科 Paridae										
7. 大山雀 <i>Parus major</i>	6	2	(0	0	2)	0.036	(0	0	0.049)	LC
V 鸦科 Corvidae										
8. 红嘴蓝鹊 <i>Urocissa erythroryncha</i>	14	11	(3	0	8)	0.084	(0.084	0	0.089)	LC
9. 松鸦 <i>Garrulus glandarius</i>	32	9	(7	0	2)	0.192	(0.787	0	0.032)	LC
VI 画眉科 Timaliidae										
10. 棕颈钩嘴鹛 <i>Poma torhinus ruficollis</i>	1	1	(0	0	1)	0.006	(0	0	0.008)	LC

周磊, 万雅琼, 洪欣, 张恒, 钱立富, 王陈成, 孔政, 赵凯, 李佳琦, 张保卫. 利用红外相机技术对安徽省鹞落坪国家级自然保护区大中型兽类及林下鸟类的调查. 生物多样性, 2018, 26 (12): 1338–1342.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2018166>

物种 Species	独立有效照 片数 No. of independent photos	拍摄位点数量 No. of sites				相对多度指数 Relative abundance index				保护级别 Protection category	
11. 画眉 <i>Garrulax canorus</i>	15	7	(6	0	1)	0.090	(0.356	0	0.016)	LC	
鸛形目 Piciformes											
VII 啄木鸟科 Picidae											
12. 灰头绿啄木鸟 <i>Picus canus</i>	1	1	(0	0	1)	0.006	(0	0	0.016)	LC	
鸡形目 Galliformes											
VIII 雉科 Phasianidae											
13. 环颈雉 <i>Phasianus colchicus</i>	1	1	(0	0	1)	0.006	(0	0	0.016)	LC	
14. 勺鸡 <i>Pucrasia macrolopha</i>	32	15	(7	0	8)	0.192	(0.337	0	0.129)	II	LC
15. 白冠长尾雉 <i>Syrnaticus reevesii</i>	59	10	(0	3	7)	0.354	(0	0.817	0.429)	II	VU
其他 Others											
人 Human	185										
家犬 Dog	1										
家猫 Cat	12										
家羊 Goat	18										
家牛 Cow	2										

括号内数字分别为第 1, 2, 3 次的数据。

Numbers in brackets are data of the first, second, third time

I, II 分别代表 I、II 级重点保护野生动物; LC, EN, VU 和 NT 分别代表 IUCN 红色名录中的无危, 濒危, 易危和近危; Appendix II 代表 CITES 附录 II 物种。
I and II, first Class and second Class National Key Protected Animals. LC, Least Concern; EN, Endangered; VU, Vulnerable; NT, Near Threatened. Appendix II, CITES Appendix II.

周磊, 万雅琼, 洪欣, 张恒, 钱立富, 王陈成, 孔政, 赵凯, 李佳琦, 张保卫. 利用红外相机技术对安徽省鹞落坪国家级自然保护区大中型兽类及林下鸟类的调查. 生物多样性, 2018, 26 (12): 1338–1342.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2018166>

安徽麝 *Moschus anhuiensis*

野猪 *Sus scrofa*

小鹿 *Muntiacus reevesi*

猪獾 *Arctonyx collaris*

白冠长尾雉 *Syrmaticus reevesii*

勺鸡 *Pucrasia macrolopha*

附录2 鹞落坪国家级自然保护区红外相机拍摄的重要兽类和鸟类照片

Appendix 2 Important mammals and birds recorded by camera-trapping in the Yaoluoping National Nature Reserve