• 研究报告 •

青岛崂山湾人工鱼礁区底层游泳动物群落结构特征

刘鸿雁 杨超杰 张沛东 李文涛 杨晓龙 张秀梅*

(中国海洋大学海水养殖教育部重点实验室, 山东青岛 266003)

摘要: 基于2015年5月至2016年1月在青岛崂山湾人工鱼礁区的调查数据, 采用Margalef种类丰富度指数(d)、Shannon-Wiener多样性指数(H')、Pielou均匀度指数(J)、丰度/生物量曲线、等级聚类分析、SIMPER相似性百分比分析和非度量多维尺度排序(NMDS)分析, 对底层游泳动物群落结构和多样性进行研究。调查期间共捕获游泳动物61种, 隶属34科, 其中鱼类36种, 甲壳类22种, 头足类3种。优势种为日本鳎(*Charybdis japonica*)、许氏平鲉(*Sebastes schlegelii*)、大泷六线鱼(*Hexagrammus otakii*)、斑头鱼(*H. agrammus*)和星康吉鳗(*Conger myriaster*), 其中日本鳎(26.91%)和许氏平鲉(26.74%)的生物量占绝对优势。礁区游泳动物的渔获量和渔获种类数均多于对照区, 月平均单位捕捞努力量渔获量(CPUE)最高值出现在5月, 达到 $735.74 \pm 316.59 \text{ g} \cdot \text{net}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 。游泳动物群落组成的特征值上, 7、8月的多样性指数较高, 但鱼礁区和对照区无显著差异($P > 0.05$)。丰度/生物量曲线表明, 5、6月游泳动物群落处于严重受干扰状态, 11月和次年1月群落处于相对稳定状态。聚类分析表明, 除1月外, 各月份不同区域的样方相似性都较高, 5、6月三亩前礁区的相似性最高, 达到86.21%。

关键词: 人工鱼礁; 游泳动物群落结构; 多样性; 丰度/生物量曲线; 崂山湾

Demersal nekton community structure of artificial reef zones in Laoshan Bay, Qingdao

Hongyan Liu, Chaojie Yang, Peidong Zhang, Wentao Li, Xiaolong Yang, Xiumei Zhang*

Key Laboratory of Mariculture, Ministry of Education, Ocean University of China, Qingdao, Shandong 266003

Abstract: A field survey of the artificial reef and the control zones in Laoshan Bay, Shandong Province was performed from May 2015 to January 2016. We analyzed the community structure and biodiversity of demersal nekton by using Margalef's species richness index, Shannon-Wiener diversity index, Pielou's evenness index, abundance-biomass comparison curves, clustering analysis, SIMPER (similarity percentage) analysis, and Non-metric Multi Dimensional Scaling (NMDS). A total number of 61 species of nekton belonging to 34 families were captured during the surveys, including 36 species of fish, 22 species of crustaceans and 3 species of cephalopods. *Charybdis japonica*, *Sebastes schlegelii*, *Hexagrammus otakii*, *H. agrammus* and *Conger myriaster* were the dominant species, of which *C. japonica* and *S. schlegelii* were the dominant species by weight (26.91% and 26.74%, respectively). The highest monthly mean catch per unit effort (CPUE) in the investigated zones appeared in May 2015, and reached up to $735.74 \text{ g} \cdot \text{net}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$. It was noted that the diversity indices were higher in July and August, but there were no significant differences in community structure parameters between the artificial reef and the control zones ($P > 0.05$). The abundance-biomass curves (ABC) of the nekton community indicated that the community was seriously disturbed in May and June 2015, but was stable by November 2015 and January 2016. Cluster analysis showed that similarities were high in different months and different zones, except January 2016, and the highest similarity appeared in the artificial reef of the Sanmuqian zone between May and June 2015, when it reached 86.21%.

收稿日期: 2016-04-25; 接受日期: 2016-07-19

基金项目: 国家海洋公益性行业科研专项(201405010; 201305043)和国家自然科学基金(31572227)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: gaozhang@ouc.edu.cn

Key words: artificial reef; nekton community structure; diversity; abundance-biomass comparison curves; Laoshan Bay

青岛崂山湾鱼类产卵场修复区位于黄山头至崂山头之间的近岸水域, 该区域湾岸陡峭, 曾经海藻繁茂, 是鱼、虾洄游的必经之路, 也是近岸岩礁性鱼类的重要产卵场。为开展海参、鲍鱼等资源增殖与保护, 2006–2014年间该海域进行了大规模人工鱼礁投放工作。人工鱼礁是指利用鱼类等海洋生物的趋性(如趋触性、趋流性等), 为了聚集鱼类和其他海洋生物而在海域中设置的人工构造物(Rounsefell, 1972)。人工鱼礁能够在投放海域产生上升流、涡流等多种流态, 底质中的一些营养物质进入水体, 从而使水体中的营养盐得到补充、优化, 促进饵料生物的生长、繁殖, 最终通过生物链的传递来影响渔业资源(陈勇等, 2002; 林军和章守宇, 2006; 周艳波等, 2011)。崂山湾海域水体环境优良, 栖息地结构复杂, 人工鱼礁的投放进一步提高了海区空间异质性, 随着礁体附着生物群落的逐步形成, 使得该海域成为游泳动物优良的栖息和繁殖场所。近年来, 有关崂山湾及其邻近海域的研究主要涉及底栖大型海藻(唐衍力等, 2012)、浮游植物(王欣等, 2014)、鱼类群落的摄食生态(张波等, 2015)以及一些放流种的增殖效果评价(梅春等, 2010; 袁伟等, 2015)等, 而有关人工鱼礁区底层游泳动物群落结构特征及多样性的研究尚未见报道。游泳动物在海洋生态系统中处于较高层次, 海域游泳动物群落结构的研究在海洋生态学、渔业生产以及渔业管理等方面具有重要意义(李凡等, 2013)。

本研究以青岛崂山湾岩礁性鱼类产卵场综合修复示范区的人工鱼礁区和对照区为研究区域, 通过对底层游泳动物群落和主要环境因子的监测, 分析鱼礁区和对照区底层游泳动物群落的结构特征和多样性, 旨在探索人工鱼礁的投放对海域生物资源组成的影响, 为系统全面地评价人工鱼礁的生态功能及其对渔业资源的修复效果提供参考依据。

1 材料和方法

1.1 取样地点

青岛崂山湾产卵场修复示范区(36°08.49′–36°10.02′ N, 120°41.32′–120°42.99′ E)由黄山口、三

亩前和列坡3个海区组成, 2006年开始建礁, 2014年春建设完毕, 共计投石3.2万空方, 形成礁区5处, 面积39.7 ha。

本研究设置的取样点如图1所示, 从北向南划分为黄山口礁区(H区)、对照区(C区)和三亩前礁区(S区)3个区域, 每个区域设置4个取样点。

1.2 样品采集与分析

2015年5–11月和2016年1月使用地笼网采集游泳动物。地笼网规格: 中间部位为21个25 cm × 40 cm的钢筋框, 两端为2个20 cm × 30 cm的钢筋框, 钢筋框间距为25 cm, 进鱼口纵深20 cm, 网目规格18 mm。每5个地笼网连接构成一个网笼单元(全长30 m), 每个取样点设置1个网笼单元。地笼网与岸基平行放置, 放置时间为3天左右。在实验室内对所采集的渔获进行鉴定分类, 并对样品进行称量和计数。采集游泳动物的同时, 利用多参数水质检测仪监测鱼礁区和对照区的水温(temperature)、水深(deep)、盐度(salinity)、溶解氧(dissolved oxygen)和pH等环境因子。样品采集、保存及分析均按《海洋调查规范》(GB/T12763-2007)和《海洋监测规范》(GB17378-1998)进行。

游泳动物的学名及分类地位以《中国鱼类系统检索》(成庆泰和郑葆珊, 1987)为依据, 并参考FAO FishBase数据库(Palomares & Pauly, 2015); 鱼类生物的适温类型参考刘静和宁平(2011)的研究, 包括暖温种(warm temperature species, WT)、暖水种(warm water species, WW)、冷温种(cold temperature species, CT)以及冷水种(cold water species, CW); 甲壳类和头足类的学名及分类地位以《中国海洋生物名录》(刘瑞玉, 2008)和《中国北部无脊椎动物》(杨德渐和王永良, 1989)为依据, 并参照SeaLifeBase数据库(Palomares & Pauly, 2015)。

1.3 数据处理与分析

将每个网笼单元的渔获物作为一个样本来进行数据分析, 分析前对原始数据作标准化处理, 用每天每网笼单元的渔获量($\text{g} \cdot \text{net}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$)来表示地笼网的单位捕捞努力量(catch per unit effort, CPUE) (吴忠鑫等, 2012)。采用Shannon-Wiener多样性指数(H')

图1 崂山湾鱼礁区和对照区游泳动物调查站位
Fig. 1 Sampling stations for the nekton investigation in the artificial reef zones and the control zones in Laoshan Bay

(Ludwig & Reynolds, 1988)、Margalef种类丰富度指数(d)(Margalef, 1968)、Pielou均匀度指数(J) (Pielou, 1966)以及Pinkas相对重要性指数(IRI) (Pinkas et al, 1971)对渔获数据进行分析。各指数的计算公式如下:

Shannon-Wiener多样性指数:

$$H' = - \sum_{i=1}^S P_i \log_2 P_i \tag{1}$$

Margalef种类丰富度指数:

$$d = (S - 1) / \log_2 N \tag{2}$$

Pielou均匀度指数:

$$J = H' / \log_2 S \tag{3}$$

Pinkas相对重要性指数(IRI):

$$IRI = (N\% + W\%) \times F\% \tag{4}$$

式中, S 为游泳动物种类数; N 为游泳动物总个体数; P_i 表示第 i 种游泳动物的渔获量占总渔获量的百分比; $N\%$ 为某一游泳动物的渔获尾数占总渔获尾数的百分比; $W\%$ 为某一游泳动物的生物量占总生物量的百分比; $F\%$ 为某一游泳动物出现的站位数占总站位数的百分比。定义 $IRI > 1,000$ 的种类为优势种, $100 \leq IRI < 1,000$ 的种类为重要种, 优势种和重要种统称主要种(李凡等, 2013)。

利用ABC (abundance-biomass comparison)曲线和W统计(W-statistic) (Warwick, 1986)描述群落稳定性以及生物量/丰度的优势地位。以各月份各调查站位渔获量为原始矩阵, 进行平方根转换以后, 利用等级聚类(CLUSTER)和非度量多维尺度排序

(NMDS)分析各月份各调查区域游泳动物的组成特征。应用SIMPER相似性百分比分析游泳动物对站位组内相似性和组间差异性的贡献率,将贡献率3%以上的游泳动物定为主要特征种类(徐炳庆等,2011)。采用Stress系数检验NMDS结果的可信度:Stress<0.1时结果具有较好的解释意义;0.1≤Stress<0.2时结果具有一定的解释意义;Stress≥0.2时结果不具解释意义(马藏允和王惠卿,1997;Clarke & Warwick,2001)。利用Bray-Curtis相异性指标(Bray & Curtis,1957)分析各调查月份之间渔获种类资源量组成的差异,并作出不同站位相似度树状图。

使用Excel 2010、SPSS 19.0和PRIMER 6.0软件对相关数据进行分析,利用单因素方差分析不同区域间的差异,显著性水平为 $\alpha=0.05$ 。图件绘制使用OriginPro 8和PRIMER 6.0软件,使用Arcgis 10.2软件完成站位布设图的绘制。

2 结果

2.1 水域环境特征

对调查区不同月份底层水体环境因子进行方差分析,结果表明,不同月份的底层水体环境因子变化显著(表1)。水温和溶解氧含量之间具有相反的变化趋势,5月水温较低,但溶解氧含量最高,8月水温最高,而溶解氧含量最低;不同月份之间的盐度变化较小,但有一定的季节变化趋势,盐度在5月最高,11月最低;pH最大值出现在11月,最小值出现在7月。

2.2 游泳动物种类组成和单位捕捞努力量(CPUE)

2015年5月至2015年11月以及2016年1月8个月份的调查共捕获游泳动物34科61种(附录1),其中鱼

类18科36种,甲壳类14科22种,头足类仅有长蛸(*Octopus variabilis*)、短蛸(*O. ocellatus*)和金乌贼(*Sepia esculenta*)等2科3种。捕获的36种鱼类生物的适温类型均为暖温种和冷温种,无冷水种和暖水种。暖温种主要包括星康吉鳗(*Conger myriaster*)、花鲈(*Lateolabrax maculatus*)、褐牙鲆(*Paralichthys olivaceus*)等27种,占鱼类总种数的75%,冷温种包括许氏平鲈(*Sebastes schlegelii*)、大泷六线鱼(*Hexagrammus otakii*)、斑头鱼(*H. agrammus*)等9种,占鱼类总种数的25%。各调查航次地笼网的CPUE显示(图2),地笼网的月平均CPUE为 $515.35 \pm 309.47 \text{ g}\cdot\text{net}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,5月份最高,为 $735.74 \pm 316.59 \text{ g}\cdot\text{net}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,1月份最低,仅为 $161.59 \pm 185.02 \text{ g}\cdot\text{net}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,各航次CPUE具有显著性差异($P<0.05$)。黄山口礁区共捕获游泳动物50种,月平均CPUE为 $563.705 \pm 356.12 \text{ g}\cdot\text{net}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,三亩前礁区共捕获游泳动物41种,月平均CPUE为 $566.911 \pm 262.99 \text{ g}\cdot\text{net}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,对照区仅捕获游泳动物38种,月平均

图2 单位捕捞努力量均值的月变化
Fig. 2 Variation in mean catch per unit fishing effort

表1 崂山湾人工鱼礁区底层水域环境特征

Table 1 Environmental conditions of bottom water of the artificial reef zones in Laoshan Bay

环境变量 Environment variable	1月 Jan.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.
水温 Temperature (°C)	4.57 ± 0.12 ^a	11.93 ± 0.23 ^b	14.09 ± 0.08 ^c	22.68 ± 0.51 ^d	25.84 ± 0.11 ^e	24.70 ± 0.06 ^f	20.30 ± 0.15 ^g	14.09 ± 0.05 ^c
溶解氧含量 DO (mg/L)	8.33 ± 1.45 ^a	9.18 ± 0.78 ^{ab}	7.89 ± 0.84 ^b	6.04 ± 0.33 ^c	4.22 ± 0.43 ^d	4.67 ± 0.03 ^{de}	6.71 ± 0.05 ^c	5.78 ± 0.02 ^{dce}
盐度 Salinity	31.29 ± 0.20 ^a	31.87 ± 0.06 ^b	31.19 ± 0.07 ^b	30.96 ± 0.03 ^c	30.86 ± 0.04 ^c	30.99 ± 0.03 ^c	31.16 ± 0.03 ^b	30.51 ± 0.15 ^d
pH	7.80 ± 0.12 ^a	7.70 ± 0.03 ^b	7.85 ± 0.05 ^c	7.59 ± 0.03 ^a	7.77 ± 0.08 ^b	7.73 ± 0.04 ^b	7.70 ± 0.03 ^{ab}	7.89 ± 0.07 ^d

同行间相同的小写字母表示差异不显著($P>0.05$)

Means with same lower case superscript letter in the same row were no significant difference ($P>0.05$)

表2 2015年5月至2016年1月崂山湾主要游泳动物的Pinkas相对重要性指数(“-”表示未捕获)
Table 2 Index of relative importance (IRI) of the main nektons in Laoshan Bay from May 2015 to January 2016 (“-” means not catch)

种类 Species	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	1月 Jan.
许氏平鲈 <i>Sebastes schlegelii</i>	4,665	2,671	1,829	847	2,413	2,935	10,485	7,963
日本蟳 <i>Charybdis japonica</i>	2,045	2,161	7,852	8,158	7,728	9,420	2,386	189
大泷六线鱼 <i>Hexagrammus otakii</i>	5,288	6,303	1,794	734	1,522	1,467	1,406	2,065
斑头鱼 <i>Hexagrammus agrammus</i>	1,601	3,168	75	530	350	518	1,065	339
星康吉鳗 <i>Conger myriaster</i>	394	134	1,372	807	1,290	1,103	747	13
寄居蟹科 <i>Paguridae</i>	1,045	1,206	2,496	1,957	24	46	-	642
褐菖鲉 <i>Sebastes marmoratus</i>	27	93	31	138	871	2,087	1,567	199
朝鲜平鲈 <i>Sebastes koreanus</i>	691	616	30	10	330	359	225	47
长蛸 <i>Octopus variabilis</i>	616	69	45	-	159	683	95	191
厚头平鲈 <i>Sebastes pachycephalus</i>	281	328	-	17	69	195	154	79
口虾蛄 <i>Oratosquilla oratoria</i>	23	34	398	418	1,041	188	158	-
敖氏长臂虾 <i>Palaemon ortmanni</i>	53	32	19	150	47	225	61	-
繸鲬 <i>Chirolophis japonicus</i>	167	4	-	-	-	-	-	23
方氏云鲬 <i>Pholis fangi</i>	4	2	-	-	33	25	503	-
花鲈 <i>Lateolabrax maculatus</i>	-	-	10	-	588	117	787	-
强壮菱蟹 <i>Parthenope validus</i>	-	-	49	185	518	-	-	-
三疣梭子蟹 <i>Portunus trituberculatus</i>	-	-	-	5	1,107	-	31	-
黄姑鱼 <i>Nibea albiflora</i>	-	-	-	40	519	34	-	-
银姑鱼 <i>Pennahia argentata</i>	-	-	-	-	205	-	-	-
褐牙鲈 <i>Paralichthys olivaceus</i>	-	-	16	4	436	-	-	-

CPUE为 $417.06 \pm 272.99 \text{ g} \cdot \text{net}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$, 显著低于鱼礁区($P<0.05$)。

2.3 游泳动物优势种组成及群落稳定性变化

表2给出了各航次调查中IRI≥100的种类分布, 日本蟳(*Charybdis japonica*)、许氏平鲈和大泷六线鱼是崂山湾海域全年性优势种, 斑头鱼、星康吉鳗、褐菖鲉(*Sebastes marmoratus*)和寄居蟹(*Paguridae*)则属于季节性优势种, 且优势种的优势度值在各月份的调查中变化较大。优势种类在5、6、7月最多, 在1月最少。根据渔获量组成, 日本蟳的生物量最多, 其渔获量占总渔获量的26.91%, 其次为许氏平鲈, 占26.74%, 大泷六线鱼占10.40%, 星康吉鳗占6.81%, 斑头六线鱼占6.33%, 其他种类占22.81%。

游泳动物ABC曲线(图3)显示, 5月和6月的丰度曲线始终位于生物量曲线的上方, W为负值, 丰度比生物量更具优势地位, 群落优势种以小个体生物为主, 群落处于严重受干扰状态; 7–10月份, 生物量曲线和丰度曲线出现交叉重叠, 且W为正值, 群落处于中度扰动状态; 11月和1月份生物量曲线始终位于丰度曲线的上方, W为正值, 生物量比丰

度更具优势地位, 群落优势种以大个体生物为主, 群落处于较稳定状态。

2.4 多样性分析

各调查区域游泳动物群落的物种多样性指数、种类丰富度指数和均匀度指数在不同月份之间存在一定变化, 但是差异不显著($P>0.05$)。5月至9月, Shannon-Wiener多样性指数和Margalef种类丰富度指数呈现增加的趋势, 最大值分别出现在9月的黄山口礁区和8月的三亩前礁区, 分别达到2.818和3.934; 9月之后逐渐降低, 至次年1月降到最低, 最低值出现在三亩前礁区, 分别为1.219和1.173。均匀度指数无明显变化趋势, 除1月以外, 其他各月无明显差异, 最大值出现在1月的黄山口礁区, 为0.9156, 最小值出现在1月的三亩前礁区, 为0.6805。

2.5 群落结构分析

聚类分析结果表明(图5), 除1月外, 各调查月份样方间的相似性均达到55%以上。相似性最高的两个样方为5月和6月的三亩前礁区, 相似度达到86.21%。NMDS排序图(图6)与群落聚类分析相似度

图3 2015年5月至2016年1月崂山湾游泳动物丰度/生物量曲线
Fig. 3 Abundance-biomass comparison curves of nektons in Laoshan Bay from May 2015 to January 2016

图4 崂山湾不同区域游泳动物群落多样性指数的季节变化
Fig. 4 Seasonal variations in the diversity of nekton community of different zones in Laoshan Bay

55%以上的结果一致, Stress值为0.15, 具有一定的解释意义。

利用SIMPER相似性百分比分析各组内群落结构相似的特征种以及组间群落差异的分歧种和贡献率。黄山口礁区各调查网次渔获结构的平均相似性为55.58%, 特征种包括日本蟳、许氏平鲈、大泷六线鱼、斑头鱼、星康吉鳗、厚头平鲈(*Sebastes pachycephalus*)、朝鲜平鲈(*S. koreanus*)和褐菖鲉, 这8种渔获物对组内平均相似性的累计贡献率达88.39%; 对照区各调查网次渔获结构的平均相似性为63.80%, 特征种包括许氏平鲈、日本蟳、大泷六线鱼、星康吉鳗、长鲎、褐菖鲉和斑头鱼, 这7种渔获物对组内平均相似性的累计贡献率达94.00%; 三亩前礁区各调查网次渔获结构的平均相似性为55.37%, 特征种包括许氏平鲈、日本蟳、大泷六线

鱼、斑头鱼和褐菖鲉, 这5种渔获物对组内平均相似性的累计贡献率达91.94%。黄山口礁区和对照区的平均相异性为41.70%, 分歧种包括日本蟳、许氏平鲈、斑头鱼、长鲎、星康吉鳗、厚头平鲈、寄居蟹和大泷六线鱼, 这8种渔获物对组间平均相异性的累计贡献率达69.83%; 黄山口礁区和三亩前礁区的平均相异性为44.99%, 分歧种包括许氏平鲈、日本蟳、斑头鱼、星康吉鳗、长鲎、大泷六线鱼和寄居蟹, 这7种渔获物对组间平均相异性的累计贡献率达62.92%; 对照区和三亩前礁区的平均相异性为39.83%, 分歧种包括日本蟳、许氏平鲈、长鲎、斑头鱼、口虾蛄(*Oratosquilla oratoria*)和星康吉鳗, 这6种渔获物对组间平均相异性的累计贡献率达62.82%。

3 讨论

3.1 游泳动物种类组成

青岛崂山湾产卵场修复示范区底层游泳动物以鱼类为主, 周年地笼网调查出现的36种鱼类均是我国黄渤海海域常见种。游泳动物优势种为日本蟳、许氏平鲈、大泷六线鱼、斑头鱼以及星康吉鳗, 这与日照前三岛海域(焦金菊等, 2011)、山东朱旺港海域人工鱼礁区(徐浩等, 2012)、荣成俚岛人工鱼礁区(吴忠鑫等, 2012)、马鞍列岛岩礁区域(汪振华等, 2012)以及威海西港(于晴和唐衍力, 2015)等岩礁游泳动物优势种相似。日本蟳作为一种典型的岩礁生物, 其索饵、繁殖、避敌等行为均在岩礁或洞穴中进行(徐浩等, 2012); 许氏平鲈、大泷六线鱼、斑头鱼均属于岩礁定居性鱼类, 常栖息于海藻丛及浅海岩礁等光线较弱的地方(张硕等, 2008; 纪东平等, 2014, 2015); 星康吉鳗属于岩礁非定居性鱼类, 常常栖息于泥沙海底及相邻的水下暗礁、岩洞等(张迎秋, 2015)。人工鱼礁投放以后, 一些大型海藻附着生长, 为鱼类提供了良好的栖息场所。此外, 鱼礁所产生的阴影、水流等也会吸引鱼类聚集。

3.2 游泳动物渔获量

周年8个航次的调查结果显示, 人工鱼礁区的渔获量和渔获种类数均明显多于对照区。同时, 春季、秋季航次的鱼类生物量明显多于夏季和冬季。分析认为, 礁区大型海藻资源丰富, 栖息地的复杂程度高于对照区, 吸引鱼类等生物在此聚集, 从而

图5 崂山湾不同区域不同月份游泳动物群落聚类分析(数字表示月份, 字母表示区域)
Fig. 5 The cluster analysis of the nekton community in different months and different zones in Laoshan Bay. Digits indicate the month, and letters indicate zones.

图6 崂山湾不同区域不同月份游泳动物群落NMDS排序分析。数字表示月份, 字母表示区域。
Fig. 6 NMDS analysis of the nekton community in different months and different zones in Laoshan Bay. Digits indicate the month, and letters indicate zones.

导致礁区生物量明显多于对照区。青岛崂山湾是山东近岸浅海重要的产卵场和幼鱼的索饵育肥场, 春季水温回升, 一些在黄海中南部越冬的鱼类洄游至此产卵繁殖。同时本研究也发现, 5月、6月航次调查的渔获中出现了大量许氏平鲉和大泷六线鱼幼鱼, 这些都可能导致春季鱼类生物量明显多于其他季节; 秋季水温降低, 许氏平鲉等一些冷温性种生长迅速, 使得秋季鱼类生物量也较高。而7、8月份崂山湾海域正处于22.68–25.84℃的高温期, 大型藻

类衰败分解需消耗大量的溶解氧, 礁区和对照区处于低氧状态(8月调查海域平均溶解氧仅为4.22 mg/L), 在一定程度上会影响水生生物的生长(祁铭华等, 2004)。同时, 该季节浒苔和石莼类大量暴发, 有些会堵塞调查用地笼网网口, 使得渔获效率降低。冬季海域温度降低, 大部分鱼类迁徙至深水区, 因而冬季的渔获量也较少。

3.3 游泳动物群落扰动

丰度/生物量比较法由Warwick (1986)最先提

出,它最初主要通过比较生物量和丰度的优势地位来监测污染对底栖动物群落的影响。随后,被应用到不同区域海洋底栖动物群落研究中,而且在大多数情况下可以显示出扰动产生的预期影响(Warwick & Pearson, 1987; Agard et al, 1993),近些年亦被应用于游泳动物群落研究(Yemane et al, 2005)。当生物量曲线位于丰度曲线上方(W 统计为正值)时,说明群落中生物量分布比丰度分布更具优势,群落的生物量是由一种或几种大型的种类控制;当丰度曲线位于生物量曲线上方(W 统计为负值)时,说明群落中丰度分布比生物量分布更具优势,群落的丰度是由一种或者几种小个体种类控制。本研究发现,春季和夏初崂山湾底层游泳动物群落处于严重受扰动状态,秋末和冬季底层游泳动物群落处于稳定状态,其他月份则处于中度扰动状态,推测是由于优势种以及优势种的个体大小改变引起的。春季和夏初,鱼类优势种主要以大泷六线鱼、许氏平鲈的幼鱼为主,其生物量占到总渔获量的40%以上,数量则占到50%以上,个体的平均体重分别达到22.26 g和46.34 g;同时,5、6月份调查海域还出现了大量的寄居蟹,个体数占到总数的10%以上,但生物量仅占总渔获量的2%。因此,该季节丰度比生物量更具优势地位,丰度曲线位于生物量曲线上方;而到了11月和次年的1月,大泷六线鱼和许氏平鲈的生物量占到总渔获量的70%以上,数量占到50%以上,个体的平均体重也分别达到54.15 g和112.08 g,生物量比丰度更具优势地位,生物量曲线位于丰度曲线的上方。各月份优势种类以及优势种个体大小的差异,使生物量曲线和丰度曲线的支配地位不同,因而由ABC曲线所呈现出的群落稳定性存在一定差异。

3.4 游泳动物群落多样性

各月份人工鱼礁区和对照区底层游泳动物群落的种类丰富度指数、多样性指数和均匀度指数均无显著差异。分析认为,鱼礁区和对照区都位于近岸水域,大型藻类丰富,水深较浅,饵料生物丰富,栖息地的复杂程度较高,游泳动物种类相似,从而导致鱼礁区和对照区游泳群落的多样性、丰富度和均匀度无明显差异。8、9月份底层游泳动物群落的种类丰富度指数、多样性指数和均匀度指数均较高,游泳动物群落结构较为复杂。11月和1月的丰富度指数和多样性指数偏低,推测可能与游泳动物种类

数减少和优势种组成变化有关。秋末水温降低,一些种类前往深水区越冬,导致海域游泳动物种类数减少。此外,这两个月优势种许氏平鲈的质量百分比均高达60%以上,数量百分比也达到了40%,而其余种类的数量和质量占比均比较少,种类分布不均匀,导致游泳动物群落多样性和丰富度下降。

3.5 游泳动物群落相似性分析

底层游泳动物群落的SIMPER相似性百分比分析表明,各区域不同月份的游泳动物的组内相似性较高,均达到55%以上,而组间相异性则在50%以下,表明各调查区域各月份游泳动物群落的相似性较高,对组内相似性和组间相异性贡献率最高的两种游泳动物为日本蟳和许氏平鲈。分析认为调查区域出现的游泳动物均为我国黄渤海常见种类,日本蟳、星康吉鳗、鲉形目和鲷形目等生物量占比较大的一些种类,均属于全年性岩礁种类(张迎秋, 2015),各月份均有出现,使得调查区周年底层游泳动物群落的相似性较高。聚类分析结果表明,5、6月和11月调查区的游泳动物样方聚为一支,即春季和秋季底层游泳动物群落的相似性最高,与荣成俚岛人工鱼礁区聚类结果一致(吴忠鑫等, 2012)。分析认为,春季随着水温不断回升,一些种类开始向近岸产卵场洄游;秋季随水温逐渐下降,沿岸鱼类的越冬和索饵行为增强,活动范围增大,从而导致春、秋季底层游泳动物群落结构的趋同。

本研究表明,崂山湾人工鱼礁投放后,鱼礁区游泳动物的种类数和生物量均高于对照区,鱼礁的投放在一定程度上增加了海域资源量,改变了游泳动物群落结构。但人工鱼礁生态效果的显现是一个长期、渐进的过程,现有数据只能对人工鱼礁的生态效果做出初步评价,今后还要对调查海域进行长期持续的监测研究,采用多种网具相结合的方式,以期更全面准确地反映当地渔业资源的组成。此外,应重点关注礁区生态系统的稳定性、渔获质量、主要渔获种类的食物关系以及礁区水动力机制等,利用环境容纳量、生态系统服务价值等方法,深入评估人工鱼礁的生态效应,为人工鱼礁生态系统的可持续开发利用提供科学依据。

参考文献

- Agard JBR, Gobin J, Warwick RM (1993) Analysis of marine macrobenthic community structure in relation to pollution, natural oil seepage and seasonal disturbance in a tropical

- environment (Trinidad, West Indies). *Marine Ecology Progress Series*, 92, 233–243.
- Bray JR, Curtis JT (1957) An ordination of the upland forest communities of southern Wisconsin. *Ecological Monographs*, 27, 325–349.
- Chen Y, Yu CQ, Zhang GS, Zhang S (2002) The environment function and fish gather effect of artificial reefs. *Journal of Dalian Fisheries University*, 17, 64–69. (in Chinese with English abstract) [陈勇, 于长清, 张国胜, 张硕 (2002) 人工鱼礁的环境功能与集鱼效果. *大连水产学院学报*, 17, 64–69.]
- Cheng QT, Zheng BS (1987) *Systematic Synopsis of Chinese Fishes*. Science Press, Beijing. (in Chinese) [成庆泰, 郑葆珊 (1987) 中国鱼类系统检索. 科学出版社, 北京.]
- Clarke KR, Warwick RM (2001) *Change in Marine Communities: An Approach to Statistical Analysis and Interpretation*, 2nd edn. PRIMER-E, Plymouth.
- Ji DP, Bian XD, Song N, Gao TX (2014) Feeding ecology of *Hexagrammos otakii* in Lidao Rongcheng. *Journal of Fisheries of China*, 38, 1399–1409. (in Chinese with English abstract) [纪东平, 卞晓东, 宋娜, 高天翔 (2014) 荣成俚岛大泷六线鱼摄食生态研究. *水产学报*, 38, 1399–1409.]
- Ji DP, Bian XD, Song N, Gao TX (2015) Feeding ecology of *Hexagrammos agrammus* in Lidao, Rongcheng, China. *Journal of Fishery Sciences of China*, 22, 88–98. (in Chinese with English abstract) [纪东平, 卞晓东, 宋娜, 高天翔 (2015) 荣成俚岛斑头鱼摄食生态研究. *中国水产科学*, 22, 88–98.]
- Jiao JJ, Pan YX, Sun LY, Yang BQ, Qiu SY (2011) Effect of artificial reefs on fish multiplication. *Fisheries Science*, 30(2), 79–82. (in Chinese with English abstract) [焦金菊, 潘永玺, 孙利元, 杨宝清, 邱盛尧 (2011) 人工鱼礁区的增殖鱼类资源效果初步探究. *水产科学*, 30(2), 79–82.]
- Li F, Zhang HJ, Lü ZB, Xu BQ, Zheng L (2013) Species composition and community diversity of nekton in Laizhou Bay, China. *Biodiversity Science*, 21, 537–546. (in Chinese with English abstract) [李凡, 张焕君, 吕振波, 徐炳庆, 郑亮 (2013) 莱州湾游泳动物群落种类组成及多样性. *生物多样性*, 21, 537–546.]
- Lin J, Zhang SY (2006) Research advances on physical stability and ecological effects of artificial reef. *Marine Fisheries*, 28, 257–262. (in Chinese with English abstract) [林军, 章守宇 (2006) 人工鱼礁物理稳定性及其生态效应的研究进展. *海洋渔业*, 28, 257–262.]
- Liu J, Ning P (2011) Species composition and faunal characteristics of fishes in the Yellow Sea. *Biodiversity Science*, 19, 764–769. (in Chinese with English abstract) [刘静, 宁平 (2011) 黄海鱼类组成、区系特征及历史变迁. *生物多样性*, 19, 764–769.]
- Liu RY (2008) *Checklist of Marine Biota of China Seas*. Science Press, Beijing. (in Chinese) [刘瑞玉 (2008) 中国海洋生物名录. 科学出版社, 北京.]
- Ludwig JA, Reynolds JF (1988) *Statistical Ecology: A Primer on Methods and Computing*. John Wiley and Sons, New York.
- Ma ZY, Wang HQ (1997) Multivariate analysis of community structure on macrobenthos. *China Environmental Science*, 17, 297–300. (in Chinese with English abstract) [马藏允, 王惠卿 (1997) 底栖生物群落结构变化多元变量统计分析. *中国环境科学*, 17, 297–300.]
- Margalef R (1968) *Perspectives in Ecological Theory*. University of Chicago Press, Chicago.
- Mei C, Ren YP, Xu BD, Fan YC (2010) Preliminary study on the effect of *Penaeus japonicus* Bate releasing in the Laoshan Bay. *Periodical of Ocean University of China (Natural Science Edition)*, 40(9), 45–50. (in Chinese with English abstract) [梅春, 任一平, 徐宾铎, 范延琛 (2010) 崂山湾日本对虾增殖放流效果的初步研究. *中国海洋大学学报(自然科学版)*, 40(9), 45–50.]
- Palomares MLD, Pauly D (2015) SeaLifeBase. <http://www.sealifebase.org>. (accessed on 2015-03-25)
- Pielou EC (1966) Species-diversity and pattern-diversity in the study of ecological succession. *Journal of Theoretical Biology*, 10, 370–383.
- Pinkas L, Oliphant M, Iverson I (1971) Food habits of albacore, bluefin tuna and bonito in California waters. *California Department of Fish and Game: Fish Bulletin*, 152, 1–105.
- Qi MH, Ma SS, Qu KM, Xin FY (2004) The formation of sulfide in the marine sediments and its relationships to cultivation of shellfish. *Marine Fisheries Research*, 25(1), 85–89. (in Chinese with English abstract) [祁铭华, 马绍赛, 曲克明, 辛福言 (2004) 沉积环境中硫化物的形成及其与贝类养殖的关系. *海洋水产研究*, 25(1), 85–89.]
- Rounsefell GA (1972) Ecological effects of offshore construction. *Journal of Marine Science*, 2, 1–119.
- Tang YL, Sheng HX, Qi GR, Wu LH, Wan R (2012) The seasonal differences of benthic macroalgae communities in three artificial reefs of Laoshan Bay. *Fisheries Modernization*, 39(3), 66–71. (in Chinese with English abstract) [唐衍力, 盛化香, 齐广瑞, 吴连慧, 万荣 (2012) 崂山湾三个人工鱼礁区底栖大型藻类群落季节性差异. *渔业现代化*, 39(3), 66–71.]
- Wang X, Sheng HX, Tang YL, Huang LY, Wan R (2014) Relationship between the structure of phytoplankton community and environmental factors in three artificial reef areas of Laoshan Bay. *Progress in Fishery Sciences*, 35(4), 7–12. (in Chinese with English abstract) [王欣, 盛化香, 唐衍力, 黄六一, 万荣 (2014) 崂山湾人工鱼礁区浮游植物群落结构与环境因子的关系. *渔业科学进展*, 35(4), 7–12.]
- Wang ZH, Zhang SY, Chen QM, Xu Q, Wang K (2012) Fish community ecology in rocky reef habitat of Ma'an Archipelago. I. Species composition and diversity. *Biodiversity Science*, 20, 41–50. (in Chinese with English abstract) [汪振华, 章守宇, 陈清满, 许强, 王凯 (2012) 马鞍列岛岩礁生境鱼类群落生态学. I. 种类组成和多样性. *生物多样性*, 20, 41–50.]

- Warwick RM (1986) A new method for detecting pollution effects on marine macrobenthic communities. *Marine Biology*, 92, 557–562.
- Warwick RM, Pearson TH (1987) Detection of pollution effects on marine macrobenthos: further evaluation of the species abundance/biomass method. *Marine Biology*, 95, 193–200.
- Wu ZX, Zhang L, Zhang XM, Zhang PD, Li WT (2012) Nekton community structure and its relationship with main environmental variables in Lidao artificial reef zones of Rongcheng. *Acta Ecologica Sinica*, 32, 6737–6746. (in Chinese with English abstract) [吴忠鑫, 张磊, 张秀梅, 张沛东, 李文涛 (2012) 荣成俚岛人工鱼礁区游泳动物群落特征及其与主要环境因子的关系. *生态学报*, 32, 6737–6746.]
- Xu BQ, Lü ZB, Li F, Bao JG, Xu WZ (2011) On nekton composition in southern coastal waters off Shandong Peninsula in summer. *Marine Fisheries*, 33, 59–65. (in Chinese with English abstract) [徐炳庆, 吕振波, 李凡, 包家国, 徐维柱 (2011) 山东半岛南部近岸海域夏季游泳动物的组成特征. *海洋渔业*, 33, 59–65.]
- Xu H, Zeng XQ, Gu YB, Guan LS (2012) The effect of artificial reefs on the community structure and seasonal variation of nektons in Zhuwang Harbor, Laizhou, Shandong. *Periodical of Ocean University of China (Natural Science Edition)*, 42(5), 47–54. (in Chinese with English abstract) [徐浩, 曾晓起, 顾炎斌, 关丽莎 (2012) 人工鱼礁对山东莱州朱旺港海区游泳动物的群落结构及季节变化的影响. *中国海洋大学学报(自然科学版)*, 42(5), 47–54.]
- Yang DJ, Wang YL (1989) *Invertebrates in North China*. Higher Education Press, Beijing. (in Chinese) [杨德渐, 王永良 (1989) *中国北部无脊椎动物*. 高等教育出版社, 北京.]
- Yemane D, Field JG, Leslie RW (2005) Exploring the effects of fishing on fish assemblages using Abundance Biomass Comparison (ABC) curves. *ICES Journal of Marine Science*, 62, 374–379.
- Yu Q, Tang YL (2015) Analysis on community structure and diversity of fish and macroinvertebrates in artificial reef area around Xigang, Weihai. *Fishery Modernization*, 42(3), 65–72. (in Chinese with English abstract) [于晴, 唐衍力 (2015) 威海西港人工鱼礁区鱼类和大型无脊椎动物群落特征. *渔业现代化*, 42(3), 65–72.]
- Yuan W, Lin Q, Wang J, Sun JQ, Chen RS (2015) Assessment of enhancement effectiveness of Chinese shrimp *Fenneropenaeus chinensis* stock in the Laoshan Bay. *Progress in Fishery Sciences*, 36(4), 27–34. (in Chinese with English abstract) [袁伟, 林群, 王俊, 孙坚强, 陈瑞盛 (2015) 崂山湾中国对虾(*Fenneropenaeus chinensis*)增殖放流效果评价. *渔业科学进展*, 36(4), 27–34.]
- Zhang B, Yuan W, Wang J (2015) Feeding ecology of the dominant fish species in spring in Laoshan Bay. *Journal of Fishery Sciences of China*, 22, 820–827. (in Chinese with English abstract) [张波, 袁伟, 王俊 (2015) 崂山湾春季鱼类群落的摄食生态及其主要种类. *中国水产科学*, 22, 820–827.]
- Zhang S, Sun MC, Chen Y (2008) The attractive effects of different structural artificial reef models on juvenile Schlegel's rockfish *Sebastes schlegeli* and fat greenling *Hexagrammos otakii*. *Journal of Dalian Fisheries University*, 23, 13–19. (in Chinese with English abstract) [张硕, 孙满昌, 陈勇 (2008) 人工鱼礁模型对大泷六线鱼和许氏平鲈幼鱼个体的诱集效果. *大连水产学院学报*, 23, 13–19.]
- Zhang YQ (2015) Community Structure, Feeding Ecology and Movement Behaviors of Demersal Fish around Qiansan Islets. PhD dissertation, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing. (in Chinese with English abstract) [张迎秋 (2015) 前三岛海域底层鱼类群落结构、摄食生态和运动行为特征. 博士学位论文, 中国科学院大学, 北京.]
- Zhou YB, Chen PM, Li HQ (2011) Feasibility study on artificial reef construction in planning area around Liuniu of Zhelin Bay in Guangdong Province. *Guangdong Agricultural Sciences*, 38(23), 10–13. (in Chinese with English abstract) [周艳波, 陈丕茂, 李辉权 (2011) 广东省柘林湾海域溜牛礁区建礁可行性研究. *广东农业科学*, 38(23), 10–13.]

(责任编辑: 李新正 责任编辑: 闫文杰)

附录 Supplementary Material

附录1 2015年5月至2016年1月崂山湾人工鱼礁区游泳动物名录

Appendix 1 The list of caught nektons in the artificial reef zones in Laoshan Bay from May 2015 to January 2016

<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2016111-1.pdf>

刘鸿雁, 杨超杰, 张沛东, 李文涛, 杨晓龙, 张秀梅. 青岛崂山湾人工鱼礁区底层游泳动物群落结构特征. 生物多样性, 2016, **24** (8): 896–906.
http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2016111

附录1 2015年5月至2016年1月崂山湾人工鱼礁区游泳动物名录
Appendix 1 The list of caught nektons in the artificial reef zones in Laoshan Bay from May 2015 to January 2016

种类 Species	生态类型 Eco-type		调查时间 Survey time							
	ST	HT	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2016.01
鲷科 Scorpaenidae										
许氏平鲷 <i>Sebastes schlegelii</i>	CT	CD	*	*	*	*	*	*	*	*
厚头平鲷 <i>S. pachycephalus</i>	WT	CD	*	*		*	*	*	*	*
褐菖鲷 <i>Sebastiscus marmoratus</i>	WT	CD	*	*	*	*	*	*	*	*
朝鲜平鲷 <i>Sebastes koreanus</i>	WT	CD	*	*	*	*	*	*	*	*
六线鱼科 Hexagrammidae										
斑头鱼 <i>Hexagrammus agrammus</i>	CT	CD	*	*	*	*	*	*	*	*
大泷六线鱼 <i>H. otakii</i>	CT	CD	*	*	*	*	*	*	*	*
虾虎鱼科 Gobiidae										
矛尾虾虎鱼 <i>Chaeturichthys stigmatias</i>	WT	CD							*	*
五带高鳍虾虎鱼 <i>Pterogobius zacalles</i>	WT	CD		*		*	*			
纹犄虾虎鱼 <i>Tridentiger trionocephalus</i>	WT	CD				*	*		*	*
六丝钝尾虾虎鱼 <i>Amblychaeturichthys hexanema</i>	WT	CD		*						
斑尾复虾虎鱼 <i>Synechogobius ommaturus</i>	WT	CD					*	*		
钟馗虾虎鱼 <i>Tridentiger barbatus</i>	WT	CD						*		*
石首鱼科 Sciaenidae										
黄姑鱼 <i>Nibea albiflora</i>	WT	CBD				*	*	*		
皮氏叫姑鱼 <i>Johnius belengeri</i>	WT	CBD	*		*	*			*	
小黄鱼 <i>Pseudosciaena Polyactis</i>	WT	CBD					*			
银姑鱼 <i>Pennahia argentata</i>	WT	CBD					*			
锦鲷科 Pholidae										
方氏云鲷 <i>Pholis fangi</i>	CT	CD	*	*			*	*	*	
云鲷 <i>P. nebulosus</i>	CT	CD				*			*	*
縵鲷 <i>Chirolophis japonicus</i>	CT	CD	*	*						*
绵鲷科 Zoarcidae										
绵鲷 <i>Zoarces elontatus</i>	CT	CD	*							
鯧科 Sillaginidae										
少鳞鲳 <i>Sillago japonica</i>	WT	CD				*				
鲷科 Sparidae										
黑鲷 <i>Sparus macrocephlus</i>	WT	CD	*					*		
天竺鲷科 Apogonidae										
细条天竺鱼 <i>Apogonichthys lineatus</i>	WT	CD			*					
真鲈科 Percichthyidae										
花鲈 <i>Lateolabrax maculatus</i>	WT	CRA			*		*	*	*	
鲷科 Platycephalidae										
褐斑鲷 <i>Platycephalus</i> sp.1	WT	CRA				*			*	
鲂鲷科 Triglidae										
小眼绿鳍鱼 <i>Chelidonichthys spinosus</i>	WT	CD						*		
康吉鳗科 Congridae										
星康吉鳗 <i>Conger myriaster</i>	WT	CD	*	*	*	*	*	*	*	*
牙鲆科 Paralichthyidae										
褐牙鲆 <i>Paralichthys olivaceus</i>	WT	CD			*	*	*			
鲽科 Pleuronectidae										
钝吻黄盖鲽 <i>Pleuronectes Vokohamae</i>	CT	CD	*		*					
石鲽 <i>Kareius bicoloratus</i>	CT	CD	*	*	*	*		*		*
舌鲷科 Cynoglossidae										
褐斑三线舌鲷 <i>Cynoglossus trigrammus</i>	WT	CD		*						
长吻红舌鲷 <i>C. lighti</i>	WT	CD	*		*	*	*			
半滑舌鲷 <i>C. semilaevis</i>	WT	CD	*							
短吻红舌鲷 <i>C. joyneri</i>	WT	CD			*		*			

种类 Species	生态类型 Eco-type		调查时间 Survey time							
	ST	HT	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2016.01
鲀科 Tetraodontidae										
星点东方鲀 <i>Fugu niphobles</i>	WT	CD					*			
鲱科 Clupeidae										
青鳞小沙丁鱼 <i>Sardinella zunasi</i>	WT	CPN					*			
菱蟹科 Parthenopidae										
强壮菱蟹 <i>Parthenope validus</i>	—	—			*	*	*			
梭子蟹科 Portunidae										
日本螯 <i>Charybdis japonica</i>	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*
三疣梭子蟹 <i>Portunus trituberculatus</i>	—	—				*	*		*	
蜘蛛蟹科 Majidae										
四齿矶蟹 <i>Pugettia quadidens</i>	—	—	*	*						*
慈母互敬蟹 <i>Hyastenus pleione</i>	—	—			*	*	*	*		
玉蟹科 Leucosiidae										
圆十一刺栗壳蟹 <i>Arcania novemspinosa</i>	—	—			*			*		
关公蟹科 Dorippidae										
颗粒拟关公蟹 <i>Paradorippe granulata</i>	—	—			*	*				
毛刺蟹科 Pilumnidae										
小刺毛刺蟹 <i>Pilumnus spinulus</i>	—	—			*					
方蟹科 Grapsidae										
中华近方蟹 <i>Hemigrapsus sinensis</i>	—	—			*					
哲蟹科 Menippidae										
光辉团扇蟹 <i>Sphaerozius nitidus</i>	—	—			*					
寄居蟹总科 Paguroidea										
寄居蟹科 Paguridae	—	—	*	*	*	*	*	*		*
长脚蟹科 Goneplacidae										
隆线强蟹 <i>Eucrate crenata</i>	—	—			*	*	*			
泥足隆背蟹 <i>Carcinoplax vestitus</i>	—	—				*		*		
长臂虾科 Palaemonidae										
葛氏长臂虾 <i>Palaemon gravieri</i>	—	—	*		*	*		*		
敖氏长臂虾 <i>P. ortmanni</i>	—	—	*	*	*	*	*	*	*	
鼓虾科 Alpheidae										
鲜明鼓虾 <i>Alpheus distinguendus</i>	—	—			*	*				
日本鼓虾 <i>A. japonicus</i>	—	—								
对虾科 Penaeidae										
鹰爪虾 <i>Trachypenaeus curvirostris</i>	—	—			*	*	*			
细巧仿对虾 <i>Parapenaeopsis tenella</i>	—	—				*				
戴氏赤虾 <i>Metapenaeopsis dalei</i>	—	—				*	*	*		
日本对虾 <i>Penaeus japonicus</i>	—	—							*	
虾蛄科 Squillidae										
口虾蛄 <i>Oratosquilla oratoria</i>	—	—	*	*	*	*	*	*	*	
蛸科 Octopodidae										
长蛸 <i>Octopus variabilis</i>	—	—	*	*	*		*	*	*	*
短蛸 <i>O. ocellatus</i>	—	—	*					*		
乌贼科 Sepiidae										
金乌贼 <i>Sepia esculenta</i>	—	—	*	*	*		*	*		*

—表示物种的生态类型本研究未涉及；*表示该物种在调查站位出现；HT：栖所类型；ST：适温性；CD：大陆架浅水底层鱼类；CBD：大陆架浅水中低层鱼类；CPN：大陆架浅水中上层鱼类；CRA：大陆架岩礁性鱼类；WT：暖温性种；CT：冷温性种。

— means the eco-type of species was not considered in the paper; * means the species appeared in the survey station; HT, Habitat type; ST, Suitable temperate; CD, Continental shelf demersal fish; CBD, Continental shelf benthopelagic fish; CPN, Continental shelf pelagic-neritic fish; CRA, Continental shelf reef-associated fish; WT, Warm temperate species; CT, Cold temperate species.