• 研究报告 •

基于生物量的大型底栖动物功能摄食群结构及生态质量评价

蔡文倩 刘 静 周 娟 夏 阳 刘录三*

(中国环境科学研究院国家环境保护河口与海岸带环境重点实验室, 北京 100012)

摘要: 基于2011年5月和9月2个航次获取的生物及环境数据, 分析了渤海湾大型底栖动物的功能摄食群组成, 并首次利用以生物量构建的摄食均匀度指数(the feeding evenness index, b_{jFD})和多元AZTI海洋生物指数(multivariate-biomass AZTI marine biotic index, M-bAMBI)对渤海湾生态质量进行评价。结果表明, 渤海湾大型底栖动物功能群由4类组成, 分别是肉食者、碎屑食者、浮游生物食者和杂食者, 未发现植食者。2个航次均以浮游生物食者和杂食者的生物量最高, 碎屑食者最低。聚类分析结果表明海河口内大型底栖动物群落功能摄食群组成与其他区域明显不同。两个航次均以海河口的重金属潜在生态风险指数值(risk index, RI)较低, 且5月航次该指数沿河口向外有明显的空间分布梯度。 b_{jFD} 平均值为0.28, 指示研究区大部分区域生态质量较差, 其中低值区集中在海河口、北塘口及其附近海域, 与风险指数值的低值区基本吻合。BEST分析表明温度、盐度、重金属及营养盐等是影响 b_{jFD} 变化的主要环境因子。与M-bAMBI相比, b_{jFD} 对海河口及北塘口较差的环境质量状况更为敏感。总体上, b_{jFD} 适用于评价渤海湾的生态质量。

关键词: 大型底栖动物群落; 功能摄食群; 生物量; 摄食均匀度指数; 多元AZTI海洋生物指数; 渤海湾

Composition of macrozoobenthos functional feeding groups and assessment of ecological quality using the feeding evenness index calculated from biomass data

Wenqian Cai, Jing Liu, Juan Zhou, Yang Xia, Lusan Liu*

State Environmental Protection Key Laboratory of Estuary and Coastal Environment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012

Abstract: Based on biological and environmental materials collected during May and September of 2011, the composition of macrozoobenthos functional feeding groups was analyzed. Meanwhile, the feeding evenness index calculated from biomass data, together with M-bAMBI erected using biomass data, were used to assess the ecological quality of Bohai Bay for the first time. Results showed that the macrozoobenthos community was divided into five feeding groups, including a carnivorous group (CA), omnivorous group (OM), planktivorous group (PL), herbivorous group (HE) and detritivorous group (DE). Except for group HE, the other four groups were all sampled in the study area. Groups PL and OM displayed the greatest percentages of community average biomass in both voyages and the group DE displayed the smallest percentage. Cluster analysis indicated that the composition of the macrozoobenthos feeding group in the Haihe Estuary was significantly different from other areas. The risk index (RI) values were relatively lower in the Haihe Estuary than the other areas in the study region. Meanwhile, an obvious spatial gradient was observed along the Haihe estuary towards the offshore area during May 2011. The average feeding evenness index value was 0.28 indicating poor ecological quality in most study areas. In addition, the lower b_{jFD} values were found in the Haihe Estuary, Beitang outlet and their surrounding areas, which was similar to the RI spatial pattern. BEST analysis indicated that temperature, salinity, heavy metals, and nutrients were the main environmental

收稿日期: 2016-03-02; 接受日期: 2016-04-15

基金项目: 国家自然科学基金(41406160)和国家环保公益性行业专项(201309007)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: liuls@craes.org.cn

factors affecting the feeding evenness index. Compared with the M-bAMBI, b_{jFD} was more sensitive to the poor environmental quality status of the Haihe Estuary and Beitang outlet. In general, b_{jFD} could be used to evaluate the ecological quality of Bohai Bay.

Key words: macrozoobenthos community; functional feeding groups; biomass; b_{jFD} ; M-bAMBI; Bohai Bay

河口海湾生物多样性较高, 能为人类提供多样的生态服务, 也最易受人类活动的干扰。大型底栖动物作为河口海湾生物群落的重要组分, 不仅对其他经济生物资源的分布有重要影响, 且能较为敏感地指示栖息环境的变化, 因此常被用来指示当地的环境质量, 广泛地应用于生态质量状况评价(Borja, 2014)。

“生物指数”的数值大小可用来反映大型底栖动物栖居地的生态质量状况, 而建立在底栖动物个体和数量上的常用生物指数已有上百种(Hoey et al, 2013), 发展较为成熟的有基于分类学方法上的多元AZTI海洋生物指数(multivariate AZTI's marine biotic index, M-bAMBI)及建立在功能摄食群上的指数(如摄食均匀度指数, feeding evenness index)等(Muxika et al, 2007; Peng et al, 2013; Cai et al, 2014a)。其中, 摄食均匀度指数因简化了群落内物种之间的关系、增加了大型底栖动物群落在时空上的稳定性和可预测性、与其他指数的协同性高、计算简便及节约成本等诸多优点而被越来越多的学者成功用于研究区的生态质量状况评价(Steneck & Watling, 1982; Gamito & Furtado, 2009; Gamito et al, 2012; Peng et al, 2013; 吴祖立等, 2015)。

学者们通常采用栖息密度来构建大型底栖动物群落摄食均匀度指数。但与栖息密度相比, 生物量的生态相关性更高, 也更适用于生物指数的构建(Warwick et al, 2010)。已有研究证实, 采用生物量指标构建的AZTI海洋生物指数与基于栖息密度构建的指数显著相关, 且对环境质量的响应状况基本一致(Warwick et al, 2010), 类似的结果在我国也有例证(Cai et al, 2014a, 2015)。尽管AZTI海洋生物指数已有成功的应用, 但目前还鲜有学者从生物量的角度去探究摄食均匀度指数的适用性。

渤海湾作为我国北方重要的内湾之一, 伴随着京津冀的快速发展, 生态环境受到人类活动的强烈干扰, 海岸带栖居地退化严重(Ning et al, 2010), 底栖动物群落结构变化较大(Zhou et al, 2007)。目前, 多种生物指数已被成功地用于评价渤海湾的生物质量状况, 且证实了基于生物量构建的M-bAMBI

的适用性较高(Cai et al, 2014a, b, 2015), 而同时Peng等(2013)证实采用栖息密度构建的摄食均匀度指数也适用于评价渤海湾生态质量状况。然而该研究并未采用生物量来构建该指数, 也未对该指数与M-bAMBI在渤海湾的适用程度进行比较。

鉴于此, 本文选取渤海湾天津海岸段为研究区域, 分析渤海湾大型底栖动物的功能摄食群概况, 并从生物量的角度构建摄食均匀度指数(feeding evenness index calculated using biomass data, b_{jFD}), 结合M-bAMBI对渤海湾生态质量状况进行评价。

1 材料与方法

1.1 采样设计和数据获取

本研究采样区域位于渤海湾天津段(117°30'–118°10' E, 38°40'–39°10' N)。为评估该海域的生态质量状况, 研究组于2011年5月和9月进行了2个航次各43个样点的大型底栖动物生物、表层水样及沉积物等样品的采集工作。两个航次的重复采样点有37个(1–2, 5–25, 27–30, 32–35, 37–40, 42–43), 其他6个样点则分别在2个航次进行了采样(5月航次: 3–4, 47–50; 9月航次: 26, 31, 36, 41, 44, 45。图1)。两个航次均采用0.05 m²的箱式采泥器, 每个样点采集3个重复样, 并使用0.5 mm孔径的网筛分选底栖动物样品。pH、溶解氧、水深、水温、浊度及电导率等采用船载CTD进行采集, 营养盐和重金属则是在现场采集水样后冷藏保存(–4℃), 并尽快带到实验室进行分析测定。所有数据的获取方式和测定方法详见Cai等(2014a)和国家环保总局(2002)。

1.2 生物指数

本研究将大型底栖动物划分为5个功能摄食群: 肉食者、杂食者、浮游生物食者、植食者、碎屑食者。摄食均匀度指数的计算公式如下所示。

$$bH'_{FD} = -\sum_{i=1}^n (p_i \log_2 p_i) \quad (1)$$

式中, p_i 为样方中第*i*个摄食群的生物量所占的比例, n 等于5。 b_{jFD} 值对应的样点扰动等级及生态质量评价标准详见Peng等(2013)。

图1 2011年5月和9月航次渤海湾采样点示意图

Fig. 1 Sampling stations for the voyages of May and September, 2011 in the Bohai Bay.

$$bj_{FD} = \frac{bH_{FD}}{\log_2 n} \quad (2)$$

1.3 重金属潜在生态风险指数

为探讨沉积物中的重金属对大型底栖动物群落的影响,引入潜在生态风险指数(potential ecological risk index, RI; Hakanson, 1980)。本研究选用Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、As来计算风险指数;用RI值判断各样点生态风险强度的阈值分级标准参照方明等(2013)。其计算公式如下:

$$f_i = C_i/B_i \quad (3)$$

$$E_i = T_i \times f_i \quad (4)$$

$$RI = \sum_{i=1}^n E_i \quad (5)$$

式中, f_i 为重金属 i 的污染系数; C_i 为沉积物中重金属 i 的实测值; B_i 为重金属 i 的背景值; E_i 为重金属 i 的生态风险系数; T_i 为重金属 i 的毒性响应系数; RI 为所有重金属生态风险系数的总和。Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、As 的毒性响应系数分别取 5.00、5.00、1.00、30.00、2.00、10.00, 其中, Cu、Zn、Pb、Cd、Cr 的背景值上限分别为 26.26、75.00、17.31、0.14、60.00 mg/kg (陈静生和周家义, 1992; 李淑媛等, 1995), As 取工业化以前的背景值上限, 为 15 mg/kg (Hakanson, 1980)。

1.4 数据处理

考虑到关键种在食物链中的特殊地位, 本研究仅采用任一样点中栖息密度占该点总栖息密度比例大于 5% 的物种进行功能摄食群的分析 (Peng et al, 2013)。采用 ANOVA 分析及一元线性回归法检验各指数的季节性差异以及 bj_{FD} 与 M-bAMBI 之间的相

关性。采用 Pearson 分析检验指数与环境因子之间的相关性。上述分析均在 SPSS 13.0 软件包中进行。群落结构分析采用聚类法。数据分析前, 原始栖息密度数据经平方根转换后, 以 Bray-Curtis 相似性为基础构建相似性矩阵, 在 53.00% 的相似性基础上对所有样点进行分组。在聚类分析的基础上, 应用 ANOSIM 分析来检验各聚类组之间物种组成的差异。用 BEST 分析检验影响生物指数变化的主要环境压力, 而生物指数与重金属潜在生态风险指数之间的相关性则采用 RELATE 来分析。SIMPER 分析被用来计算各底栖动物对样本组间差异性和组内相似性的平均贡献率 (周红和张志南, 2003)。以上分析均在 PRIMER 6.0 中进行。

2 结果

2.1 渤海湾大型底栖动物摄食群概况

2.1.1 摄食群多样性分析

本研究中大型底栖动物可分为肉食者、碎屑食者、浮游生物食者和杂食者等 4 个摄食群 (表 1), 未发现植食者。由图 2 可知, 5 月航次浮游生物食者的生物量最高, 占比为 74.31%, 其次为杂食者, 占比为 16.39%, 碎屑食者最少, 占比为 4.35%; 9 月航次各类群摄食组成状况与 5 月航次的一致。与 5 月航次相比, 9 月份浮游生物食者和杂食者的生物量有所升高, 而肉食者和碎屑食者的生物量则有所下降。

2.1.2 摄食群的时空分布

5 月航次碎屑食者占优的样点主要分布在南北两端及海河口附近海域; 浮游生物食者占优的集中在研究区南北两端; 肉食者占优的则主要集中在研究区近岸海域; 杂食者分布整体上无明显的规律, 但在近岸海域基本上未见分布。9 月航次各摄食群的分布模式与 5 月份较为相似, 差别较大的地方在于碎屑食者的分布范围缩小且仅在海河口纵深线的样点占优, 而肉食者占优的则主要集中在离岸海域 (图 3)。

2.1.3 摄食群的结构分析

聚类分析结果表明, 5 月航次可以分为 3 个组, 组 I 包括海河口内的 S20^① 及 S21, 组 II 仅有 1 个样点即 S18, 剩余 40 个样点为第 III 组 (图 4a), 3 个组之间差异显著 ($R = 0.34, P < 0.05$); 9 月航次可以划分为 5 个组,

① 为避免引起歧义, 特在正文阐述中在样点名前添加“S”。如“S20”代表“station 20”, 下同。

表1 渤海湾主要大型底栖动物功能摄食群
Table 1 Functional feeding groups for the key macrozoobenthos species in the Bohai Bay

物种 Species	摄食群 Feeding group	物种 Species	食性 Feeding group
中华内卷齿虫 <i>Aglaophamus sinensis</i>	CA	双栉虫 <i>Ampharete acutifrons</i>	DE
日本鼓虾 <i>Alpheus japonicus</i>	CA	中华倍棘蛇尾 <i>Amphioplus sinicus</i>	DE
白毛钩虫 <i>Cabira pilargiformis</i>	CA	小双鳞蛇尾 <i>Amphipholis squamata</i>	DE
日本浪漂水虱 <i>Cirolana japonensis</i>	CA	小头虫 <i>Capitella capitata</i>	DE
小头栉孔鰕虎鱼 <i>Ctenotrypauchen chinensis</i>	CA	刚毛虫 <i>Chaetozone setosa</i>	DE
黄海埃刺梳磷虫 <i>Eherstleanira incisa hwanghaiensis</i>	CA	细丝鳃虫 <i>Cirratulus filiformis</i>	DE
内肋蛤 <i>Eocylichna braunsi</i>	CA	须鳃虫 <i>Cirriformia tentaculata</i>	DE
渤海格鳞虫 <i>Gattyana pohaiensis</i>	CA	三叶针尾涟虫 <i>Diastylis tricincta</i>	DE
长吻沙蚕 <i>Glycera chirori</i>	CA	内肋蛤 <i>Endopleura lubrica</i>	DE
锥唇吻沙蚕 <i>Glycera onomichiensis</i>	CA	塞切尔泥钩虾 <i>Eriopisella sechellensis</i>	DE
寡节甘吻沙蚕 <i>Glycinde gurjanovae</i>	CA	丝异须虫 <i>Heteromastus filiformis</i>	DE
日本角吻沙蚕 <i>Goniada japonica</i>	CA	异足科索沙蚕 <i>Kuwaita heteropoda</i>	DE
色斑角吻沙蚕 <i>Goniada maculata</i>	CA	中华后指虫 <i>Laonice sinica</i>	DE
软背鳞虫 <i>Lepidonotus helotypus</i>	CA	短吻铲莱鎰 <i>Listriolobus brevirostris</i>	DE
含糊拟刺虫 <i>Linopherus ambigua</i>	CA	中国索沙蚕 <i>Lumbrineris sinensis</i>	DE
岩虫 <i>Marphysa sanguinea</i>	CA	索沙蚕属一种 <i>Lumbrineris</i> sp.	DE
红带织纹螺 <i>Nassarius succinctus</i>	CA	尖叶长手沙蚕 <i>Magelona cincta</i>	DE
全刺沙蚕 <i>Nectoneanthes oxypoda</i>	CA	彩虹明樱蛤 <i>Moerella iridescens</i>	DE
纽虫一种 <i>Nemertinea</i> sp.	CA	多齿沙蚕 <i>Nereis multignatha</i>	DE
寡鳃齿吻沙蚕 <i>Nephtys oligobranchia</i>	CA	背蚓虫 <i>Notomastus latericeus</i>	DE
狭细蛇潜虫 <i>Ophiodromus angustifrons</i>	CA	豆形核桃蛤 <i>Nucula faba</i>	DE
拟特须虫 <i>Paralacydonia paradoxa</i>	CA	梳鳃虫 <i>Terebellides stroemii</i>	DE
格陵兰半突虫 <i>Phyllodoce groenlandica</i>	CA	对称拟蚶 <i>Arcopsis symmetrica</i>	DE
乳突半突虫 <i>Phyllodoce papillosa</i>	CA	双纹须蚶 <i>Barbatia bistrigata</i>	DE
肥壮巴豆蟹 <i>Pinnixa tumida</i>	CA	大螺赢蜚 <i>Corophium major</i>	PL
耳口露齿螺 <i>Ringicula doliaris</i>	CA	中华螺赢蜚 <i>Corophium sinensis</i>	PL
深钩毛虫 <i>Sigambra bassi</i>	CA	小刀蛭 <i>Cultellus attenuatus</i>	PL
叉毛卷须虫 <i>Cirrophorus furcatus</i>	OM	津知圆蛤 <i>Cycladicama tsuchi</i>	PL
异足倒颚蟹 <i>Asthenognathus inaequipes</i>	OM	凸镜蛤 <i>Dosinia derupta</i>	PL
黄色刺沙蚕 <i>Neanthes flava</i>	OM	细螯虾 <i>Leptochela gracilis</i>	PL
豆形拳蟹 <i>Philyra pisum</i>	OM	微黄镰玉螺 <i>Lunatia yokoyamai</i>	PL
扁形动物门一种 <i>Platyhelminthes</i> sp.	OM	长偏顶蛤 <i>Modiolus elongatus</i>	PL
杂毛虫属一种 <i>Poecilochaetus</i> sp.	OM	凸壳肌蛤 <i>Musculus senhousei</i>	PL
锯额瓷蟹 <i>Porcellana serratifrons</i>	OM	黑龙江篮蛤 <i>Potamocorbula amurensis</i>	PL
绒毛细足蟹 <i>Raphidopus ciliatus</i>	OM	光滑篮蛤 <i>Potamocorbula laevis</i>	PL
哈氏刻肋海胆 <i>Temnopleurus hardwickii</i>	OM	秀丽波纹蛤 <i>Raetellops pulchella</i>	PL
短角双眼钩虾 <i>Ampelisca brevicornis</i>	DE	金星碟铰蛤 <i>Trigonothracia jinxiingae</i>	PL

CA: 肉食者; OM: 杂食者; DE: 碎屑食者; PL: 浮游生物食者
CA, Carnivorous group; OM, Omnivorous group; DE, Detritivorous group; PL, Planktivorous group

其中组I包括研究区北部离岸海域的S5、S9及S14, 组II包括研究区北部靠岸海域的S2、S17、S22、S24 及S43, 组III包括S6等22个样点, 组IV包括海河口 及附近海域的S20、S21及S31, 组V包括S1等10个样

图2 渤海湾大型底栖动物功能摄食群组成

Fig. 2 The macrozoobenthos feeding group composition in the Bohai Bay

点(图4b), 5个组之间差异显著($R = 0.06$, $P < 0.01$)。SIMPER分析表明, 两个航次不同样点大型底栖动物群落的相似性均较低(5月: 36.39%; 9月: 33.45%), 对相似性贡献最高的均为杂食者和肉食者, 二者贡献率超过60.00%。两个季节间相比, 大型底栖动物群落的平均相似性较高(64.80%), 对群落相似性贡献最高的是杂食者(35.68%)和浮游生物食者(34.58%), 季节间的群落差异不显著($P > 0.05$)。

2.2 基于摄食均匀度指数(b_{jFD})的渤海湾生态质量评价

5月航次中, b_{jFD} 的最高值在调查区北部海域的S42, 生物群落受到轻度干扰, 生态质量为“良”; 最低值在海河口入海纵深线的S18以及海河口内的

S20、S21, 生态质量为“劣”, 余下样点中, b_{jFD} 位于0.60–0.80之间的有3个, 生态质量为“良”; 0.40–0.60的有8个, 生态质量“中等”; 0.20–0.40的有13个, 生态质量“差”; 小于0.20的占比最多, 共15个, 生态质量为“劣”(表2)。9月航次中, b_{jFD} 的最高值在调查区北部离岸海域的S13, 生态质量为“良”; 最低值在离岸海域的S5、S14、S34以及海河口南侧靠岸海域的S27, 生态质量为“劣”。余下样点中, b_{jFD} 位于0.60–0.80之间的有8个, 生态质量为“良”; 0.40–0.60的有4个, 生态质量“中等”; 0.20–0.40的有14个, 生态质量“差”; 小于0.20的占比最多, 共16个, 生态质量为“劣”(表2)。两个航次相比, 9月航次“差”及“劣”的样点比例有所升高, 指示整体上生态质量状况略差于5月份。总体上, 两个航次37个相同样点的 b_{jFD} 平均值最高值在北部海域的S8 (0.68), 生态质量为“良”, 最低值在海河口内的S20 (0.00), 生态质量为“劣”, 余下35个样点的 b_{jFD} 平均值均低于0.60, 即生态质量均处于“中等”以下, 一定程度上说明研究区的大型底栖动物群落均受到不同程度的干扰, 生态质量较差。从空间分布的角度来看, 两个航次 b_{jFD} 低值区均主要集中在海河口、北塘口及其附近海域, 整体上高、低值区呈斑块状分布(图5a)。

与M-bAMBI相比, 除“良”的样点分布范围大于 b_{jFD} 的外, 二者的空间分布模式基本一致。Pearson和一元线性回归分析表明, b_{jFD} 与M-bAMBI呈显著线性相关($df_1 = 1$, $df_2 = 84$, $P < 0.01$; 图6)。ANOVA分析表明, M-bAMBI指示2个航次大型底栖

图3 2011年5月和9月航次各功能摄食群的空间分布

Fig. 3 Spatial distributions of the functional feeding groups in the voyages of May and September, 2011.

图4 2011年5月(a)和9月(b)航次摄食均匀度指数聚类分析结果
Fig. 4 Cluster analysis on the bj_{FD} for the voyages of May and September, 2011 in the Bohai Bay. a, May; b, September.

表2 渤海湾各样点摄食均匀度指数值

Table 2 The values of the feeding evenness index for all the stations in the Bohai Bay

样点 Station	5月 May	9月 September	样点 Station	5月 May	9月 September	样点 Station	5月 May	9月 September	样点 Station	5月 May	9月 September
1	0.38	0.73	14	0.08	0.00	27	0.30	0.00	40	0.19	0.46
2	0.14	0.24	15	0.49	0.28	28	0.31	0.07	41	—	0.06
3	0.55	—	16	0.45	0.71	29	0.38	0.01	42	0.75	0.21
4	0.16	—	17	0.11	0.15	30	0.66	0.01	43	0.27	0.05
5	0.38	0.00	18	0.00	0.64	31	—	0.11	44	—	0.50
6	0.02	0.18	19	0.40	0.06	32	0.04	0.11	45	—	0.35
7	0.44	0.13	20	0.00	0.00	33	0.14	0.27	47	0.33	—
8	0.61	0.76	21	0.00	0.36	34	0.08	0.00	48	0.18	—
9	0.06	0.04	22	0.48	0.64	35	0.45	0.06	49	0.37	—
10	0.27	0.28	23	0.15	0.58	36	—	0.31	50	0.42	—
11	0.06	0.05	24	0.15	0.19	37	0.38	0.64			
12	0.31	0.31	25	0.08	0.18	38	0.64	0.37			
13	0.30	0.78	26	—	0.62	39	0.22	0.43			

“—”表示某一航次未在该样点取样
“—” representing not sampled in the station for the voyage

图5 2011年5月和9月航次的渤海湾各样点 b_{jFD} (a)和M-bAMBI (b)空间分布

Fig. 5 Spatial distributions of b_{jFD} (a) and M-bAMBI (b) for each sampling station for the voyages of May and September, 2011 in the Bohai Bay

图6 渤海湾2011年5月和9月航次M-bAMBI和 b_{jFD} 线性回归分析

Fig. 6 Linear regression analysis on the M-bAMBI and b_{jFD} for the voyages of May and September, 2011 in the Bohai Bay

动物群落存在显著的差异($P < 0.01$), 而 b_{jFD} 的则显示不存在($P > 0.05$)。特别地, b_{jFD} 能敏感地指示海河口及北塘口生态质量明显差于其他区域, 但M-bAMBI却并未明显区分出来(图5b)。

2.3 大型底栖动物摄食群与环境参数的关系

5月航次生态风险指数(RI)位于41.08–168.14之间, 平均值为86.62。其中, 位于海河口北侧靠岸海域的S10处于中等重金属生态风险水平, 余下42个样点均处于低生态风险水平。与5月航次相比, 9月航次6种重金属的RI取值范围在45.19–224.29之间, 平均值为98.91。除了调查区北侧靠岸海域的S5及东南离岸海域的S40处于中等水平外, 余下40个样点的生态风险状态均处于低水平。两个航次对RI贡献

最大的均为Cd, 5月航次S6、S10的毒性系数最高, 达到强生态风险水平; 9月航次则是S5的毒性系数最高, 达到极强的风险水平。从空间分布的角度来看, 5月航次RI高值区集中在海河口和北塘口附近海域, 且沿着其向外有明显的空间分布梯度; 低值区则无明显分布规律(图7a)。9月航次的RI分布整体无明显规律, 但海河口区的也明显较低(图7b), 这与 b_{jFD} 在该处值较低的空间分布模式一致。

Pearson分析表明, b_{jFD} 与表层水中的Pb ($R = -0.248$, $P < 0.05$)及Cd ($R = -0.228$, $P < 0.05$)呈显著负相关。BEST分析表明, 9月航次底层水的盐度和温度及表层水的Cd、Sn及Sb是解释 b_{jFD} 变化的最佳环境因子; 5月航次水体深度、表层水中的亚硝酸盐、总磷、Al、As、Sn及底层水中的pH是解释其变化的最佳环境因子。RELATE分析表明, 5月航次RI矩阵与 b_{jFD} 矩阵显著相关($R = 0.13$, $P < 0.05$)。

3 讨论

3.1 渤海湾大型底栖动物摄食群概况

功能摄食群与其生存的环境密切相关。本研究区域未发现植食者, 可能与渤海湾浊度较高且其底质不适合藻类生长有关, 类似的情况也发生在九龙江口^①。同时, 这也在一定程度上说明渤海湾生态环

① 王蔚颖 (2014) 大型底栖动物生态学研究. 硕士学位论文, 华东师范大学, 上海。

图7 渤海湾2011年5月(a)和9月(b)航次生态风险指数(RI)空间分布

Fig. 7 Spatial distribution of the risk index for the voyages of May (a) and September (b), 2011 in the Bohai Bay

境恶化对该海域的底栖动物产生了不可逆的作用(Peng et al, 2013)。与20世纪50年代相比, 本研究中大型底栖动物群落的生物多样性明显降低, 且以小型机会种多毛类居多(Zhou et al, 2007), 但由于多毛类生物量较低, 故此两个航次碎屑食者的比例最小。

底质特征是控制大型底栖动物群落分布的关键环境因子(Sanders, 1956)。渤海湾沿岸河流输入的大量细颗粒泥沙为营埋栖生活的小型双壳类、甲壳类等提供了良好的栖息环境, 加上沉积环境的改变可能会导致个别物种获得迅速拓殖的机会, 如营浮游生物食性的凸壳肌蛤(*Musculus senhousiei*)和长偏顶蛤(*Modiolus elongates*)以及营杂食性的光滑河篮蛤(*Potamocorbula laevis*; 蔡文倩等, 2013), 群落结构指标如生物量、栖息密度、物种数等迅速升高, 这直接导致了本研究两个航次均以浮游生物食者和杂食者的生物量占比最高。

已有研究证实, 渤海湾主要的人为干扰之一为陆源排污, 河口区及近岸海域的大型底栖动物群落因此而受到较大的干扰(蔡文倩等, 2012), 群落组成基本以主营碎屑食者的多毛类为主, 如本研究海河口碎屑食者占优所示。同时, 渤海湾大量围海造陆工程和航道疏浚带来的泥沙堆积在南北两岸及海河口附近海域(蔡文倩等, 2013), 造成主营浮游生物食性的小型双壳类大量栖居于此。研究证实, 海河口及其北部附近海域作为渤海湾污染最为严重的区域之一, 其生态干扰呈现明显的空间分布梯度模

式(刘成等, 2003; 秦延文等, 2012), 而本研究中聚类分析亦证实海河口、海河北部近岸海域及离岸海域底栖动物功能摄食群的显著差异, 这也与建立在分类学方法上的生物多样性指数评价结果一致(蔡文倩等, 2012)。

3.2 摄食均匀度指数在渤海湾生态质量状况评价中的适用性

大多数学者已证实渤海湾生态环境恶化, 底栖动物群落变化较大(Zhou et al, 2007; 蔡文倩等, 2012, 2013), 如 b_{jFD} 指示的研究区大型底栖动物群落受到较为严重的干扰所示。北塘口和大沽排污口(海河口)自2003年以来一直是渤海湾氮、磷污染严重区域, 水动力条件的变化导致营养盐堆积在渤海湾北部海域(秦延文等, 2012)。因此, 这两个区域的北部地区生态质量状况较差(Cai et al, 2015), 而 b_{jFD} 能较为敏感地响应这种状况, 如其低值区集中在这两个区域。然而, M-bAMBI却对这两处较差的环境指示作用较弱, 这跟建立在分类学方法上的指数适用于评价中等或差的生态质量状况有关(Gamito & Furtado, 2009), 如建立在栖息密度基础上的M-AMBI也对这两处的环境质量变化的敏感性相对较差, 这已被其他研究证实(Cai et al, 2014a)。

事实上, 基于栖息密度构建的摄食均匀度指数及基于栖息密度和生物量构建的多元AZTI海洋生物指数均适用于评价渤海湾生态质量状况(Peng et al, 2013; Cai et al, 2014a)。本研究中, b_{jFD} 与M-bAMBI的评价结果也基本一致, 明显的差别在

于M-bAMBI能区分底栖动物群落季节性差异,这可能与两者建立依据的原理不同有关。 b_{jFD} 建立在功能摄食群基础上,而物种功能群的划分依据的是底栖动物不同时期的摄食行为,不会随着季节的变化而有所改变;但M-bAMBI建立在群落结构指标上,而这些指标如多样性指数对季节变化较为敏感。

3.3 渤海湾摄食群与环境参数的关系

入海河流携带大量的营养盐和污染物进入渤海湾,加之沿岸水动力条件的变化,导致营养盐堆积在近岸海域,使得该海域的富营养化状况不断恶化(Liu et al, 2011)。富营养化会在一定程度上削弱硅藻食物链,进而导致鱼类减少(许思思, 2011)。捕食天敌的减少使得主营杂食和浮游生物食性的甲壳、软体动物等迅速增殖,也使得杂食者和浮游生物食者在大型底栖动物类群中占优。此外,水体中总氮和总磷过高会导致一些大型底栖动物种类的消失,而使另一些耐污种的生物量增加^①,如本研究中营浮游生物食性的小型双壳类凸壳肌蛤(耐污种)占绝对优势。

温度波动是引起饵料生物桡足类生理活动变化的重要因素之一,在一定的适宜温度范围内,摄食率随温度的升高而加大(Huntley & Lopez, 1992)。在一定的梯度内,盐度越低,鱼类的活动能力和摄食量则会持续降低(张雅芝等, 2009)。这些均通过食物链的传递方式进而影响到底栖动物的摄食群组成,如本研究中温度和盐度对功能摄食群的影响所示。研究表明,重金属污染能在底栖动物的内脏及组织内积累(Sola & Prat, 2006),阻碍其生长、繁殖,降低大型底栖动物群落密度及生物多样性,同时造成群落组成由敏感种向耐污种转化,底栖动物种群产生一定程度的衰退(Maret et al, 2003; Gray & Delaney, 2008)。本研究中重金属与 b_{jFD} 的相关关系也印证了渤海湾重金属污染已干扰到栖息于此的大型底栖动物群落(刘成等, 2003)。此外,研究也表明Zn和Pb高值区分别集中在河口区及北部区域(秦延文等, 2012),这两个区域的生态风险指数也较低,而 b_{jFD} 的低值区与之吻合也验证了上述结论。特别地,渤海湾沉积物中的Cd含量远高于背景值,且其毒性系数较高(秦延文等, 2012),使得两个航次该元

素的生态风险均最高,可能已经影响了栖居于此的大型底栖动物群落功能,如该元素是解释 b_{jFD} 变化的最佳环境因子之一所示。

3.4 渤海湾底栖生物评价方法的历史演变趋势

渤海湾底栖生物评价方法的发展历程与国内外河口海湾(如厦门湾)生物评价方法的总体演变历程一致(朱延忠等, 2015),也经历了从二十世纪八九十年代以前的比对大型底栖动物群落结构特征变化趋势、个别指示种的有无等来初步判断栖居地的生态质量演变状况(崔玉珩和孙道元, 1983; 孙道元和刘银城, 1991)。90年代以后,学者们开始广泛地采用国外较为成熟的单因子指数(如Shannon-Wiener生物多样性指数)、图形法(丰度/生物量曲线)、AZTI海洋生物指数等(Cai et al, 2014a, b, 2015),这其中不仅有对各类指数的直接使用(张培玉, 2005),也有对个别指数的改良,包括图形法的数据化(Cai et al, 2014b)、引入新的群落指标(生物量, Cai et al, 2014a)以及采用不同前处理方式对群落指标数据处理后再构建生物指数等(Cai et al, 2015)。结果表明,相比Shannon-Wiener生物多样性指数及图形法, AZTI海洋生物指数对该海域环境质量演变趋势更为敏感,且以生物量构建的M-bAMBI更优(Cai et al, 2015)。

然而,目前的渤海湾底栖生态质量评价基本以建立在群落结构基础上的生物指数为主,缺少建立在群落功能基础上的生物指数评价效果研究,而本研究恰恰从群落功能的角度对渤海湾生态质量进行评价,取得了较好的效果,可为该海域底栖生态质量评价方法研究提供案例支撑。但是,任何一种指数都不是万能的,只有综合使用各类指数才能更精准地指示研究区的生态质量(Dauer et al, 1993)。

致谢: 感谢中国科学院海洋研究所张宝琳老师、张均龙副研究员、隋吉星博士、肖宁博士等在大型底栖动物分类上的无私帮助,并特别感谢隋吉星博士赠与关键的功能摄食类群文献。

参考文献

- Borja Á (2014) Grand challenges in marine ecosystems ecology. *Frontiers in Marine Science*, 1, 1–6.
Cai WQ, Liu LS, Qiao F, Lin KX, Zhou J (2012) Study on the changes of macrobenthos communities and their causes in Bohai Bay. *Environmental Science*, 33, 3104–3109. (in

① 刘立杰 (2010) 黄河三角洲湿地大型底栖动物时空变化规律及其功能群研究. 硕士学位论文, 山东农业大学, 泰安.

- Chinese with English abstract) [蔡文倩, 刘录三, 乔飞, 林岍璇, 周娟 (2012) 渤海湾大型底栖生物群落结构变化及原因探讨. *环境科学*, 33, 3104–3109.]
- Cai WQ, Meng W, Liu LS, Zhu YZ, Zhou J (2013) Long-term trends of the dominant macrozoobenthos in Bohai Bay. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 33, 2332–2340. (in Chinese with English abstract) [蔡文倩, 孟伟, 刘录三, 朱延忠, 周娟 (2013) 渤海湾大型底栖动物群落优势种长期变化研究. *环境科学学报*, 33, 2332–2340.]
- Cai WQ, Borja Á, Liu LS, Muxika I, German JR (2014a) Assessing benthic health under multiple human pressures in Bohai Bay (China), using density and biomass in calculating AMBI and M-AMBI. *Marine Ecology*, 35, 180–192.
- Cai WQ, Meng W, Liu LS, Lin KX (2014b) Evaluation of the ecological status with benthic indices in the coastal system: the case of Bohai Bay (China). *Frontiers of Environmental Science and Engineering*, 8, 737–746.
- Cai WQ, Borja Á, Lin KX, Zhu YZ, Zhou J, Liu LS (2015) Assessing the benthic quality status of the Bohai Bay (China) with proposed modifications of M-AMBI. *Acta Oceanologica Sinica*, 34(10), 111–121.
- Chen JS, Zhou JY (1992) Study on the Heavy Metals in the Chinese Watershed. China Environmental Science Press, Beijing. (in Chinese) [陈静生, 周家义 (1992) 中国水环境重金属研究. 中国环境科学出版社, 北京.]
- Cui YH, Sun DY (1983) Preliminary report on the macrobenthos in the outlets of Bohai Bay. *Marine Sciences*, (3), 29–35. (in Chinese) [崔玉珩, 孙道元 (1983) 渤海湾排污区底栖动物调查初步报告. *海洋科学*, (3), 29–35.]
- Dauer DM, Luckenbach MW, Rodi AJ (1993) Abundance-biomass comparison (ABC method): effects of an estuarine gradient, anoxic/hypoxic events and contaminated sediments. *Marine Biology*, 116, 507–518.
- Fang M, Wu YJ, Liu H, Jia Y, Zhang Y, Wang XT, Wu MH, Zhang CL (2013) Distribution, sources and ecological risk assessment of heavy metals in sediments of the Yangtze River estuary. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 33, 563–569. (in Chinese with English abstract) [方明, 吴友军, 刘红, 贾英, 张媛, 王学彤, 吴明红, 张春雷 (2013) 长江口沉积物重金属的分布、来源及潜在生态风险评价. *环境科学学报*, 33, 563–569.]
- Gamito S, Furtado R (2009) Feeding diversity in macroinvertebrate communities: a contribution to estimate the ecological status in shallow waters. *Ecological Indicators*, 9, 1009–1019.
- Gamito S, Patrício J, Neto JM, Teixeira H, Marques JC (2012) Feeding diversity index as complementary information in the assessment of ecological quality status. *Ecological Indicators*, 19(8), 73–78.
- Gray NF, Delaney E (2008) Comparison of benthic macroinvertebrate indices for the assessment of the impact of acid mine drainage on an Irish river below an abandoned Cu-S mine. *Environmental Pollution*, 155, 31–40.
- Hakanson L (1980) An ecological risk index for aquatic pollution control: a sedimentological approach. *Water Research*, 14, 975–1001.
- Hoey GV, Permy DC, Vandendriessche S, Vincx M, Hostens K (2013) An ecological quality status assessment procedure for soft-sediment benthic habitats: weighing alternative approaches. *Ecological Indicators*, 25, 266–278.
- Huntley ME, Lopez MGD (1992) Temperature dependent production of marine copepods: a global synthesis. *The American Naturalist*, 140, 202–242.
- Li SY, Miao FM, Liu GX, Hao J (1995) Preliminary study on the environmental background values of heavy metals in the Bohai Sea. *Acta Oceanologica Sinica*, 17(2), 78–85. (in Chinese) [李淑媛, 苗丰民, 刘国贤, 郝静 (1995) 渤海底质重金属环境背景值初步研究. *海洋学报*, 17(2), 78–85.]
- Liu C, Wang ZY, He Y, Wu YS (2003) Investigation on sediment quality of the river mouths around Bohai Bay. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 23, 58–63. (in Chinese with English abstract) [刘成, 王兆印, 何耘, 吴永胜 (2003) 环渤海湾诸河口底质现状的调查研究. *环境科学学报*, 23, 58–63.]
- Liu SG, Lou S, Kuang CP, Huang WR, Chen WJ, Zhang JL, Zhong GH (2011) Water quality assessment by pollution-index method in the coastal waters of Hebei Province in western Bohai Sea, China. *Marine Pollution Bulletin*, 62, 2220–2229.
- Maret TR, Cain DJ, MacCoy DE (2003) Response of benthic invertebrate assemblages to metal exposure and bioaccumulation associated with hard-rock mining in northwestern streams, USA. *Journal of the North American Benthological Society*, 22, 598–620.
- Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of China (2002) Determination Methods for Examination of Water and Wastewater. China Environmental Science Press, Beijing. (in Chinese) [国家环保总局 (2002) 水和废水监测分析方法. 中国环境科学出版社, 北京.]
- Muxika I, Borja Á, Bald J (2007) Using historical data, expert judgement and multivariate analysis in assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European Water Framework Directive. *Marine Pollution Bulletin*, 55, 16–29.
- Ning X, Lin C, Su J, Liu CG, Hao Q, Le FF, Tang QS (2010) Long-term environmental changes and the responses of the ecosystems in the Bohai Sea during 1960–1996. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 57, 1079–1091.
- Peng ST, Zhou R, Qin XB, Shi HH, Ding DW (2013) Application of macrobenthos functional groups to estimate the ecosystem health in a semi-enclosed bay. *Marine Pollution Bulletin*, 74, 302–310.
- Qin YW, Zhang L, Zheng BH, Cao W, Liu XB, Jia J (2012) Impact of shoreline changes on the coastal water quality of Bohai Bay (2003–2011). *Acta Scientiae Circumstantiae*, 32, 2149–2159. (in Chinese with English abstract) [秦延文, 张雷, 郑丙辉, 曹伟, 刘宪斌, 贾静 (2012) 渤海湾岸线变

- 化(2003–2011年)对近岸海域水质的影响. 环境科学学报, 32, 2149–2159.]
- Sanders HL (1956) Oceanography of Long Island Sound, 1952–4, X. The biology of marine bottom communities. Bulletin of the Bingham Oceanographic Collection, 15, 345–414.
- Sola C, Prat N (2006) Monitoring metal and metalloid bioaccumulation in *Hydropsyche* (Trichoptera, Hydropsychidae) to evaluate metal pollution in a mining river. Whole body versus tissue content. Science of the Total Environment, 359, 221–231.
- Steneck RS, Watling L (1982) Feeding capabilities and limitations of herbivorous molluscs: a functional group approach. Marine Biology, 68, 299–319.
- Sun DY, Liu YC (1991) Species composition and quantitative distributions of biomass and density of the microbenthic infauna in the Bohai Sea. Journal of Oceanography of Huanghai & Bohai Seas, 9(1), 42–50. (in Chinese with English abstract) [孙道元, 刘银城 (1991) 渤海底栖动物种类组成和数量分布. 黄渤海海洋, 9(1), 42–50.]
- Warwick RM, Clarke KR, Somerfield PJ (2010) Exploring the marine biotic index (AMBI): variations on a theme by Ángel Borja. Marine Pollution Bulletin, 60, 554–559.
- Wu ZL, Zhang SY, Chen Y, Bi YX (2015) Analysis of functional feeding groups of macroinvertebrates communities in the macroalgae beds of Gouqi Island, Zhejiang Province. Journal of Fisheries of China, 39, 382–391. (in Chinese with English abstract) [吴祖立, 章守宇, 陈彦, 毕远新 (2015) 枸杞岛海藻场大型底栖无脊椎动物摄食类群研究. 水产学报, 39, 382–391.]
- Xu SS (2011) Decline Mechanisms of Fishery Resources in the Bohai Sea Under Anthropogenic Activities. PhD dissertation, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Beijing. (in Chinese with English abstract) [许思思 (2011) 人为影响下渤海渔业资源的衰退机制. 博士学位论文, 中国科学院海洋研究所, 青岛.]
- Zhang PY (2005) Studies on Ecology of Zoobenthos and Environmental Quality Assessment in Coastal Waters of Bohai Bay. PhD dissertation, Ocean University of China, Qingdao. (in Chinese with English abstract) [张培玉 (2005) 渤海湾近岸海域底栖生物生态学与环境质量评价研究. 博士学位论文, 中国海洋大学, 青岛.]
- Zhang YZ, Liu DE, Fang QS, Wang HS, Qin ZQ (2009) Effects of temperature and salinity on growth and survival rate of young *Epinephelus coioides*. Journal of Jimei University, 14(1), 8–13. (in Chinese with English abstract) [张雅芝, 刘冬娥, 方琼珊, 王涵生, 秦志清 (2009) 温度和盐度对斜带石斑鱼幼鱼生长与存活的影响. 集美大学学报, 14(1), 8–13.]
- Zhou H, Zhang ZN (2003) Rationale of the multivariate statistical software PRIMER and its application in benthic community ecology. Journal of Ocean University of Qingdao, 33, 58–64. (in Chinese with English abstract) [周红, 张志南 (2003) 大型多元统计软件PRIMER的方法原理及在底栖群落生态学中的应用. 青岛海洋大学学报, 33, 58–64.]
- Zhou H, Zhang ZN, Liu XS, Tu LH, Yu ZS (2007) Changes in the shelf macrobenthic community over large temporal and spatial scales in the Bohai Sea, China. Journal of Marine Systems, 67, 312–321.
- Zhu YZ, Zhou J, Lin KX, Liu J, Cai WQ, Liu LS (2015) Assessment on the macrozoobenthos community health in Xiamen Bay using macrozoobenthos community index. Guangxi Sciences, 22, 549–557. (in Chinese with English abstract) [朱延忠, 周娟, 林岿璇, 刘静, 蔡文倩, 刘录三 (2015) 基于MCI的厦门湾大型底栖动物群落健康状况评价. 广西科学, 22, 549–557.]

(责任编辑: 李新正 责任编辑: 闫文杰)