•研究报告•

海南岛翼手目物种多样性现状与分布预测

胡宜峰¹ 余文华¹ 岳 阳¹ 黄正澜¹ 李玉春² 吴 毅^{1*}¹ (广州大学生命科学学院, 广州 510006)² (山东大学(威海)海洋学院, 山东威海 264209)

摘要: 海南岛位于我国南部, 地处热带北缘, 其独特的岛屿气候环境孕育了丰富的生物资源, 为我国生物多样性热点地区之一。为探究岛内的翼手目物种多样性状况, 本研究组使用雾网、蝙蝠竖琴网等工具, 于2002年至2016年先后对海南岛进行了15次翼手目多样性调查, 并根据其外形与头骨特征及系统发育学方法进行标本鉴定。共获取了1,025号标本, 隶属5科15属31种, 其中2016年12月21日在海南琼中捕获的艾氏管鼻蝠(*Murina eleryi*)为海南岛蝙蝠分布新记录。结合前人调查及发表结果统计, 岛内共有翼手类8科20属41种。同时基于本调查采集位点和前人调查位置信息(共计363个位点), 结合WorldClim 32种气候数据, 运用最大熵模型(MaxEnt)对海南岛翼手目物种的分布进行预测, 结果显示五指山、吊罗山、鹦哥岭、尖峰岭及海口火山口国家地质公园等地为翼手目物种多样性较丰富的区域, 而三亚、澄迈、屯昌、临高、琼海等地翼手目物种多样性较低。本研究结果为海南岛翼手目资源分布及多样性状况提供了基础资料, 也为岛内后续开展翼手目资源保护管理、蝙蝠疾病防控等提供了重要的参考依据。

关键词: 翼手目; 海南岛; 艾氏管鼻蝠; 物种多样性; 最大熵(MaxEnt)模型

Species diversity and potential distribution of Chiroptera on Hainan Island, China

Yifeng Hu¹, Wenhua Yu¹, Yang Yue¹, Zhenglany Huang¹, Yuchun Li², Yi Wu^{1*}¹ School of Life Sciences, Guangzhou University, Guangzhou 510006² Marine College, Shandong University, Weihai, Shandong 264209

Abstract: Hainan Island is a key biodiversity hotspot in China with a unique ecosystem and climate. In order to explore the species diversity of Chiroptera on the island, 15 bat surveys were carried out in the area between 2002 and 2016. During these surveys, mist nets, harp traps and other tools were deployed. Captured specimens were identified according to their external form, skull features and phylogenetic description. In total, 1,025 specimens from 5 families, 15 genera and 31 species were recorded and collected. On December 21, 2016, two small *Murina* bats were captured in a harp-trap in a forest at Chaocan Village, Qiongzong City, Hainan Province. Based on external, cranio-dental characteristics and phylogenetic evidence, the bats were identified as *Murina eleryi*. This is the first record of the species on Hainan Island. Based from our survey result and literature review, Chiroptera of Hainan Island consists of a total of 8 families 20 genera and 41 species. The potential distribution area of bats on Hainan Island was mapped using a maximum entropy (MaxEnt) model incorporating 363 local records, derived from our records and the literature. High diversity was predicted for Wuzhi Mountain, Diaoluo Mountain, Yinggeling, Jianfengling and Huoshankou National Geopark whereas the low diversity was predicted for Sanya, Chengmai, Tunchang, Lingao, Qionghai areas. Overall, baseline data for Chiroptera distribution, and resource status was assessed by the current study, which is useful for disease prevention, control, resource conservation and management on Hainan Island.

Key words: Chiroptera; Hainan Island; *Murina eleryi*; species diversity; maximum entropy (MaxEnt)

收稿日期: 2018-09-21; 接受日期: 2018-12-31

基金项目: 国家自然科学基金(31670381; 31672258)、国家自然科学基金国际合作项目(31110103910)、广州市科技计划科学研究专项(201607010299)和广州大学 2017 年度青年拔尖人才培养计划(BJ201707)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: wuyizhouq@263.net

翼手目是哺乳动物中仅次于啮齿目动物的第二大类群(Simmons, 2005), 我国总计8科135种(蒋志刚等, 2017)。翼手目种类作为唯一一类具有飞行能力的特殊哺乳动物, 习性独特, 生活环境隐蔽, 其基础本底资料相对匮乏。

海南岛为我国第二大岛(18°9′–20°11′ N, 108°36′–111°4′ E), 处于印度尼西亚—马来西亚热带区的北缘, 为我国典型热带气候区域之一, 年平均气温高, 降水量大(高素华等, 1988)。海南岛中南部由五指山、鹦哥岭、吊罗山、尖峰岭等山脉组成, 北部及岛屿四周则以丘陵、平原和滨海沙滩逐级过渡, 动物的种类、种群数量、地理分布在不同区域也有所不同(徐龙辉等, 1983; 高素华等, 1988; 颜家安, 2008; 车秀芬等, 2014), 是我国生物多样性最高的地区之一, 也是世界生物多样性研究和保护的热点地区(李玉春等, 2005; 史海涛等, 2011), 具有极高的研究价值。岛内翼手目的早期主要研究包括: 徐龙辉等(1983)在海南岛鸟兽调查中对翼手目的种类和分布进行了初步报道; 吴毅等(2003)对吊罗山保护区内翼手类物种多样性进行了初步研究; 李玉春等(2006a)对马鞍岭火山口保护区翼手目进行了调查报道; 朱斌良等(2008)对海南岛翼手目多样性状况进行了初步探讨; 李德伟等(2010)对海南岛翼手目的分布格局进行了研究。上述工作主要集中在部分地区且以洞穴型蝙蝠为主, 尚缺乏对全岛、以森林型蝙蝠为重点的专项研究。

本研究组从2002年起, 持续关注海南岛翼手目多样性状况, 除继续对洞穴型蝙蝠的研究外, 使用蝙蝠竖琴网重点对岛内森林型蝙蝠进行研究, 通过15次的野外调查, 共采集蝙蝠标本1,025号, 隶属5科15属31种。还结合前人文献资料对岛内翼手目物种多样性与分布状况进行梳理, 运用最大熵物种分布模型(MaxEnt)(Phillips et al, 2006)对该类群岛内潜在分布区进行预测, 进一步明确了翼手类在岛内的分布现状, 为后续该类群针对性调查提供借鉴与指引, 还能够为该类群日后的保护管理、深入研究及以蝙蝠为媒介的疾病防控提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 标本的采集及物种鉴定

课题组在2002至2016年间进行了15次海南岛翼手目资源调查, 调查范围覆盖海南岛内的主要保

护区。使用手网、雾网和竖琴网等工具进行采集捕捉, 参照哺乳动物测量标准(杨奇森等, 2007), 对采集到的标本进行外部形态与头骨测量, 并进行物种鉴定(刘少英和吴毅, 2019)。外部形态测量指标包括: 前臂长(forearm length)、尾长(tail length)、后足长(hindfoot length)、胫骨长(tibia length)、耳长(ear length); 头骨测量指标包括: 颅全长(greatest length of skull)、枕犬长(condylo-canine length)、颧宽(zygomatic width)、眶间宽(interorbital of width)、脑颅高(braincase height)、腭长(palate length)、上齿列长(upper canine-third molar length)、上犬齿宽(rostrum width across upper canines)、上臼齿宽(width across third upper molars)、上犬齿前臼齿长(upper canine-premolar length)、下犬齿前臼齿长(lower canine-premolar length)、下齿列长(lower canine-third molar length)、下颌长(mandibular length)、下颌高(mandibular height)。

在经初步形态鉴定后, 对部分存疑的标本进一步使用系统发育学方法辅助物种鉴定: 剪取约20 mg肌肉组织, 利用TaKaRa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit (TAKARA, 大连)提取总DNA; 使用引物(*COI*-f: 5'-ACA GCC TAA TAC CTA CTC GGC CAT T-3'和*COI*-r: 5'-AGG CTC GGG TGT CTA CGT CCA-3')扩增线粒体*COI*基因(约641 bp); 测序工作由上海美吉生物医药科技有限公司完成; 将测序结果在GENEIOUS 5.4 (Drummond et al, 2011)中进行目测校对与拼接, 联合GenBank数据库中467条管鼻蝠线粒体*COI*基因序列使用Muscle (Edgar, 2004)进行排序, 使用ModelTest确定最优化核苷酸替换模型(Posada & Crandall, 1998), 在MEGA 6.0软件中采用邻接法(neighbour-joining method)构建系统发育树(Saitou & Nei, 1987), 自展(bootstraps) 500次估计其系统发生树的节点支持度。

1.2 海南岛蝙蝠多样性状况汇总分析及潜在空间分布的预测

为更好地了解翼手目在海南岛的分布状况, 对课题组采集的标本及海南岛现有的翼手目历史分布记录进行梳理汇总(寿振黄等, 1966; 徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 江海声等, 2006; 李玉春等, 2006a, b; 余文华等, 2008; 张礼标等, 2008; 朱斌良等, 2008; 朱光剑等, 2008a, b; 李德伟

等, 2010; Wu et al, 2010, 2012; 蒋志刚等, 2015; 胡宜峰等, 2018; Yu et al, 2018), 依据《中国动物地理》(张荣祖, 1999)和《中国脊椎动物红色名录》(蒋志刚等, 2016)对物种区系及濒危等级进行划分。

本研究汇总课题组实地调查及前人记录的GPS信息点共363个, 运用MaxEnt模型(Phillips et al, 2006)重建该类群在岛内的适生区域。将世界气候数据库(Worldclim version 1.3, <http://www.worldclim.org>; Hijmans et al, 2005)中的32个精度为30" (约1 km²)的海拔、气候与降雨因子汇同分布点导入MaxEnt软件以重建类群适生分布区域, 使用刀切法(Jackknife test)评估温度、降雨量及海拔等因子的重要性(附录1), 随机检验百分比(random test percentage)设置为25%, 重复设置为10次, 重复类别为Subsample, 采用ROC曲线(受试者工作特征曲线)下面积(area under the receiving operator curve, AUC)对预测精度进行评价。

2 结果

2.1 海南岛蝙蝠物种多样性状况

本研究在2002年至2016年间共捕获蝙蝠标本1,025只, 经鉴定, 隶属5科15属31种。结合前人资料, 迄今海南岛记录翼手目8科20属41种, 占中国翼手目种类的30.4%。其中蝙蝠科种类最多, 达24种, 占海南岛翼手目种类的58.5%; 蹄蝠科种类次之, 共5种, 占12.2%; 菊头蝠科4种, 占9.8%; 长翼蝠科3种, 占7.3%; 狐蝠科2种, 占4.9%; 鞘尾蝠科、犬吻蝠科、假吸血蝠科各1种, 各占2.4%。在物种分布型方面: 东洋型种类27种, 占65.9%; 季风型3种, 占7.3%; 南中国型6种, 占14.6%; 古北界成分中古北型2种, 占4.9%; 其他不易归类的3种, 占7.3% (附录2)。

在物种鉴定中发现, 2016年12月21日在琼中县朝参村人工林(19°03'50" N, 109°45'42" E, 海拔423 m)使用竖琴网采集的2只管鼻蝠(Male: GZHU16448; Female: GZHU16452), 根据其外部形态、头骨特征及系统发育学证据, 被鉴定为艾氏管鼻蝠(*Murina eleryi*; 图1, 附录3), 为海南岛翼手目分布新记录。

41种蝙蝠中, 彩蝠(*Kerivoula picta*)被列为濒危(EN)级, 犬蝠(*Cynopterus sphinx*)、大菊头蝠(*Rhinolophus luctus*)、普氏蹄蝠(*Hipposideros pratti*)、

中华鼠耳蝠(*Myotis chinensis*)、大足鼠耳蝠(*M. pilosus*)、高颅鼠耳蝠(*M. siligorensis*)、小伏翼(*Pipistrellus tenuis*)、灰伏翼(*Hypsugo pulveratus*)、南蝠(*Ia io*)、褐扁颅蝠(*Tylonycteris robustula*)、圆耳管鼻蝠(*Murina cyclotis*)、艾氏管鼻蝠、毛翼管鼻蝠(*Harpiocephalus harpia*)、暗褐彩蝠(*Kerivoula furva*)、亚洲长翼蝠(*Miniopterus fuliginosus*)、几内亚长翼蝠(*M. magnater*)、南长翼蝠(*M. pusillus*)共17种被列为近危(NT)等级, 印度假吸血蝠(*Megaderma lyra*)和无尾蹄蝠(*Coelops frithii*)被列为易危(VU)等级, 数据缺乏(DD)的有1种, 即哈氏管鼻蝠(*Murina harrisoni*), 其余20种均为无危(LC)(附录2)。

不同蝙蝠在岛内的采集和记录数量以及分布状况显示: 中菊头蝠(*Rhinolophus affinis*)、小菊头蝠(*R. pusillus*)、中华菊头蝠(*R. sinicus*)、中蹄蝠(*Hipposideros larvatus*)和小黄蝠(*Scotophilus kuhlii*)等5种在岛内有较大的种群数量且分布区域较广; 棕果蝠(*Rousettus leschenaultii*)、犬蝠、黑髯墓蝠(*Taphozous melanopogon*)、大菊头蝠、大蹄蝠(*Hipposideros armiger*)、小蹄蝠(*H. pomona*)、无尾蹄蝠、华南水鼠耳蝠(*Myotis laniger*)、大足鼠耳蝠、东亚伏翼(*Pipistrellus abramus*)、印度伏翼(*P. coromandra*)、普通伏翼(*P. pipistrellus*)、灰伏翼、褐扁颅蝠、斑蝠(*Scotomanes ornatus*)、大黄蝠(*Scotophilus heathi*)、亚洲长翼蝠、几内亚长翼蝠和南长翼蝠等19种在岛内有一定的种群数量或有较广的分布区域; 而皱唇犬吻蝠(*Chaerephon plicata*)、中华鼠耳蝠、大卫鼠耳蝠(*Myotis davidii*)、霍氏鼠耳蝠(*M. horsfieldii*)、高颅鼠耳蝠、锡兰伏翼(*Pipistrellus ceylonicus*)、南蝠、中华山蝠(*Nyctalus plancyi*)、圆耳管鼻蝠、艾氏管鼻蝠、哈氏管鼻蝠、毛翼管鼻蝠、彩蝠、暗褐彩蝠等14种在岛内的种群数量少且分布范围较小; 另有小伏翼、普氏蹄蝠、印度假吸血蝠3种只有文献记录, 但无具体采集地点(附录2)。

不同市级行政区中, 陵水分布的翼手目种类最多, 达27种, 其次分别是琼中(22种)、海口(16种)等, 而临高(2种)、屯昌(2种)、澄迈(1种)、三亚(1种)等区域则种类较少(图2)。

2.2 海南岛蝙蝠的适生分布区预测

MaxEnt模型结果显示, 10次Subsample的平均训练集AUC值为0.73。Jackknife检验结果提示: 海

图1 基于641 bp *COI*序列运用邻接法构建的管鼻蝠系统发生树及艾氏管鼻蝠外形和头骨(A: 雄性; B: 雌性)
Fig. 1 Neighbour-joining tree of *Murina* based on 641 bp *COI* gene, the external, skull and mandible characters of *Murina eleryi* (A, Male; B, Female)

图2 海南岛各地区翼手目资源调查情况。颜色越深其蝙蝠生物多样性越高, 数字代表物种数。
Fig. 2 The distribution of bat species in different city of Hainan Island. The darker colors show areas with higher bat biodiversity, figures represent the number of species.

拔、最暖季度平均温度、最热月份最高温度、年平均温度为影响蝙蝠类群分布的主要气候因子(图3)。此外, MaxEnt模型预测海南岛蝙蝠的高适生区主要集中在五指山、吊罗山、鹦哥岭、尖峰岭及火山口等地区, 而三亚、澄迈、屯昌、琼海等则为低适生区(图4)。

3 讨论

艾氏管鼻蝠作为典型的树栖蝙蝠, 活动隐秘, 难捕捉, 标本量少, 对该物种的报道和描述相对缺乏。其国内已知分布区包括广西和贵州(Francis & Eger, 2012)、湖南(刘志霄等, 2014)、广东(徐忠鲜等, 2014), 本次在海南采集到艾氏管鼻蝠扩大了该种类在国内的分布区, 为该种类在我国最南缘的分布记录。该记录也使海南岛内管鼻蝠种类由原有的2种增至3种, 翼手目种数增至41种。鉴于海南岛作

图3 环境变量重要性的刀切法检验

Fig. 3 Results of Jackknife test of environment variable importance

为我国重要的生物多样性热点区之一,且翼手目物种在低纬度区域具有更高丰富度的规律(Buckley et al, 2010),我们认为现阶段岛内的翼手目多样性仍有被低估的可能。

与其他调查组相比,本研究组自2008年起,通过使用竖琴网,进一步发掘海南岛内树栖型蝙蝠多样性状况,采集到树栖型蝙蝠共计18种,占海南岛翼手目种类的43.9%;发现了褐扁颅蝠(余文华等, 2008)、泰坦尼亚彩蝠(*Kerivoula titania*) (Wu et al, 2012)、毛翼管鼻蝠(胡宜峰等, 2018)以及艾氏管鼻蝠(本研究)共4个树栖蝙蝠新记录。其中2012年采集的泰坦尼亚彩蝠和文献中记载的哈氏彩蝠(*K. hardwickii*)经过Yu等(2018)厘定后确定为暗褐彩蝠。在调查过程中我们也发现,部分国内较常见的种类如东亚伏翼仅在乐东、陵水和海口有分布记录,印

度假吸血蝠、普氏蹄蝠和小伏翼作为早期文献记录种类在近15年的调查中均未发现(附录2),这可能是因为: (1)调查力度不够; (2)部分区域由于自然资源的开发,导致蝙蝠栖息地被破坏。因此有必要对这些分布记录进行实地考证以核实其种群现状。

最大熵模型已成功且广泛地运用在植物群落和一些物种的适生区预测中(Phillips et al, 2006; 崔绍朋等, 2018; 武晓宇等, 2018),本研究MaxEnt模型模拟结果显示,翼手目多样性高的区域主要集中于海南岛的中南部以及北部区域,而这些区域则主要围绕着五指山、尖峰岭、吊罗山以及火山口等植被较好且人类活动较少的区域。对蝙蝠在海南岛内分布影响较大的环境因子是: 海拔、最暖季度平均温度、最热月份最高温度、年平均温度,该结果与李玉春等(2005)在基于全国尺度条件下提出的影响

图4 蝙蝠在海南岛的适生区。物种存在的概率为0–1, 暖色为物种存在概率高的区域, 最高为红色, 最低为深蓝色。

Fig. 4 Suitable habitat distribution of bats in Hainan Island. The species existing probability range from 0 to 1. Warmer colors show areas with higher predicted probability, red is the highest, dark blue is the lowest.

翼手目分布规律的主要影响因子(如年平均温度、大于零度日数、1月平均温度、年降雨量)存在一定差异, 但我们认为该差异主要源于分析尺度与使用方法不同所致, 而且二者共同提示年平均温度是影响蝙蝠分布的重要因素之一。

蝙蝠是生态系统中的重要成员之一, 具有举足轻重的生态作用(Williams-Guillén et al, 2008; Maine & Boyles, 2015), 其在岛内的资源状况与本底信息的明确是相关保护工作开展的前提与基础。同时, 大量研究指出蝙蝠为多种致病病毒的天然宿主, 如埃博拉病毒、SARS病毒、马尔堡病毒以及狂犬病毒等(Calisher et al, 2006; Daszak, 2010; Wong et al, 2010; Olival et al, 2017), 故其本底信息的明确无疑有着重要的疾控与防治意义。与实地调查不同, 通过MaxEnt模型可快速整合分布记录与生态学数据完成类群的潜在分布区预测, 但模型的稳定性与准确性受样本数量和样本地理空间分布两方面的制约(Manel et al, 2001), 本研究中的部分文献记载的GPS数据缺失导致采集位点只能粗略定位, 这对蝙蝠适生区预测产生的影响难以评估。另一方面, 本研究仅选取了常规使用的海拔、降雨量、温度等气候因子, 而植被情况、洞穴分布情况以及人类活动等因子由于数据不全或缺乏而无法纳入, 已有文献指出部分生态因子对蝙蝠分布具有重要影响, 如洞

穴位置、理化特征、人为干扰程度等(Russo et al, 2002; 张成菊和吴毅, 2006; Johnson et al, 2009), 故后续的研究中应适当补充相关数据以进一步提高模型的准确性, 为该类群的本底调查、类群的生态保护及疾病防控提供指引。

参考文献

- Buckley LB, Davies TJ, Ackerly DD, Kraft NJB, Harrison SP, Anacker BL, Cornell HV, Damschen EI, Grytnes JA, Hawkins BA, McCain CM, Stephens PR, Wiens JJ (2010) Phylogeny, niche conservatism and the latitudinal diversity gradient in mammals. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 277, 2131–2138.
- Calisher CH, Childs JE, Field HE, Holmes KV, Schountz T (2006) Bats: Important reservoir hosts of emerging viruses. *Clinical Microbiology Reviews*, 19, 531–545.
- Che XF, Zhang JH, Huang HJ, Liu SJ, Zhang MJ (2014) Climate regionalization in Hainan Island. *Chinese Journal of Tropical Agriculture*, 34(6), 60–65. (in Chinese with English abstract) [车秀芬, 张京红, 黄海静, 刘少军, 张明洁 (2014) 海南岛气候区划研究. *热带农业科学*, 34(6), 60–65.]
- Cui SP, Luo X, Li CW, Hu HJ, Jiang ZG (2018) Predicting the potential distribution of white-lipped deer using the MaxEnt model. *Biodiversity Science*, 26, 171–176. (in Chinese with English abstract) [崔绍朋, 罗晓, 李春旺, 胡慧建, 蒋志刚 (2018) 基于MaxEnt模型预测白唇鹿的潜在分布区. *生物多样性*, 26, 171–176.]
- Daszak P (2010) Bats, in black and white. *Science*, 329, 634–635.
- Drummond MJ, McCarthy JJ, Sinha M, Spratt HM, Volpi E, Esser KA, Rasmussen BB (2011) Aging and microRNA expression in human skeletal muscle: A microarray and bioinformatics analysis. *Physiological Genomics*, 43, 595–603.
- Edgar RC (2004) MUSCLE: Multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. *Nucleic Acids Research*, 32, 1792–1797.
- Francis CM, Eger JL (2012) A review of tube-nosed bats (*Murina*) from Laos with a description of two new species. *Acta Chiropterologica*, 14, 15–38.
- Gao SH, Huang ZM, Zhang TQ, Lin X (1988) Climate of Hainan Island. China Meteorological Press, Beijing. (in Chinese) [高素华, 黄增明, 张统钦, 林熙 (1988) 海南岛气候. 气象出版社, 北京.]
- Hijmans RJ, Cameron SE, Parra JL, Jones PG, Jarvis A (2005) Very high interpolated climate surfaces for global land areas. *International Journal of Climatology*, 25, 1965–1978.
- Hu YF, Li F, Wu Y, Li YC, Yu WH (2018) New record of *Harpiocephalus harpia* in Hainan Province. *Journal of Zhejiang Forestry Science and Technology*, 38(3), 85–88.

(in Chinese with English abstract) [胡宜峰, 黎舫, 吴毅, 李玉春, 余文华 (2018) 海南省蝙蝠新记录——毛翼管鼻蝠. 浙江林业科技, 38(3), 85–88.]

Jiang HS, Song XJ, Liao WB, Li TH, Wu Y, Jin JH, Zou FS, Dong SY, Yi ZS, Zhou GY, Song B, Ke MH (2006) The Biodiversity and Its Conservation of Diaoluo Mountain, Hainan, China. Guangdong Science and Technology Press, Guangzhou. (in Chinese) [江海声, 宋晓军, 廖文波, 李泰辉, 吴毅, 金建华, 邹发生, 董仕勇, 易祖盛, 周光益, 宋斌, 柯铭辉 (2006) 海南吊罗山生物多样性及其保护. 广东科技出版社, 广州.]

Jiang ZG, Jiang JP, Wang YZ, Zhang E, Zhang YY, Li LL, Xie F, Cai B, Cao L, Zheng GM, Dong L, Zhang ZW, Ding P, Luo ZH, Ding CQ, Ma ZJ, Tang SH, Cao WX, Li CW, Hu HJ, Ma Y, Wu Y, Wang YX, Zhou KY, Liu SY, Chen YY, Li JT, Feng ZJ, Wang Y, Wang B, Li C, Song XL, Cai L, Zang CX, Zeng Y, Meng ZB, Fang HX, Ping XG (2016) Red List of China's Vertebrates. Biodiversity Science, 24, 500–551. (in Chinese and in English) [蒋志刚, 江建平, 王跃招, 张鹏, 张雁云, 李立立, 谢锋, 蔡波, 曹亮, 郑光美, 董路, 张正旺, 丁平, 罗振华, 丁长青, 马志军, 汤宋华, 曹文宣, 李春旺, 胡慧建, 马勇, 吴毅, 王应祥, 周开亚, 刘少英, 陈跃英, 李家堂, 冯祚建, 王燕, 王斌, 李成, 宋雪琳, 蔡蕾, 臧春鑫, 曾岩, 孟智斌, 方红霞, 平晓鸽 (2016) 中国脊椎动物红色名录. 生物多样性, 24, 500–551.]

Jiang ZG, Liu SY, Wu Y, Jiang XL, Zhou KY (2017) China's mammal diversity (2nd edition). Biodiversity Science, 24, 886–895. (in Chinese with English abstract) [蒋志刚, 刘少英, 吴毅, 蒋学龙, 周开亚 (2017) 中国哺乳动物多样性 (第2版). 生物多样性, 25, 886–895.]

Jiang ZG, Ma Y, Wu Y, Wang YX, Zhou KY, Liu SY, Feng ZJ, Li LL (2015) China's Mammal Diversity and Geographic Distribution. Science Press, Beijing. (in Chinese with English abstract) [蒋志刚, 马勇, 吴毅, 王应祥, 周开亚, 刘少英, 冯祚建, 李立立 (2015) 中国哺乳动物多样性及地理分布. 科学出版社, 北京.]

Johnson JB, Edwards JW, Ford WM, Gates JE (2009) Roost tree selection by northern myotis (*Myotis septentrionalis*) maternity colonies following prescribed fire in a Central Appalachian Mountains hardwood forest. Forest Ecology and Management, 258, 233–242.

Li DW, Yin F, Zeng Y, Zhang Y, Zhang XW (2010) Cluster analysis on the distribution patterns of Chiroptera in Hainan Island. Journal of Biology, 27(2), 16–20. (in Chinese with English abstract) [李德伟, 尹锋, 曾玉, 张园, 张信文 (2010) 海南岛翼手类地理分布格局的聚类分析. 生物学报, 27(2), 16–20.]

Li YC, Meng YH, Zhang LC, Ye Q (2005) Analysis of environmental factors on geographical distribution of Chinese Chiroptera. Acta Zoologica Sinica, 51, 413–422. (in Chinese with English abstract) [李玉春, 蒙以航, 张利存, 叶青 (2005) 中国翼手目地理分布的环境因子影响分析.

动物学报, 51, 413–422.]

Li YC, Chen Z, Long YR, Zhou F, Zhong YR (2006a) Species diversity of Chiroptera in Ma'anling volcano area, Hainan Island. Chinese Journal of Zoology, 41(3), 106–109. (in Chinese with English abstract) [李玉春, 陈忠, 龙育儒, 周锋, 钟友仁 (2006a) 海南岛马鞍岭火山口地区翼手目物种多样性. 动物学杂志, 41(3), 106–109.]

Li YC, Wu Y, Chen Z (2006b) A new record of Rickett's big-footed bat *Myotis ricketti* in Hainan Island of China. Acta Theriologica Sinica, 26, 211–212. (in Chinese with English abstract) [李玉春, 吴毅, 陈忠 (2006b) 海南岛发现大足鼠耳蝠分布新纪录. 兽类学报, 26, 211–212.]

Liu SY, Wu Y (2019) Handbook of the Mammals of China. The Straits Publishing & Distributing Group, Fuzhou. (in Chinese) [刘少英, 吴毅 (2019) 中国兽类图鉴. 海峡书局出版社, 福州.]

Liu ZX, Zhang YX, Zhang JS, Zhang LB (2014) *Murina eleryi* discovered in Hunan Province. Chinese Journal of Zoology, 49, 132–135. (in Chinese with English abstract) [刘志霄, 张佑祥, 张劲硕, 张礼标 (2014) 湖南省发现艾氏管鼻蝠. 动物学杂志, 49, 132–135.]

Maine JJ, Boyles JG (2015) Bats initiate vital agroecological interactions in corn. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 112, 12438–12443.

Manel S, Williams HC, Ormerod SJ (2001) Evaluating presence-absence models in ecology: The need to account for prevalence. Journal of Applied Ecology, 38, 921–931.

Olival KJ, Hosseini PR, Zambrana-Torrel C, Ross N, Bogich TL, Daszak P (2017) Host and viral traits predict zoonotic spillover from mammals. Nature, 546, 646–650.

Phillips SJ, Anderson RP, Schapire RE (2006) Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling, 190, 231–259.

Posada D, Crandall KL (1998) ModelTest: Testing the model of DNA substitution. Bioinformatics, 14, 817–818.

Russo D, Jones G, Miglioni A (2002) Habitat selection by the Mediterranean horseshoe bat, *Rhinolophus euryale* (Chiroptera: Rhinolophidae) in a rural area of southern Italy and implications for conservation. Biological Conservation, 107, 71–81.

Saitou N, Nei M (1987) The Neighbor-Joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees. Molecular Biology and Evolution, 4, 406–425.

Shaw TH, Wang S, Lu CK, Chang LK (1966) A survey of the mammals of Hainan Island, China. Acta Zootaxonomica Sinica, 3, 260–276. (in Chinese with English abstract) [寿振黄, 汪松, 陆长坤, 张鑾光 (1966) 海南岛的兽类调查. 动物分类学报, 3, 260–276.]

Shi HT (2001) Retrieval of Terrestrial Vertebrates in Hainan. Hainan Publishing House, Haikou. (in Chinese) [史海涛 (2001) 海南陆栖脊椎动物检索. 海南出版社, 海口.]

Shi HT, Zhao EM, Wang LJ, Bi H, Lü SQ, Liu HN, Wang JC, Zhao H, Hong ML (2011) Amphibians and Reptiles of

- Hainan. Science Press, Beijing. (in Chinese) [史海涛, 赵尔宓, 王力军, 毕华, 吕顺清, 刘惠宁, 汪继超, 赵蕙, 洪美玲 (2011) 海南两栖爬行动物志. 科学出版社, 北京.]
- Simmons NB (2005) Order Chiroptera // Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3rd edn. The Johns Hopkins University Press, Maryland.
- Wang YX (2003) A Complete Checklist of Mammal Species and Subspecies in China: A Taxonomic and Geographic Reference. China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese) [王应祥 (2003) 中国哺乳动物物种与亚种分类名录与分布大全. 中国林业出版社, 北京.]
- Williams-Guillén K, Prefecto I, Vandermeer J (2008) Bats limit insects in a neotropical agroforestry system. *Science*, 320, 70.
- Wong S, Lau S, Woo P, Yuen KY (2010) Bats as a continuing source of emerging infections in humans. *Reviews in Medical Virology*, 17(2), 67–91.
- Wu XY, Dong SK, Liu SL, Liu QR, Han YH, Zhang XL, Su XK, Zhao HD, Feng J (2018) Identifying priority areas for grassland endangered plant species in the Sanjiangyuan Nature Reserve based on the MaxEnt model. *Biodiversity Science*, 26, 138–148. (in Chinese with English abstract) [武晓宇, 董世魁, 刘世梁, 刘全儒, 韩雨晖, 张晓蕾, 苏旭坤, 赵海迪, 冯憬 (2018) 基于MaxEnt模型的三江源区草地濒危保护植物热点区识别. 生物多样性, 26, 138–148.]
- Wu Y, Jiang HS, Peng HY, Li SN, Wang WY (2003) Study on the species biodiversity of mammals in Diaoluoshan Mountain. *Journal of Guangzhou University (Natural Science Edition)*, 2, 505–511. (in Chinese with English abstract) [吴毅, 江海声, 彭洪元, 李仕宁, 王文毅 (2003) 吊罗山保护区哺乳动物多样性初步研究. 广州大学学报(自然科学版), 2, 505–511.]
- Wu Y, Li YC, Lin LK, Harada M, Chen Z, Motokawa M (2012) New records of *Kerivoula titania* (Chiroptera: Vespertilionidae) from Hainan Island and Taiwan. *Mammal Study*, 37, 69–72.
- Wu Y, Motokawa M, Li YC, Harada M, Chen Z, Yu WH (2010) Karyotype of Harrison's tube nosed bat *Murina harrisoni* (Chiroptera: Vespertilionidae: Murininae) based on the second specimen recorded from Hainan Island, China. *Mammal Study*, 35, 277–279.
- Xu LH, Liu ZH, Yu SM (1983) Birds and Beasts in Hainan Island, China. Science Press, Beijing. (in Chinese) [徐龙辉, 刘振河, 余斯绵 (1983) 海南岛的鸟兽. 科学出版社, 北京.]
- Xu ZX, Yu WH, Wu Y, Li F, Chen BC, Harada M, Motokawa M, Gong YN, Li YC (2014) Preliminary study on population genetic structure and taxonomy of Elery's tube-nosed bat (*Murina eleryi*). *Acta Theriologica Sinica*, 34, 270–277. (in Chinese with English abstract) [徐忠鲜, 余文华, 吴毅, 李锋, 陈柏承, 原田正史, 本川雅治, 龚粤宁, 李玉春 (2014) 艾氏管鼻蝠种群遗传结构初步研究及其分类探讨. 兽类学报, 34, 270–277.]
- Yan JA (2008) Study on Evolution History of Hainan Island's Ecological Environment. Science Press, Beijing. (in Chinese) [颜家安 (2008) 海南岛生态环境变迁研究. 科学出版社, 北京.]
- Yang QS, Xia L, Feng ZJ, Ma Y, Quan GQ, Wu Y (2007) A guide to the measurement of mammal skull V, Insectivora and Chiroptera. *Chinese Journal of Zoology*, 42(2), 56–62. (in Chinese with English abstract) [杨奇森, 夏霖, 冯祚建, 马勇, 全国强, 吴毅 (2007) 兽类头骨测量标准V, 食虫目、翼手目. 动物学杂志, 42(2), 56–62.]
- Yu WH, Wu Y, Li YC, Jiang HS, Chen Z (2008) A new record of greater bamboo bat *Tylonycteris robustula* of Hainan Island. *Journal of Guangzhou University (Natural Science Edition)*, 7, 30–33. (in Chinese with English abstract) [余文华, 吴毅, 李玉春, 江海声, 陈忠 (2008) 海南岛发现褐扁颅蝠(*Tylonycteris robustula*)分布新纪录. 广州大学学报(自然科学版), 7, 30–33.]
- Yu WH, Li F, Csorba G, Xu ZX, Wang XY, Guo WJ, Li YC, Wu Y (2018) A revision of *Kerivoula hardwickii* and occurrence of *K. furva* (Chiroptera: Vespertilionidae) in China. *Zootaxa*, 4461, 45–56.
- Zhang CJ, Wu Y (2006) Habitat selection of environment, ecological function and protection of cave bat. *Bulletin of Biology*, 41(5), 4–6. (in Chinese) [张成菊, 吴毅 (2006) 洞穴型蝙蝠的栖息环境选择、生态作用及保护. 生物学通报, 41(5), 4–6.]
- Zhang LB, Zhu GJ, Yu DM, Ye JP, Zhang W, Hong TY, Tan M (2008) New record of *Tylonycteris robustula* (Chiroptera: Vespertilionidae) from Hainan, Guizhou, and Sichuan Province. *Acta Theriologica Sinica*, 28, 316–320. (in Chinese with English abstract) [张礼标, 朱光剑, 于冬梅, 叶建平, 张伟, 洪体玉, 谭敏 (2008) 海南、贵州和四川三省翼手类新纪录——褐扁颅蝠. 兽类学报, 28, 316–320.]
- Zhang RZ (1999) Zoogeography of China. Science Press, Beijing. (in Chinese) [张荣祖 (1999) 中国动物地理. 科学出版社, 北京.]
- Zhu BL, Zhu GJ, Li DW, Hong TY, Zhang XW (2008) A preliminary survey on species diversity of Chiroptera in Hainan Island. *Journal of Hainan Normal University (Natural Science)*, 21, 75–81. (in Chinese with English abstract) [朱斌良, 朱光剑, 李德伟, 洪体玉, 张信文 (2008) 海南岛翼手目物种多样性的初步调查. 海南师范大学学报(自然科学版), 21, 75–81.]
- Zhu GJ, Li DW, Ye JP, Hong TY, Zhang LB (2008a) New record of *Ia io* in Hainan Island, its echolocation pulses and ND1 analysis. *Chinese Journal of Zoology*, 43, 69–75. (in Chinese with English abstract) [朱光剑, 李德伟, 叶建平, 洪体玉, 张礼标 (2008a) 南蝠海南岛分布新纪录、回声定位信号和ND1分析. 动物学杂志, 43, 69–75.]
- Zhu GJ, Han NJ, Hong TY, Tan M, Yu DM, Zhang LB (2008b) Echolocation call, roost and ND1 sequence analysis of new record of *Nyctalus plancyi* (Chiroptera: Vespertilionidae) on

Hainan Island. Zoological Research, 29, 447–451. (in Chinese with English abstract) [朱光剑, 韩乃坚, 洪体玉, 谭敏, 于冬梅, 张礼标 (2008b) 海南属种新纪录——中华山蝠的回声定位信号、栖息地及序列分析. 动物学研究, 29, 447–451.]

(责编编委: 蒋学龙 责任编辑: 闫文杰)

附录 Supplementary Material

附录1 用于MaxEnt模型中的环境因子变量

Appendix 1 Environmental variables used in MaxEnt model
<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2018256-1.pdf>

附录2 海南岛蝙蝠名录、分布及保护现状

Appendix 2 List of specimens, distribution localities and conservation status of bats in Hainan Island, China
<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2018256-2.pdf>

附录3 不同地区的艾氏管鼻蝠及金管鼻蝠的外形及头骨测量

Appendix 3 The external, skull and mandible measurements of *Murina eleryi* from different locations comparing with *Murina aurata*
<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2018256-3.pdf>

胡宜峰, 余文华, 岳阳, 黄正澜懿, 李玉春, 吴毅. 海南岛翼手目物种多样性现状与分布预测. 生物多样性, 2019, 27 (4): 400–408.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2018256>

附录1 用于MaxEnt模型中的环境因子变量

Appendix 1 Environmental variables used in MaxEnt model

中文描述 Chinese description	英文描述 English description	中文描述 Chinese description	英文描述 English description
海拔	Altitude (m)	最冷月份最低温	Min. temperature of coldest month (°C)
年平均降雨量	Annual precipitation (mm)	年温度变化范围	Temperature annual range (°C)
最湿月份降雨量	Precipitation of wettest month (mm)	最湿季度平均温度	Mean temperature of wettest quarter (°C)
最干月份降雨量	Precipitation of driest month (mm)	最干季度平均温度	Mean temperature of driest quarter (°C)
雨量变化方差	Precipitation seasonality	1月平均温度	Mean temperature of Jan. (°C)
最湿季度降雨量	Precipitation of wettest quarter (mm)	2月平均温度	Mean temperature of Feb. (°C)
最干季度降雨量	Precipitation of driest quarter (mm)	3月平均温度	Mean temperature of Mar. (°C)
最暖季度降雨量	Precipitation of warmest quarter (mm)	4月平均温度	Mean temperature of Apr. (°C)
最冷季度降雨量	Precipitation of coldest quarter (mm)	5月平均温度	Mean temperature of May (°C)
年平均温度	Annual mean temperature (°C)	6月平均温度	Mean temperature of Jun. (°C)
最暖季度平均温度	Mean temperature of warmest quarter (°C)	7月平均温度	Mean temperature of Jul. (°C)
最冷季度平均温度	Mean temperature of coldest quarter (°C)	8月平均温度	Mean temperature of Aug. (°C)
昼夜温差月均值	Mean diurnal temperature range (°C)	9月平均温度	Mean temperature of Sept. (°C)
昼夜温差与年温差比值	Isothermality	10月平均温度	Mean temperature of Oct. (°C)
温度季节变化	Temperature seasonality (°C)	11月平均温度	Mean temperature of Nov. (°C)
最热月份最高温	Max. temperature of warmest month (°C)	12月平均温度	Mean temperature of Dec. (°C)

胡宜峰, 余文华, 岳阳, 黄正澜懿, 李玉春, 吴毅. 海南岛翼手目物种多样性现状与分布预测. 生物多样性, 2019, 27 (4): 400–408.

<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2018256>

附录2 海南岛蝙蝠名录、分布及保护现状

Appendix 2 List of specimens, distribution localities and conservation status of bats in Hainan Island, China

物种 Species	标本数量 No. of specimens	文献记载 数量 Recordation	濒危等级 IUCN categories	分布区系 Distribution	采集地 Location
狐蝠科 Pteropodidae					
1. 棕果蝠 <i>Rousettus leschenaultii</i>	17	45	LC	Wb	白沙, 保亭, 海口, 陵水, 文昌, (昌江, 万宁) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 李玉春等, 2006a; 朱光剑等, 2008a; 李德伟等, 2010] Baisha, Baoting, Haikou, Lingshui, Wenchang, (Changjiang, Wanning) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Li et al, 2006a; Zhu et al, 2008a; Li et al, 2010]
2. 犬蝠 <i>Cynopterus sphinx</i>	71	25	NT	Wc	白沙, 海口, 陵水, 琼中, (文昌, 临高, 儋州, 万宁, 定安) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 李玉春等, 2006a; 朱斌良等, 2008; 朱光剑等, 2008a; 李德伟等, 2010] Baisha, Haikou, Lingshui, Qiongzong, (Wenchang, Lingao, Danzhou, Wanning, Dingan) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Li et al, 2006a; Zhu et al, 2008; Zhu et al, 2008a; Li et al, 2010]
鞘尾蝠科 Emballonuridae					
3. 黑髯墓蝠 <i>Taphozous melanopogon</i>		9	LC	Wc	(昌江, 东方, 乐东) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003] (Changjiang, Dongfang, Ledong) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003]
假吸血蝠科 Megadermatidae					
4. 印度假吸血蝠 <i>Megaderma lyra</i>		✓	VU	Wc	(地点不详) [王应祥, 2003; 蒋志刚等, 2015] (Unknown) [Wang, 2003; Jiang et al, 2015]
菊头蝠科 Rhinolophidae					
5. 中菊头蝠 <i>Rhinolophus affinis</i>	234	42	LC	Wd	白沙, 保亭, 海口, 乐东, 陵水, 琼中, 文昌, (儋州, 定安, 昌江, 东方) [徐龙辉等, 1983; 史海涛等, 2001; 王应祥, 2003; 吴毅等, 2003; 李玉春等, 2006a; 朱斌良等, 2008; 李德伟等, 2010] Baisha, Baoting, Haikou, Ledong, Lingshui, Qiongzong, Wenchang, (Danzhou, Dingan, Changjiang, Dongfang) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Wu et al, 2003; Li et al, 2006a; Zhu et al, 2008; Li et al, 2010]
6. 大菊头蝠 <i>Rhinolophus luctus</i>	9	7	NT	Wb	白沙, 保亭, 海口, 陵水, 琼中, (儋州) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 李玉春等, 2006a; 朱斌良等, 2008] Baisha, Baoting, Haikou, Lingshui, Qiongzong, (Danzhou) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Li et al, 2006a; Zhu et al, 2008]
7. 小菊头蝠 <i>Rhinolophus pusillus</i>	94	44	LC	Sc	保亭, 海口, 乐东, 陵水, 琼中, 文昌, (定安, 昌江, 白沙, 东方) [史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 吴毅等, 2003; 李玉春等, 2006a; 朱斌良等, 2008; 李德伟等, 2010] Baoting, Haikou, Ledong, Lingshui, Qiongzong, Wenchang, (Dingan, Changjiang, Baisha, Dongfang) [Shi, 2001; Wang, 2003; Wu et al, 2003; Li et al, 2006a; Zhu et al, 2008; Li et al, 2010]
8. 中华菊头蝠 <i>Rhinolophus sinicus</i>	59	74	LC	Wd	白沙, 保亭, 海口, 陵水, 琼中, (屯昌, 定安, 昌江, 东方, 乐东) [徐龙辉等, 1983; 王应祥, 2003; 吴毅等, 2003; 朱斌良等, 2008; 李德伟等, 2010] Baisha, Baoting, Haikou, Lingshui, Qiongzong, (Tunchang, Dingan, Changjiang, Dongfang, Ledong) [Xu et al, 1983; Wang, 2003; Wu et al, 2003; Zhu et al, 2008; Li et al, 2010]
蹄蝠科 Hipposideridae					
9. 大蹄蝠 <i>Hipposideros armiger</i>	27	10	LC	Wd	白沙, 保亭, 陵水, 琼中, (昌江, 东方, 乐东) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 吴毅等, 2003; 朱斌良等, 2008; 李德伟等, 2010] Baisha, Baoting, Lingshui, Qiongzong, (Changjiang, Dongfang, Ledong) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Wu et al, 2003; Zhu et al, 2008; Li et al, 2010]

胡宜峰, 余文华, 岳阳, 黄正澜懿, 李玉春, 吴毅. 海南岛翼手目物种多样性现状与分布预测. 生物多样性, 2019, 27 (4): 400–408.

<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2018256>

物种 Species	标本数量 No. of specimens	文献记载 数量 Recordation gories	濒危等级 IUCN-cate	分布区系 Distribution	采集地 Location
10. 中蹄蝠 <i>Hipposideros larvatus</i>	43	182	LC	Wb	保亭, 海口, 陵水, 琼中, (屯昌, 定安, 昌江, 白沙, 东方, 乐东)[徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 李玉春等, 2006a; 李德伟等, 2010] Baoting, Haikou, Lingshui, Qiongzong, (Tunchang, Dingan, Changjiang, Baisha, Dongfang, Ledong) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Li et al, 2006a; Li et al, 2010]
11. 小蹄蝠 <i>Hipposideros pomona</i>	81	97	LC	Wc	保亭, 海口, 陵水, 琼中, (东方, 琼海, 昌江, 万宁) [寿振黄等, 1966; 朱斌良等, 2008] Baoting, Haikou, Lingshui, Qiongzong, (Dongfang, Qionghai, Changjiang, Wanning) [Shaw et al, 1966; Zhu et al, 2008]
12. 普氏蹄蝠 <i>Hipposideros pratti</i>		✓	NT	Wd	(地点不详) [王应祥, 2003; 蒋志刚等, 2015] (Unknown) [Wang, 2003; Jiang et al, 2015]
13. 无尾蹄蝠 <i>Coelops frithii</i>	5		VU	Wb	保亭, 琼中, (白沙, 陵水) [徐龙辉等, 1983; 王应祥, 2003; 李德伟等, 2010] Baoting, Qiongzong, (Baisha, Lingshui) [Xu et al, 1983; Wang, 2003; Li et al, 2010]
犬吻蝠科 Molossidae					
14. 皱唇犬吻蝠 <i>Chaerephon plicata</i>		✓	LC	We	(儋州, 东方) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001] (Danzhou, Dongfang) [Xu et al, 1983; Shi, 2001]
蝙蝠科 Vespertilionidae					
15. 中华鼠耳蝠 <i>Myotis chinensis</i>	1		NT	Uh	陵水 [吴毅等, 2003; 李玉春等, 2006a] Lingshui [Wu et al, 2003; Li et al, 2006a]
16. 大卫鼠耳蝠 <i>Myotis davidii</i>		✓	LC	E	(白沙) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001] (Baisha) [Xu et al, 1983; Shi, 2001]
17. 霍氏鼠耳蝠 <i>Myotis horsfieldii</i>	2		LC	Wa	乐东 Ledong
18. 华南水鼠耳蝠 <i>Myotis laniger</i>	31		LC	O ₃	保亭, 海口, 陵水, 琼中, (儋州, 东方, 乐东) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001] Baoting, Haikou, Lingshui, Qiongzong, (Danzhou, Dongfang, Ledong) [Xu et al, 1983; Shi, 2001]
19. 大足鼠耳蝠 <i>Myotis pilosus</i>	22	30	NT	Uh	保亭, 陵水, 琼中, (海口) [李玉春等, 2006a, b; 朱斌良等, 2008; 李德伟等, 2010] Baoting, Lingshui, Qiongzong, (Haikou) [Li et al, 2006a, b; Zhu et al, 2008; Li et al, 2010]
20. 高颅鼠耳蝠 <i>Myotis siligorensis</i>		✓	NT	Sc	(儋州) [王应祥, 2003; 蒋志刚等, 2015] (Danzhou) [Wang, 2003; Jiang et al, 2015]
21. 东亚伏翼 <i>Pipistrellus abramus</i>	3	16	LC	Ea	乐东, (陵水, 海口) [寿振黄等, 1966; 徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 李玉春等, 2006a; 朱斌良等, 2008; 李德伟等, 2010] Ledong, (Lingshui, Haikou) [Shaw et al, 1966; Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Li et al, 2006a; Zhu et al, 2008; Li et al, 2010]
22. 锡兰伏翼 <i>Pipistrellus ceylonicus</i>	2	5	LC	Wa	陵水, (东方) [寿振黄等, 1966; 徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 吴毅等, 2003] Lingshui, (Dongfang) [Shaw et al, 1966; Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wu et al, 2003]
23. 印度伏翼 <i>Pipistrellus coromandra</i>	1	22	LC	Wc	琼中, (琼海, 昌江, 白沙, 东方, 乐东) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 吴毅等, 2003] Qiongzong, (Qionghai, Changjiang, Baisha, Dongfang, Ledong) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wu et al, 2003]
24. 普通伏翼 <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	86	12	LC	Ea	白沙, 保亭, 儋州, 陵水, 海口, 琼海, 琼中 Baisha, Baoting, Danzhou, Lingshui, Haikou, Qionghai, Qiongzong
25. 小伏翼 <i>Pipistrellus tenuis</i>		✓	NT	Wa	(地点不详) [蒋志刚等, 2015] (Unknown) [Jiang et al, 2015]
26. 灰伏翼 <i>Hypsugo pulveratus</i>	4	1	NT	Sd	陵水, (东方, 乐东) [寿振黄等, 1966; 徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 吴毅等, 2003] Lingshui, (Dongfang, Ledong) [Shaw et al, 1966; Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Wu et al, 2003]

胡宜峰, 余文华, 岳阳, 黄正澜懿, 李玉春, 吴毅. 海南岛翼手目物种多样性现状与分布预测. 生物多样性, 2019, 27 (4): 400–408.

<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2018256>

物种 Species	标本数量 No. of specimens	文献记载 数量 Recordation	濒危等级 IUCN-categ	分布区系 Distribution	采集地 Location
27. 南蝠 <i>Ia io</i>	2	5	NT	Si	保亭, (陵水) [朱光剑等, 2008a; 李德伟等, 2010] Baoting, (Lingshui) [Zhu et al, 2008a; Li et al, 2010]
28. 中华山蝠 <i>Nyctalus plancyi</i>		1	LC	Sv	(陵水) [朱光剑等, 2008b] (Lingshui) [Zhu et al, 2008b]
29. 褐扁颅蝠 <i>Tylonycteris robustula</i>	5	6	NT	Wb	陵水, 琼中 [余文华等, 2008; 张礼标等, 2008] Lingshui, Qiongzong [Yu et al, 2008; Zhang et al, 2008]
30. 斑蝠 <i>Scotomanes ornatus</i>		1	LC	Sc	(琼中, 五指山, 保亭, 陵水) [寿振黄等, 1966; 徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001] (Qiongzong, Wuzhishan, Baoting, Lingshui) [Shaw et al, 1966; Xu et al, 1983; Shi, 2001]
31. 大黄蝠 <i>Scotophilus heathi</i>	1	6	LC	Wb	陵水, (儋州, 东方, 乐东) [寿振黄等, 1966; 徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001] Lingshui, (Danzhou, Dongfang, Ledong) [Shaw et al, 1966; Xu et al, 1983; Shi, 2001]
32. 小黄蝠 <i>Scotophilus kuhlii</i>	81	196	LC	Wb	海口, 陵水, 琼中, (文昌, 临高, 澄迈, 儋州, 定安, 乐东) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 李玉春等, 2006a; 朱斌良等, 2008; 李德伟等, 2010] Haikou, Lingshui, Qiongzong, (Wenchang, Lingao, Chengmai, Danzhou, Dingan, Ledong) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Li et al, 2006a; Zhu et al, 2008; Li et al, 2010]
33. 圆耳管鼻蝠 <i>Murina cyclotis</i>	2		NT	We	琼中 [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003] Qiongzong [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003]
34. 艾氏管鼻蝠 <i>Murina eleryi</i> *	2		NT	We	琼中 Qiongzong
35. 哈氏管鼻蝠 <i>Murina harrisoni</i>	2		DD	We	乐东, 琼中 Ledong, Qiongzong
36. 毛翼管鼻蝠 <i>Harpiocephalus harpia</i>	1		NT	Wc	琼中 [胡宜峰等, 2018] Qiongzong [Hu et al, 2018]
37. 彩蝠 <i>Kerivoula picta</i>	1	2	EN	Wc	陵水, (万宁, 三亚) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; http://bbs.hainan.net/post-40-626081-1.shtml] Lingshui, (Wanning, Sanya) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; http://bbs.hainan.net/post-40-626081-1.shtml]
38. 暗褐彩蝠 <i>Kerivoula furva</i>	2		NT	We	陵水 [Wu et al, 2012; Yu et al, 2018] Lingshui [Wu et al, 2012; Yu et al, 2018]
长翼蝠科 Miniopteridae					
39. 亚洲长翼蝠 <i>Miniopterus fuliginosus</i>	110	76	NT	O ₃	保亭, 海口, 陵水, 琼中, (儋州, 昌江, 白沙, 东方) [寿振黄等, 1966; 徐龙辉等, 1983; 朱斌良等, 2008; 李德伟等, 2010] Baoting, Haikou, Lingshui, Qiongzong, (Danzhou, Changjiang, Baisha, Dongfang) [Shaw et al, 1966; Xu et al, 1983; Zhu et al, 2008; Li et al, 2010]
40. 几内亚长翼蝠 <i>Miniopterus magnater</i>		45	NT	O ₃	(海口) [李玉春等, 2006a] (Haikou) [Li et al, 2006a]
41. 南长翼蝠 <i>Miniopterus pusillus</i>	24	59	NT	We	儋州, 海口, 陵水, 琼中, (昌江, 白沙, 东方, 乐东) [徐龙辉等, 1983; 史海涛, 2001; 王应祥, 2003; 吴毅等, 2003; 李玉春等, 2006a; 李德伟等, 2010] Danzhou, Haikou, Lingshui, Qiongzong, (Changjiang, Baisha, Dongfang, Ledong) [Xu et al, 1983; Shi, 2001; Wang, 2003; Wu et al, 2003; Li et al, 2006a; Li et al, 2010]

① *: 海南岛分布新记录; ② “√”: 有记录, 但无数量信息; ③ 濒危等级(蒋志刚等, 2016): LC: 无危; NT: 近危; VU: 易危; EN: 濒危; DD: 数据缺乏; ④ W: 东洋型(a: 热带; b: 热带-南亚热带; c: 热带-中亚热带; d: 热带-北亚热带; e: 热带-温带); S: 南中国型(c: 热带-中亚热带; i: 中亚热带; v: 热带-中温带); U: 古北型(h: 温带为主, 再延伸至热带); E: 季风型(a: 包括阿穆尔或再延展至俄罗斯远东地区); O: 不易归类, 分布较广(3: 地中海附近-中亚或东亚)(张荣祖, 1999); ⑤ “()”: 括号内分布点是前人采集或记录到的分布点, 本研究组未采集到。

① *: New record of Hainan Island; ② “√”: recorded, no quantitative information; ③ IUCN (Jiang et al, 2015): LC, least concern; NT, near threatened; VU, vulnerable; EN, endangered; DD, data deficient; ④ W: Oriental realm (a: tropic; b: tropical-south subtropical; c: tropical-middle subtropical; d: tropical-north subtropical; e: tropical-temperate); S: South China region (c: tropical-middle subtropical; i: middle subtropical; v: tropical-middle temperature); U: Palearctic realm (h: the temperate dominates and extends into tropics); E: Monsoon type (a: including Amur or extending to the far east in Russian); O: Difficult to categorize with wide distribution (3: near the Mediterranean-central or east Asia) (Zhang, 1999); ⑤ “()”: collection point of references.

附录3 不同地区的艾氏管鼻蝠及金管鼻蝠的外形及头骨测量
Appendix 3 The external, skull and mandible measurements of *Murina eleryi* from different locations comparing with *Murina aurata*

项目 Items	艾氏管鼻蝠 <i>Murina eleryi</i>							金管鼻蝠 <i>Murina aurata</i>
	海南琼中		广东		湖南	越南		四川, 模式标本
	Qiongzhang, Hainan		Guangdong		Hunan	Vietnam		Sichuan, Holotype
	本研究 This study		(Xu et al, 2014)		(Liu et al, 2014)	(Furey et al, 2009)		(Eger & Lim, 2011)
	♂, n = 1	♀, n = 1	♂, n = 1	♀, n = 4	♂, n = 1	♂, n = 5	♀, n = 6	♂, n = 2
	GZHU16448	GZHU16452		Mean ± SD (Range)		Mean ± SD (Range)	Mean ± SD (Range)	Mean
体重(Wt, g)	3.9	4.4	3.5	3.6(3.3–3.9)		4.4(4.0–5.0)	4.7 ± 0.7(4.0–5.5)	
前臂长(FA, mm)	28.3	30.59	27.79	30.79 ± 0.85(30.20–32.00)	26.3	28.3 ± 0.7(27.7–29.4)	29.9 ± 1.0(28.6–31.3)	29.14
尾长(T, mm)	30.28	31.06	32.74	30.73 ± 2.65(27.88–34.25)	24.5	29.5 ± 1.5(27.3–31.7)	29.5 ± 1.5(27.3–31.7)	
后足长(HF, mm)	7.14	7.31	6.32	7.35 ± 0.84(12.18–14.00)	6.2	6.6 ± 0.8(5.6–7.7)	6.7 ± 0.6(6.0–7.4)	
胫骨长(Tib, mm)	14.46	15.42	14.03	13.17 ± 1.10(12.58–14.88)	13	14.0 ± 0.7(13.0–14.7)	13.6 ± 0.7(12.8–14.8)	12
耳长(E, mm)	11.23	12.84	12.91	13.26 ± 0.84(12.18–14.00)	9.9	12.3 ± 0.7(11.5–12.6)	12.7 ± 0.8(12.0–13.3)	
颅全长(GTL, mm)	15.22	15.61	14.51	15.42 ± 0.24(15.11–15.68)	14.4	14.64(14.18–14.94)	15.01 ± 0.29(14.62–15.33)	14.2
枕犬长(CCL, mm)	12.99	13.67	12.75	13.26 ± 0.06(13.21–13.32)	12.5	12.36(12.14–12.59)	12.66 ± 0.24(12.43–12.99)	
颧宽(ZW, mm)	8.43	8.6	8.16	8.28 ± 0.15(8.07–8.40)	7.5	8.03 ± 0.15(7.84–8.22)	8.16 ± 0.11(8.09–8.36)	7.59
眶间宽(IOW, mm)	4.17	4.28	4.1	4.09 ± 0.12(3.96–4.25)	4.1	4.28 ± 0.11(4.18–4.46)	4.17 ± 0.10(4.01–4.28)	4.17
脑颅高(BCH, mm)	5.71	5.93	5.82	6.75 ± 0.72(5.79–7.37)	5.6	5.67 ± 0.12(5.49–5.77)	5.57 ± 0.12(5.44–5.78)	
腭长(PL, mm)	6.2	6.23	6.29	6.27 ± 0.19(6.07–6.53)				6.02
上齿列长(C ¹ –M ³ , mm)	4.71	5.91	4.61	4.91 ± 0.15(4.77–5.12)	4.7	4.60(4.50–4.70)	4.68 ± 0.09(4.61–4.82)	4.27
上犬齿宽(C ¹ –C ¹ , mm)	3.7	3.72	3.46	3.72 ± 0.09(3.59–3.78)	3.4	3.43(3.21–3.62)	3.55(3.49–3.63)	3.18
上臼齿宽(M ³ –M ³ , mm)	5.2	5.35	4.97	5.42 ± 0.30(4.98–5.62)	5.4	4.92 ± 0.23(4.62–5.19)	5.01 ± 0.13(4.87–5.18)	
上犬齿前臼齿长(CP ⁴ L, mm)	2.26	2.34				2.08(2.05–2.11)	2.15 ± 0.05(2.08–2.22)	
下齿列长(C ₁ –M ₃ , mm)	5.39	5.7	5.12	4.82 ± 0.89(3.49–5.44)	5.1	5.11 ± 0.17(4.89–5.33)	5.19 ± 0.08(5.10–5.32)	4.46
下犬齿前臼齿长(CP ₄ L, mm)	1.94	2.05				1.87 ± 0.06(1.82–1.96)	1.92 ± 0.09(1.77–2.00)	
下颌长(ML, mm)	9.6	10.01	9.25	9.66 ± 0.08(9.59–9.76)	9.6	9.46 ± 0.14(9.29–9.60)	9.57 ± 0.25(9.33–9.97)	8.59
下颌高(MH, mm)	3.27	3.42	3.39	3.18 ± 0.05(3.11–3.22)		2.92 ± 0.14(2.80–3.15)	3.03 ± 0.12(2.88–3.23)	2.87

Wt, weight; FA, forearm length; T, tail length; HF, hindfoot length; Tib, tibia length; E, ear length; GTL, greatest length of skull; CCL, condylo–canine length; ZW, zygomatic width; IOW, interorbital of width; BCH, braincase height; PL, palate length; C¹–M³, upper canine–third molar length; C¹–C¹, rostrum width across upper canines; M³–M³, width across third upper molars; CP⁴L, upper canine–premolar length; C₁–M₃, lower canine–third molar length; CP₄L, lower canine–premolar length; ML, mandibular length.

胡宜峰, 余文华, 岳阳, 黄正澜懿, 李玉春, 吴毅. 海南岛翼手目物种多样性现状与分布预测. 生物多样性, 2019, 27 (4): 400–408.

<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2018256>

参考文献

- Eger JL, Lim BK (2011) Three new species of *Murina* from Southern China (Chiroptera: Vespertilionidae). *Acta Chiropterologica*, 13, 227–243.
- Furey NM, Thong VD, Bates PJJ, Csorba G (2009) Description of a new species belonging to the *Murina* ‘suilla-group’ (Chiroptera: Vespertilionidae: Murinae) from North Vietnam. *Acta Chiropterologica*, 11, 225–236.
- Hu YF, Li F, Wu Y, Li YC, Yu WH (2018) New record of *Harpiocephalus harpia* in Hainan Province. *Journal of Zhejiang Forestry Science and Technology*, 38(3), 85–88. (in Chinese with English abstract) [胡宜峰, 黎舫, 吴毅, 李玉春, 余文华 (2018) 海南省蝙蝠新记录——毛翼管鼻蝠. 浙江林业科技, 38(3), 85–88.]
- Jiang ZG, Jiang JP, Wang YZ, Zhang E, Zhang YY, Li LL, Xie F, Cai B, Cao L, Zheng GM, Dong L, Zhang ZW, Ding P, Luo ZH, Ding CQ, Ma ZJ, Tang SH, Cao WX, Li CW, Hu HJ, Ma Y, Wu Y, Wang YX, Zhou KY, Liu SY, Chen YY, Li JT, Feng ZJ, Wang Y, Wang B, Li C, Song XL, Cai L, Zang CX, Zeng Y, Meng ZB, Fang HX, Ping XG (2016) Red List of China’s Vertebrates. *Biodiversity Science*, 24, 500–551. (in Chinese and in English) [蒋志刚, 江建平, 王跃招, 张鹗, 张雁云, 李立立, 谢锋, 蔡波, 曹亮, 郑光美, 董路, 张正旺, 丁平, 罗振华, 丁长青, 马志军, 汤宋华, 曹文宣, 李春旺, 胡慧建, 马勇, 吴毅, 王应祥, 周开亚, 刘少英, 陈跃英, 李家堂, 冯祚建, 王燕, 王斌, 李成, 宋雪琳, 蔡蕾, 臧春鑫, 曾岩, 孟智斌, 方红霞, 平晓鸽 (2016) 中国脊椎动物红色名录. 生物多样性, 24, 500–551.]
- Jiang ZG, Ma Y, Wu Y, Wang YX, Zhou KY, Liu SY, Feng ZJ, Li LL (2015) China’s Mammal Diversity and Geographic Distribution. Science Press, Beijing. (in Chinese with English abstract) [蒋志刚, 马勇, 吴毅, 王应祥, 周开亚, 刘少英, 冯祚建, 李立立 (2015) 中国哺乳动物多样性及地理分布. 科学出版社, 北京.]
- Li DW, Yin F, Zeng Y, Zhang Y, Zhang XW (2010) Cluster analysis on the distribution patterns of Chiroptera in Hainan Island. *Journal of Biology*, 27(2), 16–20. (in Chinese with English abstract) [李德伟, 尹锋, 曾玉, 张园, 张信文 (2010) 海南岛翼手类地理分布格局的聚类分析. 生物学杂志, 27(2), 16–20.]
- Li YC, Chen Z, Long YR, Zhou F, Zhong YR (2006a) Species diversity of Chiroptera in Ma’anling Volcano Area, Hainan Island. *Chinese Journal of Zoology*, 41, 106–109. (in Chinese with English abstract) [李玉春, 陈忠, 龙育儒, 周锋, 钟友仁 (2006a) 海南岛马鞍岭火山口地区翼手目物种多样性. 动物学杂志, 41, 106–109.]
- Li YC, Wu Y, Chen Z (2006b) A new record of Rickett’s big-footed bat *Myotis ricketti* in Hainan Island of China. *Acta Theriologica Sinica*, 26, 211–212. (in Chinese with English abstract) [李玉春, 吴毅, 陈忠 (2006b) 海南岛发现大足鼠耳蝠分布新纪录. 兽类学报, 26, 211–212.]
- Liu ZX, Zhang YX, Zhang JS, Zhang LB (2014) *Murina eleryi* discovered in Hunan Province. *Chinese Journal of Zoology*, 49, 132–135. (in Chinese with English abstract) [刘志霄, 张佑祥, 张劲硕, 张礼标 (2014) 湖南省发现艾氏管鼻蝠. 动物学杂志, 49, 132–135.]
- Shaw TH, Wang S, Lu CK, Chang LK (1966) A survey of the mammals of Hainan Island, China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 3, 260–276. (in Chinese with English abstract) [寿振黄, 汪松, 陆长坤, 张鑑光 (1966) 海南岛的兽类调查. 动物分类学报, 3, 260–276.]
- Shi HT (2001) Retrieval of Terrestrial Vertebrates in Hainan. Hainan Publishing House, Haikou. (in Chinese) [史海涛 (2001) 海南陆栖脊椎动物检索. 海南出版社, 海口.]
- Wang YX (2003) A Complete Checklist of Mammal Species and Subspecies in China: A Taxonomic and Geographic Reference. China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese with English abstract) [王应祥 (2003) 中国哺乳动物物种与亚种分类名录与分布大全. 中国林业出版社, 北京.]
- Wu Y, Li YC, Lin LK, Harada M, Chen Z, Motokawa M (2012) New records of *Kerivoula titania* (Chiroptera:

- 胡宜峰, 余文华, 岳阳, 黄正澜懿, 李玉春, 吴毅. 海南岛翼手目物种多样性现状与分布预测. 生物多样性, 2019, 27 (4): 400–408.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2018256>
Vespertilionidae) from Hainan Island and Taiwan. Mammal Study, 37, 69–72.
- Wu Y, Jiang HS, Peng HY, Li SN, Wang WY (2003) Study on the species biodiversity of mammals in Diaoluoshan Mountain. Journal of Guangzhou University (Natural Science Edition), 2, 505–511. (in Chinese with English abstract) [吴毅, 江海声, 彭洪元, 李仕宁, 王文毅 (2003) 吊罗山保护区哺乳动物多样性初步研究. 广州大学学报(自然科学版), 2, 505–511.]
- Xu L H, Liu ZH, Yu SM (1983) Birds and Beasts of Hainan Island, China. Science Press, Beijing. (in Chinese) [徐龙辉, 刘振河, 余斯绵 (1983) 海南岛的鸟兽. 科学出版社, 北京.]
- Xu ZX, Yu WH, Wu Y, Li F, Chen BC, Harada M, Motokawa M, Gong YN, Li YC (2014) Preliminary study on population genetic structure and taxonomy of Elery's tube-nosed bat (*Murina eleryi*). Acta Theriologica Sinica, 34, 270–277. (in Chinese with English abstract) [徐忠鲜, 余文华, 吴毅, 李锋, 陈柏承, 原田正史, 本川雅治, 龚粤宁, 李玉春 (2014) 艾氏管鼻蝠种群遗传结构初步研究及其分类探讨. 兽类学报, 34, 270–277.]
- Yu WH, Wu Y, Li YC, Jiang HS, Chen Z (2008) A new record of greater bamboo bat *Tylonycteris robustula* of Hainan Island. Journal of Guangzhou University (Natural Science Edition), 7, 30–33. (in Chinese with English abstract) [余文华, 吴毅, 李玉春, 江海声, 陈忠 (2008) 海南岛发现褐扁颅蝠(*Tylonycteris robustula*)分布新纪录. 广州大学学报(自然科学版), 7, 30–33.]
- Yu WH, Li F, Csorba G, Xu ZX, Wang XY, Guo WJ, Li YC, Wu Y (2018) A revision of *Kerivoula hardwickii* and occurrence of *K. furva* (Chiroptera: Vespertilionidae) in China. Zootaxa, 4461, 45–56.
- Zhang LB, Zhu GJ, Yu DM, Ye JP, Zhang W, Hong TY, Tan M (2008) New record of *Tylonycteris robustula* (Chiroptera: Vespertilionidae) from Hainan, Guizhou, and Sichuan Province. Acta Theriologica Sinica, 28, 316–320. (in Chinese with English abstract) [张礼标, 朱光剑, 于冬梅, 叶建平, 张伟, 洪体玉, 谭敏 (2008) 海南、贵州和四川三省翼手类新纪录——褐扁颅蝠. 兽类学报, 28, 316–320.]
- Zhang RZ (1999) Zoogeography of China. Science Press, Beijing. (in Chinese) [张荣祖 (1999) 中国动物地理. 科学出版社, 北京.]
- Zhu BL, Zhu GJ, Li DW, Hong TY, Zhang XW (2008) A preliminary survey on species diversity of Chiroptera in Hainan Island. Journal of Hainan Normal University (Natural Science), 21(1), 75–81. (in Chinese with English abstract) [朱斌良, 朱光剑, 李德伟, 洪体玉, 张信文 (2008) 海南岛翼手目物种多样性的初步调查. 海南师范大学学报(自然科学版), 21, 75–81.]
- Zhu GJ, Li DW, Ye JP, Hong TY, Zhang LB (2008a) New record of *Ia io* in Hainan Island, its echolocation pulses and ND1 analysis. Chinese Journal of Zoology, 43, 69–75. (in Chinese with English abstract) [朱光剑, 李德伟, 叶建平, 洪体玉, 张礼标 (2008a) 南蝠海南岛分布新纪录、回声定位信号和ND1分析. 动物学杂志, 43, 69–75.]
- Zhu GJ, Han NJ, Hong TY, Tan M, Yu DM, Zhang LB (2008b) Echolocation call, roost and ND1 sequence analysis of new record of *Nyctalus plancyi* (Chiroptera: Vespertilionidae) on Hainan Island. Zoological Research, 29, 447–451. (in Chinese with English abstract) [朱光剑, 韩乃坚, 洪体玉, 谭敏, 于冬梅, 张礼标 (2008b) 海南属种新纪录——中华山蝠的回声定位信号、栖息地及序列分析. 动物学研究, 29, 447–451.]