•方法•

7个林木大小多样性指数表达能力比较

娄明华¹ 白超^{2*} 惠刚盈³ 汤孟平⁴

1 (宁波市农业科学研究院, 浙江宁波 315040)

2 (宁波市环境保护科学研究设计院, 浙江宁波 315010)

3 (中国林业科学研究院林业研究所, 国家林业局林木培育重点实验室, 北京 100091)

4 (浙江农林大学森林生态系统碳循环与固碳减排省重点实验室, 杭州 311300)

摘要: 林木大小多样性直接反映森林生态系统的健康与稳定, 客观恰当地表达大小多样性对于评价天然林或人工林的经济、生态、社会价值及其经营效果至关重要。本研究选用7个林木大小多样性指数, 其中4个与距离无关(Simpson大小多样性指数 D_N 、Shannon大小多样性指数 H_N 、断面积Gini系数 GC 和直径变异系数 CV_d), 3个与距离有关(Simpson大小分化度指数 D_T 、Shannon大小分化度指数 H_T 和大小分化度均值指数 $\bar{T}$), 通过6组模拟林分 and 4块实测林分比较分析了它们的表达能力。结果表明: 不考虑极端情况(极端情况为对比林分林木大小混交不同但林木直径构成完全相同), GC 、 CV_d 、 $\bar{T}$ 、 D_T 和 H_T 能客观恰当地表达不同径级分布林分的林木大小多样性差异, 其中 CV_d 区分能力最强, GC 次之。若考虑极端情况, 只有 $\bar{T}$ 、 D_T 和 H_T 能区分出不同大小混交程度林分的林木大小多样性差异。本研究认为 CV_d 和 GC 因计算简单, 易于实际应用, 在营林活动中可作为分析林木大小多样性的首选指数; $\bar{T}$ 因能识别不同大小混交程度林分的空间差异, 即对林分更新变化敏感, 适用于动态分析林分的结构特征。

关键词: 林木大小多样性; 直径分布; 大小分化度; 大小混交; 大小隔离

Comparison of distinguish ability on seven tree size diversity indices

Minghua Lou¹, Chao Bai^{2*}, Gangying Hui³, Mengping Tang⁴

1 Ningbo Academy of Agricultural Sciences, Ningbo, Zhejiang 315040

2 Ningbo Scientific Research and Design Institute of Environmental Protection, Ningbo, Zhejiang 315010

3 Key Laboratory of Tree Breeding and Cultivation of State Forestry Administration, Research Institute of Forestry, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091

4 Zhejiang Provincial Key Laboratory of Carbon Cycling in Forest Ecosystems and Carbon Sequestration, Zhejiang A & F University, Hangzhou 311300

Abstract: Tree size diversity directly reflects forest ecosystem health and stability. Objective and appropriate evaluation of tree size is essential for understanding the economic, ecological and social value of natural forests or plantations as well as for effective forest stand management. Four distance-free diversity indices (simpson size diversity index, D_N ; shannon size diversity index, H_N ; gini coefficient index of basal area, GC ; diameter coefficient of variation index, CV_d) and three distance-related indices (simpson size differentiation index, D_T ; shannon size differentiation index, H_T ; mean size differentiation index, $\bar{T}$) were selected to analyze the tree size diversity of six types of simulated stands and four measured stand plots with different diameter distribution and spatial patterns. The results show that regardless of extreme that such as compared stands have the same diameter composition but have different size mingling, GC , CV_d , $\bar{T}$, D_T and H_T can distinguish tree size diversity between stand types which have different diameter distributions objectively and properly. CV_d had the best result followed by GC . Accounting for extreme, the distance-related indices, namely $\bar{T}$, D_T and H_T can distinguish the difference between different size mingling stands. CV_d and GC can be used as the preferred indices in the practical application for calculating simple facilitate. $\bar{T}$ can be used to analyze the dynamic changes of forest structural characteristics for its high distinction ability of spatial

收稿日期: 2018-12-26; 接受日期: 2019-03-19

基金项目: 国家自然科学基金(31800539; 31700563; 31870617)、国家林业局林业公益性行业科研专项(20150430303)和宁波市农业科学研究院院长基金(2018NKYP005)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: 506064788@qq.com

difference that due to its sensitivity to regeneration.

Key words: tree size diversity; diameter distribution; size differentiation; size mingling; size segregation

森林结构的复杂多样通常意味着稳定持久的生态功能,提高森林结构多样性可以促进生物多样性的增加(郑景明和罗菊春,2003),近年来的一些研究甚至认为森林结构多样性对森林生产力或地上碳储量的影响比生物多样性更大(Ali et al, 2016; Dănescu et al, 2016)。可见对林分结构多样性的研究具有重要意义。林分结构多样性主要包括林木格局多样性和林木大小多样性等(Pommerening, 2002)。其中,林木大小多样性是描述林分内林木大小的差异程度,差异越大的林分空间异质性越强,能容纳更多的物种。例如林分径级变异越大,林分结构越复杂,为各种动植物和微生物提供的小生境或食物的多样性就越高,林分内总体的生物多样性就越高(Fries et al, 1997; Rolstad et al, 2001; 雷相东和唐守正, 2002; 郑景明和罗菊春, 2003)。林木大小多样性一般采用直径、树高和冠幅3个因子来描述,由于直径在林分中测定简单、方便、准确(孟宪宇, 2006),而且通常与其他因子(树高和冠幅)之间高度相关(Lexerød & Eid, 2006),因此被普遍用于分析林木大小多样性(Solomon & Gove, 1999; Lexerød & Eid, 2006; McRoberts et al, 2008)。本研究亦采用直径进行分析。

现代森林生态系统经营策略的基础是提高林分结构的复杂多样,以达到可持续经营的目的。为改善森林经营管理的决策,描述林木大小多样性的指数已被引入森林调查和经营研究中,如何选择新的或基于现有的知识选择与营林目的相符的、更加简单适用的大小多样性指数,对许多森林管理者更迫切(郑景明和罗菊春, 2003)。目前,已有描述林木大小多样性的指数大多与距离无关,其中,用径阶株数或断面积代替树种反映林木大小多样性的Shannon多样性指数最为常用(雷相东和唐守正, 2002)。此外,还有分析林木大小不一致性的断面积Gini系数、直径离散程度的变异系数以及描述直径分布特征的偏度等(Weiner & Solbrig, 1984; Neumann & Starlinger, 2001; Liang et al, 2007; 王懿祥, 2014; Dănescu et al, 2016)。然而,这些与距离无关的林木大小多样性指数没有考虑空间结构特征,不

能全面细微地反映出林分间的差异。事实上,空间结构特征决定了林分内的生境和物种多样性,对林分的发展有决定性的影响(雷相东和唐守正, 2002)。Gadow和Füldner (1992)提出的林木大小分化度能度量出林分内每株林木与其相邻木之间的大小差异程度,亦可通过均值反映林分整体的林木大小差异程度,易于在森林经营活动中应用。因此,本研究分别选用4个与距离无关和3个与距离有关的林木大小多样性指数,结合营林目的比较分析它们表达林木大小多样性的能力,为选择合适的森林生物多样性的结构多样性评价方法和森林经营提供理论与技术参考。

1 材料与方法

1.1 数据

1.1.1 模拟数据

根据2种林分径级分布类型(倒J型和正态分布)和3种林分空间分布格局(均匀分布、随机分布和聚集分布),分别利用空间分析软件Winkelmass (惠刚盈等, 2007)模拟6组不同组合的林分类型,即倒J均匀、倒J随机、倒J聚集、正态均匀、正态随机、正态聚集;每组重复模拟100次。

本研究进一步模拟了极端情况(直径构成相同)下12块林木大小混交和隔离的林分。其中6块直径构成相同,且径级分布呈倒J型:倒J均匀混交、倒J均匀隔离、倒J随机混交、倒J随机隔离、倒J聚集混交和倒J聚集隔离;另外6块为直径构成相同,且径级呈正态分布:正态均匀混交、正态均匀隔离、正态随机混交、正态随机隔离、正态聚集混交和正态聚集隔离(附录1)。

所有模拟林分样地面积均设置为50 m × 50 m,林木株数为400株,林木直径范围5–60 cm,边缘缓冲设置5 m。

1.1.2 实测数据

根据林分直径分布类型和空间分布格局的不同,选取4块实测林分,分别为正态随机分布的浙江天目山毛竹(*Phyllostachys edulis*)纯林、正态均匀分布的北京中国林业科学研究院院内白皮松(*Pinus*

bungeana)人工林、倒J聚集分布的浙江奉化海岛常绿-落叶阔叶混交林和倒J随机分布的甘肃小陇山百花林场锐齿栎(*Quercus aliena* var. *acutidentata*)落叶混交林(附录2)。4块实测样地面积均按50 m × 50 m 处理分析,边缘缓冲区设置为5 m。

1.2 林木大小多样性指数的评价标准

林木大小多样性指数是对林木大小差异程度的量化评价指标,其评价能力的优劣取决于是否与营林目的相符,即与森林经营理念相符。结合 Lexterød和Eid (2006)提出的逻辑排序,本文得出以下符合营林目的的逻辑排序: (1)不同径级分布类型的两个林分,倒J分布的林分林木大小多样性指数值应高于正态分布的林分; (2)相同径级分布类型的两个林分,林木大小混交状态的林分林木大小多样性指数值应高于林木大小隔离状态的林分; (3)相同径级分布类型的两个林分,径级分布范围广的林分林木大小多样性指数值应高于分布范围窄的林分; (4)相同径级分布类型的两个林分,大树株数比例少但其断面积对总林分断面积影响大的林分,林木大小多样性指数值应高于大树株数比例少且其断面积对总林分断面积影响中等的林分,也高于大树株数比例多且其断面积总和几乎等于总林分断面积的林分。此外,本研究采用林分之间的大小多样性指数值变异系数(CV)评价不同指数的识别能力, CV 值越大说明越能识别不同林分的大小多样性差异程度,即指数识别能力越佳。

表 1 与距离无关的林木大小多样性指数
Table 1 Distance-free indices of tree size diversity

指数 Index	公式 Formula	指数值的理论范围 Theoretical index value range	参考文献 Reference
Simpson 大小多样性指数 Simpson size diversity index	$D_N = 1 - \sum_{j=1}^S p_j^2$	[0, 1]	Valbuena, 2012
Shannon 大小多样性指数 Shannon size diversity index	$H_N = - \sum_{j=1}^S p_j \ln(p_j)$	[0, ln(S)]	Buongiorno, 2001
断面积 Gini 系数 Gini coefficient index of basal area	$GC = \frac{\sum_{i=1}^n (2i - n - 1)BA_i}{\sum_{i=1}^n BA_i(n - 1)}$	[0, 1]	Duduman, 2011
直径变异系数 Diameter coefficient of variation index	$CV_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}} / \bar{d}$	[0, 1]	Huang, 2000

S为径阶数, p_j 为第j径阶林木株数占总株数的频率, BA_i 为第i级林木断面积(m^2), n 为林分内林木总株数, $\bar{d}$ 为林木的平均直径(cm)。
S represents number of diameter classes, p_j represents proportion of tree numbers in size class j , BA_i represents basal area for tree with rank i (m^2), n represents total number of trees, d represents mean diameter (cm).

1.3 林木大小多样性量化测度指数

本研究是在林分水平上研究林木大小多样性,因此选择测度林分水平的 α 多样性指数即应用最广泛的Shannon指数(Shannon, 1949)和Simpson指数(Simpson, 1949)。

1.3.1 与距离无关的林木大小多样性指数

选择4个与距离无关的大小多样性指数,分别为Simpson大小多样性指数(D_N)、Shannon大小多样性指数(H_N)、断面积Gini系数(GC)和直径变异系数(CV_d),每个指数的计算方法见表1。按2 cm划分径级。

1.3.2 与距离有关的林木大小多样性指数

选择3个与距离有关的林木大小多样性指数,分别为Simpson大小分化度指数(D_T)、Shannon大小分化度指数(H_T)和大小分化度均值指数($\bar{T}$),每个指数的计算方法见表2。林木大小分化度(T_i)是Gadow和Füldner (1992)研究混交林时提出的概念,为避免多株最近相邻木的平均值导致潜在折中混淆的问题,本研究只采用最近一株相邻木进行分析。当 $T_i = 0$ 时说明最近相邻木与参照树的大小相同; $T_i \approx 1$ 时则表示最近相邻木与参照树之间相差非常悬殊。计算 D_T 和 H_T 时,参考惠刚盈和Gadow (2003)提出的空间结构参数,将 T_i 划分为5个等级: (1) $0 \leq T_i < 0.2$, 对象木与其最近邻木之间相差20%以下; (2) $0.2 \leq T_i < 0.4$, 对象木与其最近邻木之间相差20%–40%; (3) $0.4 \leq T_i < 0.6$, 对象木与其最近邻木

表 2 与距离有关的林木大小多样性指数

Table 2 Distance-related indices of tree size diversity

指数 Index	公式 Formula	指数值理论范围 Theoretical index value range	参考文献 Reference
Simpson大小分化度指数 Simpson size differentiation index	$D_T = 1 - \sum_{i=1}^5 P_i^2$	[0, 1]	Bai & Hui, 2016
Shannon大小分化度指数 Shannon size differentiation index	$H_T = -\sum_{i=1}^5 P_i \ln(P_i)$	[0, ln(5)]	Bai & Hui, 2016
大小分化度均值指数 Mean size differentiation index	$\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i$	[0, 1]	Gadow & Fuldner, 1992
	$T_i = 1 - \frac{\min(d_i, d_1)}{\max(d_i, d_1)}$	[0, 1)	Gadow & Fuldner, 1992

P_i ($i = 1, \dots, 5$)为样地核心区第*i*个大小分化等级上的林木株数占总株数的频率, N 为核心区内的林木总株数, T_i 为第*i*株林木的大小分化度, d_i 为参照木直径, d_1 为参照木的最近一株相邻木直径。

P_i ($i = 1, \dots, 5$) represents proportion of tree numbers in size differentiation class i during core area, N represents total number of trees during core area, T_i represents size differentiation of tree i , d_i represents diameter of reference tree, d_1 represents diameter of neighborhood tree that nearest reference tree.

之间相差40%–60%; (4) $0.6 \leq T_i < 0.8$, 对象木与其最近邻木之间相差60%–80%; (5) $0.8 \leq T_i < 1.0$, 对象木与其最近邻木之间相差达到80%及以上。

2 结果

2.1 模拟分析

2.1.1 不考虑林木的大小隔离和混交情况

由表3和表4可知, 除了 D_N 和 H_N , 其他5个指数即 D_T 、 H_T 、 $\bar{T}$ 、 GC 和 CV_d 计算得到的林木大小多样性指数值均是径级为正态分布的林分低于倒J型的, 7个指数中只有 D_N 和 H_N 的评价结果不符合逻辑排序。从表3中指数值的变异系数 CV 可以看出, 符合逻辑排序的5个林木大小多样性指数的识别能力从

大到小依次为 CV_d (42.2%) > GC (37.0%) > $\bar{T}$ (23.5%) > H_T (12.1%) > D_T (7.8%)。结合6组模拟林分指数值之间的两两比较(表4)可以看出, 符合逻辑排序的5个指数即 D_T 、 H_T 、 $\bar{T}$ 、 GC 和 CV_d 均表现为不同径级分布类型之间的大小多样性指数值具有显著差异, 而相同径级分布类型不同分布格局之间的大小多样性指数值没有显著差异。可见, 径级分布类型是影响林木大小多样性的显著因素, 而分布格局的影响不显著。

在不考虑林木大小是否隔离时, 仅从分布格局和径级分布类型看, 只有5个林木大小多样性指数, 即 GC 、 CV_d 、 D_T 、 H_T 和 $\bar{T}$ 能客观恰当地表达不同类型林分的林木大小多样性, 且指数的识别能力从高

表 3 模拟林分的 7 个林木大小多样性指数的范围及变异系数

Table 3 Range and coefficient of variation (CV) of seven tree size diversity indices for the simulated stands

指数 Indices	正态径级分布 Normal-shaped diameter distribution			倒J径级分布 Inverse J-shaped diameter distribution			变异系数 CV (%)
	均匀 Uniform	随机 Random	聚集 Aggregation	均匀 Uniform	随机 Random	聚集 Aggregation	
D_N	0.930–0.941	0.926–0.942	0.930–0.942	0.814–0.924	0.816–0.913	0.815–0.921	3.5
H_N	2.820–2.964	2.796–2.968	2.801–2.969	1.963–2.790	1.985–2.724	2.011–2.783	10.1
GC	0.269–0.317	0.270–0.323	0.271–0.313	0.520–0.627	0.530–0.631	0.529–0.639	37.0
CV_d	0.259–0.305	0.255–0.308	0.253–0.298	0.532–0.684	0.547–0.691	0.543–0.704	42.2
D_T	0.617–0.696	0.624–0.696	0.616–0.694	0.727–0.773	0.731–0.775	0.733–0.779	7.8
H_T	1.070–1.267	1.092–1.279	1.049–1.274	1.361–1.524	1.366–1.533	1.373–1.548	12.1
$\bar{T}$	0.238–0.303	0.234–0.297	0.227–0.298	0.334–0.464	0.345–0.452	0.351–0.464	23.5

D_N , H_N , GC , CV_d , D_T , H_T 和 $\bar{T}$ 见表1、2。

D_N , H_N , GC , CV_d , D_T , H_T 和 $\bar{T}$ as in Table 1 and 2.

到低依次为 $CV_d > GC > \bar{T} > H_T > D_T$ 。

2.1.2 考虑林木的大小隔离和混交情况

从表5可以看出, 对于直径构成相同但大小混交程度不同的林分, 4个与距离无关的林木大小多样性指数, 即 D_N 、 H_N 、 GC 和 CV_d 的计算值是完全相同的, 显然, 这4个指数无法识别出这些林分之间大小混交差别的细微空间特征。

从表5可以看出, 与距离有关的林木大小多样性指数 $\bar{T}$ 、 D_T 和 H_T 能很好地识别直径构成相同但大小混交程度不同的空间特征差异, 都表现为林木大小隔离的林分指数值远远低于大小混交的林分。值得注意的是, 倒J径级分布且大小隔离林分的林木大小多样性指数值远远低于正态径级分布且大小混交的林分。由此可见, 林木大小是否隔离应该作

为选择林木大小多样性指数时首要考虑的因素。在林木大小混交时, 3个与距离有关的林木大小多样性指数都表现为径级分布为倒J型的林分林木大小多样性高于正态分布的林分; 在林木大小隔离时(表5), 只有 $\bar{T}$ 的指数值表现为倒J型的略高于正态分布的林分。

综上所述, 与距离无关的指数 D_N 和 H_N 不能符合逻辑地识别不同径级分布林分的大小多样性; 符合逻辑排序的 GC 和 CV_d 不能识别直径构成相同但大小混交程度不同林分的大小多样性差异。与距离有关的 D_T 和 H_T 只能在林木大小混交情况下符合逻辑排序地识别不同径级分布林分的大小多样性, 而 $\bar{T}$ 则能在林木大小混交或隔离情况下较好识别出不同径级分布类型林分的林木大小多样性。

表 4 模拟林分的 7 个林木大小多样性指数均值(标准差)
Table 4 Mean (standard deviation) of seven tree size diversity indices for the simulated stands

指数 Indices	正态径级分布 Normal-shaped diameter distribution			倒J径级分布 Inverse J-shaped diameter distribution		
	均匀 Uniform	随机 Random	聚集 Aggregation	均匀 Uniform	随机 Random	聚集 Aggregation
D_N	0.936 (0.002) ^a	0.936 (0.003) ^a	0.935 (0.002) ^a	0.877 (0.022) ^b	0.877 (0.022) ^b	0.881 (0.023) ^b
H_N	2.890 (0.033) ^a	2.892 (0.039) ^a	2.884 (0.032) ^a	2.394 (0.169) ^{bc}	2.388 (0.166) ^c	2.426 (0.176) ^b
GC	0.292 (0.010) ^a	0.291 (0.011) ^a	0.290 (0.010) ^a	0.588 (0.023) ^b	0.585 (0.022) ^b	0.589 (0.023) ^b
CV_d	0.278 (0.010) ^a	0.278 (0.011) ^a	0.276 (0.010) ^a	0.625 (0.034) ^b	0.621 (0.032) ^b	0.627 (0.033) ^b
D_T	0.657 (0.016) ^a	0.659 (0.017) ^a	0.656 (0.016) ^a	0.757 (0.010) ^b	0.757 (0.009) ^b	0.759 (0.010) ^b
H_T	1.173 (0.041) ^a	1.180 (0.043) ^a	1.171 (0.042) ^a	1.463 (0.037) ^b	1.462 (0.035) ^b	1.470 (0.038) ^b
$\bar{T}$	0.262 (0.013) ^a	0.262 (0.014) ^a	0.261 (0.013) ^a	0.404 (0.025) ^b	0.403 (0.025) ^b	0.406 (0.026) ^b

D_N , H_N , GC , CV_d , D_T , H_T 和 $\bar{T}$ 见表1、2。同一行不同小写字母表示差异显著(LSD检验, $P < 0.05$)。
 D_N , H_N , GC , CV_d , D_T , H_T and $\bar{T}$ as in Table 1 and 2. Different letters indicate significant differences in the same row (LSD test, $P < 0.05$).

表 5 12 块不同林木大小混交与大小隔离的模拟林分林木大小多样性指数值
Table 5 Tree size diversity indices of different size mingling and size segregation for twelve different simulated stands

林分类型 Stand type	D_N	H_N	GC	CV_d	D_T	H_T	$\bar{T}$
倒J均匀混交 Inverse J-shaped uniform mingling type	0.897	2.610	0.633	0.692	0.770	1.512	0.437
倒J均匀隔离 Inverse J-shaped uniform segregation type	0.897	2.610	0.633	0.692	0.054	0.154	0.067
倒J随机混交 Inverse J-shaped random mingling type	0.897	2.610	0.633	0.692	0.769	1.510	0.421
倒J随机隔离 Inverse J-shaped random segregation type	0.897	2.610	0.633	0.692	0.049	0.140	0.050
倒J聚集混交 Inverse J-shaped aggregated mingling type	0.897	2.610	0.633	0.692	0.772	1.521	0.421
倒J聚集隔离 Inverse J-shaped aggregated segregation type	0.897	2.610	0.633	0.692	0.035	0.107	0.041
正态均匀混交 Normal-shaped uniform mingling type	0.937	2.906	0.299	0.282	0.673	1.208	0.275
正态均匀隔离 Normal-shaped uniform segregation type	0.937	2.906	0.299	0.282	0.078	0.196	0.040
正态随机混交 Normal-shaped random mingling type	0.937	2.906	0.299	0.282	0.665	1.184	0.269
正态随机隔离 Normal-shaped random segregation type	0.937	2.906	0.299	0.282	0.044	0.123	0.032
正态聚集混交 Normal-shaped aggregated mingling type	0.937	2.906	0.299	0.282	0.660	1.177	0.268
正态聚集隔离 Normal-shaped aggregated segregation type	0.937	2.906	0.299	0.282	0.030	0.085	0.024

D_N , H_N , GC , CV_d , D_T , H_T 和 $\bar{T}$ 见表1、2。
 D_N , H_N , GC , CV_d , D_T , H_T and $\bar{T}$ as in Table 1 and 2.

表 6 4 块实测样地的林木大小多样性指数值

Table 6 Tree size diversity indices for four measured plots

指数 Index	HZ	NB	BJ	GS	CV (%)
GC	0.16	0.543	0.204	0.553	0.581
CV _d	0.146	0.554	0.186	0.566	0.628
D _T	0.330	0.726	0.489	0.750	0.350
H _T	0.557	1.368	0.792	1.421	0.413
$\bar{T}$	0.126	0.324	0.169	0.396	0.502

HZ: 浙江毛竹林; NB: 浙江混交林; BJ: 北京白皮松林; GS: 甘肃混交林。CV: 变异系数。D_N, H_N, GC, CV_d, D_T, H_T和 $\bar{T}$ 见表1、2。

HZ, *Phyllostachys edulis* forest in Zhejiang Province; NB, Mixed forest in Zhejiang Province; BJ, *Pinus Bungeana* plantation in Beijing; GS, Mixed forest in Gansu Province. CV, Coefficient of variation. D_N, H_N, GC, CV_d, D_T, H_T and $\bar{T}$ as in Table 1 and 2.

2.2 实例分析

采用GC、CV_d、D_T、H_T和 $\bar{T}$ 这5个指数进行实例分析。从表6可以看出, 5个林木大小多样性指数值均呈现为甘肃混交林(GS) > 浙江混交林(NB) > 北京白皮松林(BJ) > 浙江毛竹林(HZ), 都能符合逻辑排序地表达出径级分布呈倒J型的2块林分(NB和GS)的林木大小多样性指数值高于呈正态分布的2块林分(BJ和HZ)。从2块径级分布呈倒J型的林分看, GS的林木径阶范围在[6 cm, 46 cm], NB的林木径阶范围在[6 cm, 42 cm], 这2块林分的径级分布范围相似, 从附录2可以看出GS和NB的大树比例少, 但GS中的大树断面积对林分总断面积的贡献高于NB, 这可能是GS的指数值高于NB的缘故。BJ和HZ的径级都呈正态分布, BJ林龄较HZ成熟得多, 由于年龄上的差异, BJ [10 cm, 38 cm]的径级分布范围比HZ [6 cm, 16 cm]的大得多, 因此, BJ林分的林木大小多样指数值远远高于HZ。从各实测样地指数值的变异系数CV来看, 各指数的识别能力从大到小排序仍然为CV_d > GC > $\bar{T}$ > H_T > D_T。

3 讨论

本文基于白超(2016)的研究, 结合营林目的, 通过模拟数据进一步分析7个林木大小多样性指数的表达能力。结果表明, 在林分水平上分布格局对林木大小多样性无显著影响, 但径级分布类型对林木大小多样性有显著影响。值得注意的是, 在林木大小隔离时, 径级分布为倒J型的林分林木大小多样性指数可能低于正态分布的林分。不过在现实林分中, 林分径级分布呈倒J型且大小隔离的情况较为少见, 可能现于由多个不同林龄组的同龄林构成的人工林中。林分的径级变异程度是诸多因素共

同作用的结果, 这些因素来源可分为外部与内部两类, 如水分、土壤、温度和小地形等为外部因素, 内部因素如树种、年龄和更新等。目前, 一般认为天然林的径级分布呈倒J型, 其林木大小多样性高于呈正态分布的人工林(Spies, 1998; Lexerød & Eid, 2006; O'hara et al, 2007)。由于不同种群的内禀增长率不同, 不同植物种群的个体大小差异大, 树种丰富的天然林往往能形成较为复杂多样的林分结构。“生态优先”的林业经营理念以森林可持续经营为基础(寇文正等, 2000), 而林下更新是实现森林可持续经营的关键(黄清麟, 2005)。从人工林的正态径级分布可知小径级林木少, 意味着林下更新差; 而呈倒J型径级分布的天然林具有众多的小径级林木, 林下更新丰富, 充足的林下更新为径级变异提供动力来源, 提高林木大小多样性的同时促进林分结构的异质性。从空间分布格局上看, 种子在母树周边天然更新, 从而形成不同大小的林木混交的情况, 也就是说当林下幼树更新好则会呈现出林木大小混交的格局, 进而提高林分的林木大小多样性。Wang等(2011)和Lei等(2009)的研究认为择伐或部分采伐通过改善林内环境促进林下幼树更新, 进而提高林木大小多样性。Varga (2005)和Lei等(2009)的研究认为林分成熟度促进林分的大小多样性, 随着林龄的增长, 径级结构的变异加大, 林分拥有更广的径级分布范围和更多的大径级林木, 直接构成林分垂直和水平结构上的复杂多样性, 进而提高林分的林木大小多样性。

本研究认为不用主观划分等级的CV_d、GC和 $\bar{T}$ 能较好识别林分的林木大小多样性差异。Lexerød和Eid (2006)与Valbuena (2012)的研究也指出, 避免主观分组的林木大小多样性指数因为尽可能地保留了原数据包含的所有信息, 所以具有更好的表达能力。到目前为止, 以径阶株数或断面积代替树种反映林木大小多样性的指数应用最广, 以断面积计算的Shannon大小多样性指数(Schulte & Buongiorno, 1998; Wikström & Eriksson, 2000; Buongiorno, 2001; Staudhammer & Lemay, 2001; 舒树森, 2015)比较常见, 例如向玮等(2011)以Shannon断面积多样性指数引入矩阵生长模型; 以株数计算的林木大小多样性(李超, 2016, 2017; 常荣涛, 2014; 赵中华等, 2019)也不少, 例如常荣涛(2014)采用Shannon直径(株数)大小多样性和物种多样性的二维联合熵分析栎类

和阔叶混交林林分结构多样性的动态。虽然Shannon大小多样性指数应用最广,但本研究与Rouvinen和Kuuluvainen (2005)的结果都认为以株数计算的Shannon大小多样性指数不能恰当识别不同类型林分的林木大小多样性。不过以断面面积计算的Shannon大小多样性指数表达能力如何,还有待进一步分析研究。

本研究仅从林分直径分布类型和林木分布格局模拟分析评价了7个林木大小多样性指数的表达能力,尚有待于进一步系统分析评价林木径级分布范围和大树断面面积占总林分断面面积比例不同等情况下不同大小多样性指数的表达能力。

参考文献

- Ali A, Yan ER, Chen HYH, Chang SX, Zhao YT, Yang XD, Xu MS (2016) Stand structural diversity rather than species diversity enhances aboveground carbon storage in secondary subtropical forests in Eastern China. *Biogeosciences*, 13, 4627–4635.
- Bai C, Hui GY (2016) Study on diversity indices of tree diameter size. *Forest Research*, 29, 340–347. (in Chinese with English abstract) [白超, 惠刚盈 (2016) 林木直径大小多样性量化测度指数的比较研究. 林业科学研究, 29, 340–347.]
- Buonigiorno J (2001) Quantifying the implications of transformation from even to uneven-aged forest stands. *Forest Ecology and Management*, 151, 121–132.
- Chang RT (2014) Dynamic research on stand structure diversity of nature forest in short time. *Journal of Henan Forestry Science and Technology*, 34(2), 8–12. (in Chinese with English abstract) [常荣涛 (2014) 栎类和阔叶混交林林分结构多样性的动态研究. 河南林业科技, 34(2), 8–12.]
- Dănescu A, Albrecht AT, Bauhus J (2016) Structural diversity promotes productivity of mixed, uneven-aged forests in southwestern Germany. *Oecologia*, 182, 319–333.
- Duduman GA (2011) Forest management planning tool to create highly diverse uneven-aged stands. *Forestry*, 84, 301–314.
- Fries C, Johansson O, Pettersson B, Simonsson P (1997) Silvicultural models to maintain and restore natural stand structures in Swedish boreal forests. *Forest Ecology and Management*, 94, 89–103.
- Gadow K, Fuldner K (1993) Zur Methoik der Bestandesbeschreibung. Vortrag anlaesslich der Jahrestagung der A G Forsteinrichtung in Kliekenb. Dessau. (in German)
- Huang LW (2000) Principles of Statistics. China Statistics Press, Beijing. (in Chinese) [黄良文 (2000) 统计学原理. 中国统计出版社, 北京.]
- Huang QL (2005) Preliminary introduction to “close to nature forest management” in Germany. *World Forestry Research*, 18(3), 73–77. (in Chinese with English abstract) [黄清麟 (2005) 浅谈德国的“近自然森林经营”. 世界林业研究, 18(3), 73–77.]
- Hui GY, Li L, Zhao ZH, Dang PX (2007) The comparison of methods in analysis of the tree spatial distribution pattern. *Acta Ecologica Sinica*, 27, 4717–4728. (in Chinese with English abstract) [惠刚盈, 李丽, 赵中华, 党普兴 (2007) 林木空间分布格局分析方法. 生态学报, 27, 4717–4728.]
- Hui GY, Pommerening A (2014) Analysing tree species and size diversity patterns in multi-species uneven-aged forests of Northern China. *Forest Ecology and Management*, 316, 125–138.
- Hui GY, Gadow VK (2003) Quantitative Analysis of Forest Spatial Structure. China Science and Technology Press, Beijing. (in Chinese) [惠刚盈, Gadow VK (2003) 森林空间结构量化分析方法. 中国科学技术出版社, 北京.]
- Kou WZ, Yang JZ, Yuan SQ (2000) Preliminary discussion on forestry management ideas of “Eco-Priority”. *Forestry Economics*, (1), 1–6. (in Chinese) [寇文正, 杨建洲, 袁少青 (2000) 试论“生态优先”的林业经营思想. 林业经济, (1), 1–6.]
- Lei XD, Tang SZ (2002) Indicators on structural diversity within stand: A review. *Scientia Silvae Sinicae*, 38(3), 140–146. (in Chinese with English abstract) [雷相东, 唐守正 (2002) 林分结构多样性指标研究综述. 林业科学, 38(3), 140–146.]
- Lei XD, Wang W, Peng CH (2009) Relationships between stand growth and structural diversity in spruce-dominated forests in New Brunswick, Canada. *Canadian Journal of Forest Research*, 39, 1835–1847.
- Lexerd NL, Eid T (2006) An evaluation of different diameter diversity indices based on criteria related to forest management planning. *Forest Ecology and Management*, 222, 17–28.
- Li C, Lü YY, Xu H, Wei AC, Xiong HX, Zhang B, Sun XL, Xu TT, Shi XL, Ou GL (2017) Stand diameter size diversity in *Pinus kesiya* var. *langbianensis* natural forests. *Journal of Yunnan Agricultural University (Natural Science)*, 32, 1108–1120. (in Chinese with English abstract) [李超, 闫妍宇, 胥辉, 魏安超, 熊河先, 张博, 孙雪莲, 徐婷婷, 石晓琳, 欧光龙 (2017) 思茅松天然林林分直径大小多样性研究. 云南农业大学学报(自然科学), 32, 1108–1120.]
- Li C, Lü YY, Xu H, Xu TT, Zhang B, Wei AC, Sun XL, Xiong HX, Shi XL, Ou GL (2016) Stand diameter size diversity and their environmental explanation in *Pinus kesiya* var. *langbianensis* natural forests. *Journal of Northeast Forestry University*, 44(11), 24–30. (in Chinese with English abstract) [李超, 闫妍宇, 胥辉, 徐婷婷, 张博, 魏安超, 孙雪莲, 熊河先, 石晓琳, 欧光龙 (2016) 思茅松天然林林分直径大小多样性及环境解释. 东北林业大学学报, 44(11), 24–30.]
- Liang J, Buonigorno J, Monserud RA, Kruger EL, Zhou M (2007) Effects of diversity of tree species and size on forest basal area growth recruitment and mortality. *Forest Ecology and Management*, 243, 116–127.
- McRoberts RE, Winter S, Chirici G, Hauk E, Pelz DR, Moser WK, Hatfield MA (2008) Large-scale spatial patterns of forest structural diversity. *Canadian Journal of Forest*

- Research, 38, 429–438.
- Meng XY (2006) Forest Mensuration, 3rd edn. (in Chinese). China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese) [孟宪宇 (2006) 测树学 (第3版). 中国林业出版社, 北京.]
- Neumann M, Starlinger F (2001) The significance of different indices for stand structure and diversity in forests. *Forest Ecology and Management*, 145, 91–106.
- O'hara KL, Hasenauer H, Kindermann G (2007) Sustainability in multi-aged stands: An analysis of long-term planter systems. *Forestry*, 80, 163–181.
- Pommerening A (2002) Approaches to quantifying forest structures. *Forestry*, 75, 305–324.
- Rolstad J, Gjerde I, Olaf SK, Rolstad E (2001) Epiphytic lichens in Norwegian coastal spruce forest, historic logging and present forest structure. *Ecological Applications*, 11, 421–436.
- Rouvinen S, Kuuluvainen T (2005) Tree diameter distributions in natural and managed old *Pinus sylvestris*-dominated forests. *Forest Ecology and Management*, 208, 45–61.
- Schulte BJ, Buongiorno J (1998) Effects of uneven-aged silviculture on the stand structure, species composition, and economic returns of loblolly pine stands. *Forest Ecology and Management*, 111, 83–101.
- Shannon CE (1949) Communication theory of secrecy systems. *The Bell System Technical Journal*, 28, 656–715.
- Shu SM, Zhao YY, Duan X, Hu HR, Xiong HQ (2015) Impact factors of forest diversity in Yunnan pine secondary forest based on structural equation model. *Journal of Northeast Forestry University*, 43(10), 63–67. (in Chinese with English abstract) [舒树淼, 赵洋毅, 段旭, 胡慧蓉, 熊好琴 (2015) 基于结构方程模型的云南松次生林林木多样性影响因素. 东北林业大学学报, 43(10), 63–67.]
- Simpson EH (1949) Measurement of diversity. *Nature*, 163, 688.
- Solomon DS, Gove JH (1999) Effects of uneven-age management intensity on structural diversity in two major forest types in New England. *Forest Ecology and Management*, 114, 265–274.
- Spies TA (1998) Forest structure: A key to the ecosystem. *Northwest Science*, 72, 34–36.
- Staudhammer CL, Lemay VM (2001) Introduction and evaluation of possible indices of stand structural diversity. *Canadian Journal of Forest Research*, 31, 1105–1115.
- Valbuena R, Packalén P, Marti S, Maltamo M (2012) Diversity and equitability ordering profiles applied to study forest structure. *Forest Ecology and Management*, 276, 185–195.
- Varga P, Chen HYH, Klinka K (2005) Tree-size diversity between single- and mixed-species stands in three forest types in western Canada. *Canadian Journal of Forest Research*, 35, 593–601.
- Wang WF, Lei XD, Ma ZH (2011) Positive relationship between aboveground carbon stocks and structural diversity in spruce-dominated forest stands in New Brunswick, Canada. *Forest Science*, 57, 506–515.
- Wang YX, Zhang SG, Lu YC, Meng JH, Zeng J, Bai SB (2014) Instant response of individual size inequality indices to thinning regimes in plantation. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 25, 1645–1651. (in Chinese with English abstract) [王懿祥, 张守攻, 陆元昌, 孟京辉, 曾冀, 白尚斌 (2014) 林木个体大小不一致性指标对人工林间伐方式的即时性响应. 应用生态学报, 25, 1645–1651.]
- Weiner J, Solbrig OT (1984) The meaning and measurement of size hierarchies in plant populations. *Oecologia*, 61, 334–336.
- Wikström P, Eriksson LO (2000) Solving the stand management problem under biodiversity-related considerations. *Forest Ecology and Management*, 126, 361–376.
- Xiang W, Lei XD, Hong LX, Sun JJ, Wang PZ (2011) Matrix growth model and harvest scenario simulation for multiple uses of larch-spruce-fir forests. *Scientia Silvae Sinicae*, 47(6), 77–87. (in Chinese with English abstract) [向玮, 雷相东, 洪玲霞, 孙建军, 王培珍 (2011) 落叶松云冷杉林矩阵生长模型及多目标经营模拟. 林业科学, 47(6), 77–87.]
- Zhao ZH, Hui GY, Liu WZ, Wang HX, Zhang GQ, Hu YB (2019) Stand structure characteristics of two *Quercus aliena* secondary forests on the Xiaolongshan forest area. *Journal of Northwest A & F University (Natural Science Edition)*, 47(8), 1–7. (in Chinese with English abstract) [赵中华, 惠刚盈, 刘文楨, 王宏翔, 张弓乔, 胡艳波 (2019) 小陇山林区2种锐齿栎次生林林分的结构特征. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 47(8), 1–7.]
- Zheng JM, Luo JC (2003) Structural diversity of broadleaved-Korean pine forest in Changbai Mountain. *Biodiversity Science*, 11, 295–302. (in Chinese with English abstract) [郑景明, 罗菊春 (2003) 长白山阔叶红松林结构多样性的初步研究. 生物多样性, 11, 295–302.]

(责任编辑: 王绪高 责任编辑: 黄祥忠)

附录 Supplementary Material

附录1 12块林木大小混交与大小隔离的模拟林分格局分布图

Appendix 1 Interspersion of tree of different size mingling and size segregation for 12 simulated stands

<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2018341-1.pdf>

附录2 4块实测样地径级分布直方图

Appendix 2 Histograms of diameter distribution for four measured plots

<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2018341-2.pdf>

倒 J 均匀混交

Inverse J-shaped uniform mingling type

倒 J 均匀隔离

Inverse J-shaped uniform segregation type

倒 J 随机混交

Inverse J-shaped random mingling type

倒 J 随机隔离

Inverse J-shaped random segregation type

倒 J 聚集混交

Inverse J-shaped aggregated mingling type

倒 J 聚集隔离

Inverse J-shaped aggregated segregation type

正态均匀混交
 Normal-shaped uniform mingling type

正态均匀隔离
 Normal-shaped uniform segregation type

正态随机混交
 Normal-shaped random mingling type

正态随机隔离
 Normal-shaped random segregation type

正态聚集混交
 Normal-shaped aggregated mingling type

正态聚集隔离
 Normal-shaped aggregated segregation type

2

附录 1 12 块林木大小混交与大小隔离的模拟林分格局分布图

4

Appendix 1 Interspersion of trees of different size mingling and size segregation for 12 simulated stands

6

附录 2 4 块实测样地径级分布直方图。(A)浙江毛竹林, 共 1,489 株林木, 呈正态随机分布($\bar{W} = 0.515$);
 8 (B)浙江混交林, 共 275 株林木, 呈倒 J 聚集分布($\bar{W} = 0.536$); (C)北京白皮松林, 共 369 株林木, 呈正态均
 10 匀分布($\bar{W} = 0.421$); (D)甘肃混交林, 共 323 株林木, 呈倒 J 随机分布($\bar{W} = 0.506$)。林木直径划分等级为 2
 12 cm; $\bar{W}$ 为角尺度均值, 当 $\bar{W} < 0.475$ 时为均匀分布, $0.475 \leq \bar{W} \leq 0.517$ 时为随机分布, 当 $\bar{W} > 0.517$ 时为聚
 集分布。

Appendix 2 Histograms of diameter distribution for four measured plots. (A) *P. edulis* forest in Zhejiang
 Province, normal-shaped random distribution ($\bar{W} = 0.515$) and have 1,489 trees; (B) Mixed forest in Zhejiang
 14 Province, inverse J-shaped aggregated distribution ($\bar{W} = 0.536$) and have 275 trees; (C) *P. bungeana* plantation in
 Beijing, normal-shaped uniform distribution ($\bar{W} = 0.421$) and have 369 trees; (D) Mixed forest in Gansu Province,
 16 inverse J-shaped random distribution ($\bar{W} = 0.506$) and have 323 trees. Class of diameter is 2 cm, $\bar{W}$ represents
 mean uniform angle index, uniform distribution for $\bar{W} < 0.475$; random distribution for $0.475 \leq \bar{W} \leq 0.517$;
 18 aggregated distribution for $\bar{W} > 0.517$.