•综述•

整体大于部分之和：生态自组织斑图及其涌现属性

葛振鹏 刘权兴*

(华东师范大学生态与环境科学学院, 上海 200241)

摘要: 近30年来, 自组织理论已经发展成为解释生态系统呈现规则空间格局的有效理论。伴随着生态系统自发有序空间格局的生成, 自组织过程产生一系列的涌现属性, 这些特征对生态系统功能至关重要。在此, 我们将介绍这一正蓬勃发展的研究领域的主要理论进展。首先, 叙述了自组织这一概念的发展历程与定义, 详细阐述了自组织理论的两个经典理论框架: 图灵原理与相分离原理。然后, 根据几个典型的生态自组织研究案例, 描述了图灵原理与相分离原理在不同生态系统中的具体数学模型表达形式。接着, 分别阐述了图灵原理的涌现属性对生态系统功能以及相分离原理的涌现属性对细胞功能的作用。最后, 从多尺度自组织斑图、瞬态斑图和生物个体行为自组织3个方面对未来生态自组织理论发展方向进行了探讨。自组织研究在生态学与生物学研究中方兴未艾, 希望更多的学者在未来关注与参与该领域的发展。

关键词: 空间自组织; 规则空间格局; 图灵原理; 相分离原理; 生态模型; 生态系统功能

More than the sum of its parts: Self-organized patterns and emergent properties of ecosystems

Zhenpeng Ge, Quanxing Liu*

School of Ecological and Environmental Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241

Abstract: Over the past 30 years, the self-organization theory has effectively explained the regular spatial patterning of ecosystems and has led to a proliferation of studies investigating spatial patterns in ecology and biology. Indeed, the emergent properties generated by this self-organization process are now recognized as critical to ecosystem functioning. Here, we review this important theoretical framework by assessing the definition and development of the concept of self-organization and by evaluating two fundamental theoretical principles of self-organization theory, the Turing principle and the phase separation principle. We further describe the mathematical models of each principle in the context of different, unique ecosystems, and explain the emergent properties of the Turing principle on ecosystem functioning and the phase separation principle on cell functions, respectively. Finally, we propose three promising future developments for ecological self-organization theory: multi-scale self-organization patterns, transient patterns, and individual behavioral self-organization. Our review provides an assessment of this fundamental ecological theory and offers exciting new research directions and applications.

Key words: spatial self-organization; regular spatial patterning; Turing principle; phase separation principle; ecological model; ecosystem functioning

在古希腊时期, 亚里士多德以“整体大于部分之和”反驳了德谟克利特的“机械的原子论与还原论”观点, 其思想的精髓在于系统各个部分线性叠

加所得的性质并不等于系统的整体性质, 而是系统会“涌现”出超出自身各个部分之和的额外性质, 即属于系统整体的独特性质。然而, 亚里士多德的这

收稿日期: 2020-06-01; 接受日期: 2020-07-16

基金项目: 科技部重点研发计划(2016YFE0133700)和国家自然科学基金(41676084)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: qxliu@sklec.ecnu.edu.cn

一观点长期被科学界所忽视,直到20世纪,理论生物学家、一般系统论之父Ludwig von Bertalanffy (1969)才重新将这一观点纳入生物系统科学中。Prigogine (1967)对化学中耗散结构的研究极大地推动了对这一观点的理解,并促进了自组织(self-organization)这一研究领域的诞生。在物理学界,虽然Anderson (1972)在20世纪70年代就指出“more is different”,但直到90年代大量物理实验证据的出现才促使物理学界中相当一部分人接受“整体大于部分之和”这一自组织涌现属性。生态学界对这一观点的认知亦是从小20世纪90年代开始的,较早的发现来源于基于自组织观点对各种生态系统斑图的形成提出了新的理论解释(Levin, 1992; Klausmeier, 1999)。

顾名思义,自组织即系统的自我组织发展。Haken (1988)将系统的发展分为他组织与自组织。当系统依靠外界的指令(比如指向性外力)而排列成有序结构时,这一结构被称为他组织结构;而当系统不依靠外界的指令而只是消耗外界输入的能量(比如进食),系统内部组分相互协同以使系统从无序变为有序结构时,这一结构被称为自组织结构(Camazine, 2001)。从这个定义来看,自组织在自然界和人类社会中无处不在。Schrödinger (1962)在*What Is Life?*一书中认为生命活动是吸收负熵且排出正熵的熵减过程。“热力学熵”的减少在很长时间内被认为是非平衡态自组织的重要特征和内涵(Nicolis & Prigogine, 1977),但是“热力学熵”这个物理量不能被实验测量,所以用“热力学熵”定义的自组织在实际计算中无法直接验证。近期对衣藻(*Chlamydomonas reinhardtii*)的鞭毛摆动和潮间带生态系统内潮沟网络优化过程的研究发现,非平衡态自组织可通过能直接计算的“微观状态流”与“局部信息熵”形成环或涡旋结构这一特征进行判别(Battle et al, 2016; Tejedor et al, 2017),这极大地丰富了自组织的内涵,扩大了自组织的研究范畴。最近, Franklin等(2020)认为自组织是未来发展植被动力学理论的三大方向之一,极有可能基于自组织和植物行为的可塑性思想发展出可预测森林冠层变化的理论。

自组织研究的核心之一就是“有序”如何从“无序”中自发产生,而自然界中高度韵律性的规则斑图则既令人遐思,亦是绝佳的研究对象(图1a)。从细

菌群落的网状结构(Tsimring et al, 1995)、美洲豹(*Panthera onca*)身上的黑色斑点(Werdelin & Olsson, 1997)、贻贝(*Mytilus edulis*)床的迷宫式排列(van de Koppel et al, 2008)、高山森林的条带状格局到珊瑚礁的韵律状分布(Mistr & Bercovici, 2003; Hiemstra et al, 2006),针对这些斑图的形成机制目前存在两个主要的自组织理论框架:图灵原理(Turing principle)和相分离原理(phase separation principle)。图灵原理已经在干旱-半干旱植物生态系统中被实验证实,且发现其在该生态系统中具有浓缩有限资源以使植物系统生物量最大化的生态功能——“资源浓缩机制”(D'Odorico et al, 2006)。最近10年人们逐渐认识到相分离原理是细胞内形成多种无膜细胞器及实现相应细胞功能的关键(图1b),比如神经信号传递、细胞内降噪和基因表达等(Alberti, 2017; Boeynaems et al, 2018; Sabari et al, 2018)。Levin (2005)认为这些自组织机制所产生的涌现性质对生态/生物系统的维持及其功能的实现至关重要。除此以外,近年来以鸟群的协同飞行(Vicsek et al, 1995)、贻贝的莱维行走(de Jager et al, 2011)和向日葵(*Helianthus annuus*)的种内协调生长(Pereira et al, 2017)为代表的生物行为自组织愈发引人关注,这类研究可能产生图灵原理与相分离原理以外的新的理论框架(比如自组织临界),并能回答一个关键问题:生物个体的行为如何通过自组织过程影响生态系统层次的生态功能实现?

本文将回顾生态自组织领域的两个理论框架,并阐明图灵原理所产生的涌现属性对生态功能的影响和相分离原理对细胞器分化和细胞组织形成等生物功能的影响。首先,介绍图灵原理与相分离原理的内涵,给出相关的经典模型,并阐述两者的差异。接着,介绍这两个理论所产生的涌现属性分别在生态学与细胞生物学中对应着什么样的生态/生物功能。最后,提出生态系统自组织斑图领域近期亟待解决的科学问题和未来的研究方向。

1 生态自组织原理及其经典模型

1.1 图灵原理

“计算机科学之父”Alan Turing提出“活化子-抑制子”机制(activator-inhibitor principle),试图解释斑马鱼(*Brachydanio rerio* var)等动物皮肤上出现的规则色素条纹(Turing, 1952)。活化子指可以通过

图1 贻贝(*Mytilus edulis*)与“细胞”内的规则斑图以及相应的尺度依赖的反馈与密度依赖的运动的机制。(a)荷兰瓦登海潮间带贻贝床, 图片来自于本文的通讯作者; (b)基于液体光影技术对细胞内结构的重现, 图片来自<https://liquidlightlab.com/artwork/3839057.html>, 版权属于Oil art: Steve Pavlovsky/Liquid Light Lab.; (c)尺度依赖的反馈示意图; (d)密度依赖的运动示意图, 其中主图中的两条曲线对应插图中的两条曲线, (c)和(d)修改自Liu等(2016)。

Fig. 1 The regular patterns of mussel and “cell”, and the scale-dependent feedback and density-dependent feedback. (a) Mussel bed in the intertidal zone of Wadden Sea, the Netherlands, the image come from the corresponding author of this paper; (b) The recurrence of a cell based on liquid light technology, the image is modified from <https://liquidlightlab.com/home.html> Copyright Oil art: Steve Pavlovsky/Liquid Light Lab.; (c) Schematic representation of scale-dependent feedback; (d) Schematic representation of density-dependent movement, (c) and (d) are modified from Liu et al (2016).

自催化反应生成更多自身的物质, 抑制子指可受活化子催化但是会抑制活化子产生的物质, 且抑制子的扩散速率高于活化子。当处于空间均匀状态的活化子受到无穷小的扰动时, 在本地的自催化反应将产生更多的活化子并向外扩散, 同时由于活化子的催化作用而产生抑制子并向外扩散。由于两者的扩散速率存在差异, 导致活化子在本地积累, 而抑制子在远处抑制活化子的产生, 两者的相互作用在空间传播导致活化子形成稳定的规则斑图。

生态学界经过多年研究之后发现, 图灵原理的一个重要特征是存在“尺度依赖的反馈”机制(图1c)。这一机制在生态学框架下理解起来非常直观: 生物在距自身较近处促进生物的生长形成正反馈,

而在距自身较远处抑制生物的生长形成负反馈, 其中负反馈是符合图灵原理的生态系统产生斑图的必要条件(van de Koppel & Crain, 2006)。需要指出的是, 系统存在活化子与抑制子两个客体并不是图灵原理的必要条件, 比如Swift-Hohenberg模型只存在一个客体, 但由于系统存在尺度依赖的反馈机制, 因而其依然可以产生图灵斑图(Burke & Knobloch, 2006)。这一机制在化学反应中已经得到实验的证实(Zhabotinskii, 1964; Ouyang & Swinney, 1991), 但是在生物学中尚未有直接的实验证据(Kondo & Miura, 2010)。

1.1.1 干旱-半干旱区的植物-土壤水模型

Klausmeier (1999)首次提出图灵分叉极有可能

是干旱-半干旱区植物呈现规则斑图与马赛克状不规则斑图的底层机制:

$$\frac{\partial w}{\partial t} = a - w - wn^2 + v \frac{\partial w}{\partial x} \quad (1)$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = wn^2 - mn + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) n \quad (2)$$

其中, w 和 n 为无量纲的土壤含水量和植物生物量, a 为空间均匀的降水量, v 为土壤水在 x 方向的固定流速, m 为植物的死亡率。方程(1)中 $-w$ 表示一定比例的水分被蒸发, $-wn^2$ 表示植物对水分的摄取, 平方项的存在表示植物可以强化土壤的渗流作用, 存在空间梯度的项表示水以固定速率向下坡方向流动。方程(2)中 wn^2 表示植物将水分转化为自身的生物量, 这与方程(1)中植物摄取的水分守恒, $-mn$ 表示植物的死亡, 存在空间梯度的项表示植物在空间进行扩散式传播。该反应-扩散-对流方程组反映了土壤水分的来源-消耗过程以及植物出生-死亡-迁移的过程。由于方程组中空间项的存在, 作为活化子的植物会富集周围土壤水分来促进距自身较远处植物的生长, 但土壤中水分总量是有限的, 这导致土壤水分会抑制距植物较远处的植物生长, 从而形成空间尺度依赖的反馈关系, 形成空间规则斑图。

1.1.2 贝壳纹理的活化子-抑制子模型

Meinhardt (2003)基于图灵原理阐述了贝壳表面规则纹理的形成机制:

$$\frac{\partial A}{\partial t} = s \left(\frac{A^2}{B} + b_A \right) - r_A A + D_A \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \quad (3)$$

$$\frac{\partial B}{\partial t} = sA^2 - r_B B + D_B \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} + b_B \quad (4)$$

其中 A 和 B 分别为活化子和抑制子的浓度, s 为活化子和抑制子的增加率, r_A 和 r_B 分别为活化子和抑制子的消耗率, D_A 和 D_B 为活化子和抑制子的扩散系数。方程(3)中 sA^2/B 表示活化子非线性的自催化作用以及抑制子对活化子自催化过程的抑制, b_A 表示微小且独立于当前活化子浓度的活化启动浓度, 该量对斑图的产生、斑图波长的增大与持续震荡是必需的, $-r_A A$ 表示活化子的消耗, 存在空间梯度的项表示活化子在空间的扩散。方程(4)中 sA^2 表示活化子对抑制子生成的激发作用, $-r_B B$ 表示抑制子的消失, 存在空间梯度的项表示抑制子在空间的扩散, b_B 表示微小且独立于当前活化子浓度的抑制启动浓度,

该量可以导致在活化子浓度较低时形成一个次要的且空间均匀的稳态, 该稳态可使系统在外部活化子进入系统之前保持不发生反应的休眠状态。该反应-扩散方程组描述了图灵原理中经典的活化子-抑制子相互作用关系, 其中活化子的自催化反应导致活化子在局部增加且向周围扩散。同时, 活化子的产生会导致抑制子的产生, 而抑制子在产生之后向周围扩散且其扩散速率快于活化子, 从而抑制远处活化子的产生, 从而形成活化子和抑制子在空间不同区域聚集的现象, 即形成规则斑图。

1.1.3 贻贝依赖尺度的个体运动模型

广泛分布于欧洲的贻贝(*Mytilus edulis*)在潮间带经常呈现规则的迷宫状斑图, van de Koppel等(2008)通过室内实验发现贻贝个体移动速率(这里是基于趋势残差分析的移动速率)在小尺度与大尺度邻域内分别呈现正反馈与负反馈响应, 移动速率的负反馈有助于贻贝的聚集而移动速率的正反馈有助贻贝的分散, 从而形成空间尺度依赖的反馈关系。van de Koppel等(2008)据此提出了依赖尺度的贻贝个体运动模型(individual-based model, IBM)来解释这种规则斑图的产生:

$$h(r, \chi) = \frac{1}{\chi} e^{-r/\chi} \quad (5)$$

$$\chi(L_1, L_2) = \frac{1}{p_0 + p_1 L_1 - p_2 L_2} \quad (6)$$

其中, r 表示贻贝每次运动的步长, h 表示贻贝运动步长 r 的概率分布, 尺度系数 χ 是关于不同尺度内贻贝密度的函数, L_1 和 L_2 表示贻贝个体不同尺度邻域内的贻贝密度, p_0 、 p_1 和 p_2 为截距(均为正数, 相当于邻域内贻贝密度为0时贻贝的运动步长), 这3个系数均是通过对实验数据进行回归分析得到。该模型通过产生满足 $h(r, \chi)$ 的随机数(步长)和 $(0, 2\pi]$ 内均匀分布的随机数(方向)作为每个贻贝在每个时刻的位移。结合具体的生态过程, 尺度系数 χ 清晰地表达了贻贝个体在运动时对不同邻域尺度内贻贝密度的偏好, 即贻贝个体倾向于在短尺度内聚集成团并通过丝足线相互联结以降低自身被捕食和被波浪卷走的可能性, 同时在长尺度上彼此分散以降低对食物(藻类)的竞争, 因而贻贝群体会形成中等尺度的斑图而不会全部聚集在一个大斑块中(van de Koppel et al, 2005)。

1.2 相分离原理

相分离是指从单一的均匀混合物中自发地产生两个不同的相, 最常见的相分离现象就是“水油分离”。从粒子的视角看, 相分离就是当相似粒子的浓度增加时, 相似粒子从分散运动向聚集运动转变, 粒子的运动速率非线性地依赖于粒子的局部密度, 最终导致相似粒子在局部聚集, 在全局尺度上形成规则斑图。相分离现象在冶金工程、化学和物理学中十分常见, Cahn和Hilliard (1958)提出了简单的偏微分方程描述热力学平衡态的相分离过程, Cohen和Murray (1981)从理论上推测处于非热力学平衡态的生命系统有可能符合相分离原理, 但是直到2009年才有细胞生物学家展示了细胞内组织存在相分离的实验证据(Brangwynne et al, 2009), 而直到2013年才首次在理论和实验上证明生态系统亦遵循相分离原理(Liu et al, 2013)。

1.2.1 贻贝群密度依赖的运动模型

基于个体随机行走过程建立的关于通量-速率-密度的“类菲克定律”(Schnitzer, 1993), Liu等(2013)从贻贝群体平均移动速率与贻贝群体密度的关系出发, 发现在室内实验中贻贝群体在低密度时和高密度时运动速率较快, 而在中等密度时运动速率较慢, 两者成抛物线关系, 从而得出了贻贝群体在短时间尺度内形成规则斑图的相分离机制:

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D_0 \Delta [P(M) - \kappa_1 \Delta M] \quad (7)$$

$$P(M) = \frac{3}{5}M^5 - \frac{5}{4}\beta M^4 + \frac{(4+2\beta^2)}{3}M^3 - \frac{3}{2}\beta M^2 + M + C \quad (8)$$

其中, M 为贻贝密度, D_0 为扩散系数, κ_1 为张力系数, β 为系数, C 为积分常数, Δ 为拉普拉斯算子, $P(M)$ 为该系局部自由能函数的变分。在相分离经典的Cahn-Hilliard方程中, 系统局部自由能的变分 $P_{CH}(M) = M^3 - M$, 可以证明方程组(7)和(8)在数学形式上与Cahn-Hilliard方程等价。这一结果表明仅仅是依赖群体密度的生物运动行为就会导致生态系统规则斑图的产生。图2展示了该系统的相图与数值模拟结果, 当系统符合相分离原理时, 可将其划分为均质区、双节区与旋节线分解区, 对该类系统进行研究的关键在于找出这些不同分区之间的分界线(Coveney, 2015)。

图2 方程组(7)和(8)所表示的系统相图与数值模拟。上方子图中红色实线为均相区与双节区的分界线, 蓝色实线为双节区与旋节线分解区的分界线。上方子图中“1”至“5”对应下方5张子图, 这些子图为相应的数值模拟结果, “1”与“5”位于均质区, 系统不存在斑图; “2”与“4”位于双节区, 系统存在点状斑图; “3”位于旋节线分解区, 系统存在迷宫状斑图。数值模拟采用周期边界条件, 数值模拟的matlab代码可在https://github.com/liufengyinxue/Liu_Mussel_PNAS下载。

Fig. 2 Phase diagram and numerical simulations of the equations (7) and (8). In the upper figure, the red solid line is the boundary between homogeneous zone and binodal zone, and the solid blue line is the boundary between binodal zone and spinodal decomposition zone. ‘1’ to ‘5’ in the upper figure correspond to the below five figures which are the numerical simulation results, ‘1’ and ‘5’ are located in homogeneous zone where the system doesn’t have pattern; ‘2’ and ‘4’ are located in binodal zone where the system has spot pattern, ‘3’ is located in the spinodal decomposition zone where the system has labyrinth pattern. The numerical simulation adopts periodic boundary condition, and the corresponding matlab code can be downloaded at https://github.com/liufengyinxue/Liu_Mussel_PNAS.

1.2.2 自推进活性粒子的相分离

由于可以吸收和消耗能量, 诸如各种微生物和光合成胶体等具有自推进能力的活性粒子相比于被动布朗粒子具有显著的远离热力学平衡态的特点, 即被动布朗粒子在热力学平衡态的运动行为不依赖于动力学参数, 而活性粒子在非热力学平衡态的运动行为取决于具体的动力学参数(Cates & Tailleur, 2015)。活性粒子对动力学参数的依赖性导致其可以在运动速率较低处聚集, 而这种聚集反过来诱导活性粒子在该区域降低运动速率, 从而导致活性粒子在局部形成“聚集-减速”之间的正反馈, 形成规则斑图。这里介绍一个比较简单的方法, 从被动布朗粒子的自由能函数直接构造

活性粒子的自由能函数(Speck et al, 2014):

$$\mathcal{F}[\rho] = \int f(\rho) d\vec{r} \quad (9)$$

$$f(\rho) = \rho(\ln \rho - 1) + \int_0^\rho \ln V(z) dz \quad (10)$$

方程(9)和(10)描述了被动布朗粒子的自由能, 其中 $\mathcal{F}$ 表示自由能, ρ 表示粒子密度, $\vec{r}$ 表示空间位置的向量, V 表示与 ρ 有关的粒子运动速率。在忽略复杂动力学过程的情况下, 我们可以自然地拟设出一个梯度平方项进入方程(9)表征界面张力, 从而得到:

$$\mathcal{F}_a[\rho] = \int \left[f(\rho) + \frac{\kappa}{2} (\nabla \rho)^2 \right] d\vec{r} \quad (11)$$

其中, κ 为系数(大于0), $\mathcal{F}_a$ 为活性粒子的自由能, 则局部通量 J 为:

$$J = -G \nabla (\mu) + \sqrt{2M} \Lambda \quad (12)$$

$$\mu = \frac{\partial \mathcal{F}_a}{\partial \rho} = \ln \rho + \ln v(\rho) - \kappa \Delta \rho \quad (13)$$

其中, Λ 为白噪音, $G = D\rho$ 为活性粒子的集群扩散系数, D 为活性粒子的扩散系数, 根据质量守恒定律有:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot J = \nabla \cdot (G \nabla (\ln \rho + \ln v(\rho) - \kappa \Delta \rho) - \sqrt{2G} \Lambda) \quad (14)$$

这就是描述相分离的随机偏微分方程Cahn-Hilliard-Cook方程。方程(14)中引入描述“出生-死亡”过程的逻辑斯蒂生长项后很好地描述了细菌运动导致细菌形成两种密度共存的稳态, 这与单纯描述出生-死亡的逻辑斯蒂法则形成了显著差异, 因为单纯的逻辑斯蒂法则只允许单一均匀密度的稳态(Cates et al, 2010)。

1.3 图灵原理与相分离原理的区别与联系

目前大多数生态自组织研究领域的学者认为符合图灵原理的生态系统应至少存在两个特征: (1)存在尺度依赖的反馈; (2)质量不守恒, 即依赖尺度的“生长-死亡-扩散”过程(Rietkerk & van de Koppel, 2008)。符合相分离原理的生态系统应至少存在两个特征: (1)存在密度依赖的运动; (2)质量守恒, 即具有偏好性的生物运动过程(Liu et al, 2016)。对第一点, 图1c和d清晰地展示了目前普遍认可的图灵原理与相分离原理在底层机制上的差异, 但是在下一段我们会阐述对这一观点的新认识。对第二点, 就连续模型(比如偏微分方程)而言, 对小节1.1.1与

1.1.2的两个模型的方程(1)和(2)、方程(3)和(4)分别相加都不能无条件地将源相消除, 即系统存在与外界的质量交换, 因而系统的总质量不守恒, 而小节1.2.1中方程(7)和(8)与1.2.2中方程(14)所表示的模型不存在与外界的质量交换, 只存在质量重分配导致的质量在空间中的非均匀分布, 因而系统的总质量守恒。然而, 当考虑IBM时, 质量守恒这一特征并不能代表系统符合相分离原理。小节1.2.1中方程(7)和(8)所表示的连续模型来自于对个体随机游走IBM的连续化, 因而其对应的IBM必然符合相分离原理, 但是小节1.1.3的IBM虽然质量守恒(贻贝总数不发生变化), 但是其产生斑图的底层机制是尺度依赖的反馈, 因而它依然是一个图灵式的系统。

当只考虑连续模型时, 系统质量守恒且不存在尺度依赖的反馈在较长时间内被认为是相分离原理与图灵原理的差异。然而, Halatek和Frey (2018)和Bergmann等(2018)发现当“反应-扩散”系统为如下形式时, 该系统为双变量的主动相分离系统:

$$\frac{\partial U}{\partial t} = f(U, R) + D_U \Delta U \quad (15)$$

$$\frac{\partial R}{\partial t} = -f(U, R) + D_R \Delta R \quad (16)$$

$$\tau = \langle U + R \rangle \quad (17)$$

其中, $f(U, R)$ 表示反应项, 存在空间梯度的项表示 U 和 R 在空间的扩散, D_U 和 D_R 是相应的扩散系数, 方程(17)表示 U 和 R 在空间上守恒, 方程(17)中的 $\langle \cdot \rangle$ 表示空间平均。将方程(15)和(16)相加可得:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial R}{\partial t} = D_U \Delta U + D_R \Delta R \quad (18)$$

方程(18)表示系统与外界不存在交换, 只存在 U 和 R 之间的相互转化, 因而在整体上质量守恒, 这与图灵式的系统形成了显著的差别。图灵式的系统存在与外界的交流, 特别是存在外界输入项, 比如方程(1)中的 a 与方程(3)和方程(4)中的 b_A 和 b_B 。由于 $f(U, R)$ 属于被消除项, 因而其具体形式相对自由, 完全可以采用非线性项使系统具有尺度依赖的反馈的特征, 因而主动相分离系统可以包含尺度依赖的反馈这一特征。可以这样说, 当考虑IBM时, 图灵原理和相分离原理的核心差异在第一点, 而当考虑连续模型时, 两者的核心差异在第二点。此外, 未来对生态系统的相分离研究不应局限于生物运动行为所导致的相分离(2.2.1), 对方程组(15)、(16)和(17)所代

表的“守恒式的反应-扩散系统”亦应加以重视, 比如这一机理是否可以解释生物量已经饱和的顶极群落的空间斑图?

2 生态自组织的功能

2.1 图灵原理

2.1.1 生产力

在干旱-半干旱生态系统进行的大量关于植物生产力的理论与实验研究均表明, 在环境条件相同时, 处于规则斑图状态的植物比处于空间随机分布状态的植物具有更强的生产力(Yizhaq et al, 2005)。其中, 由图灵原理所产生的“资源浓缩机制”是植物得以最大化生产力的关键: 在水资源有限的情况下, 植物通过根系加强土壤渗水能力, 从而将水分汇聚于植物生长区域, 造成植物所在地附近的水分丰富而距植物较远处的水分稀少, 从而集中水分以最大化植物的生产力(Guttal & Jayaprakash, 2007)。此外, 干旱-半干旱生态系统内呈六边形分布的白蚁丘亦是区域景观尺度内生态系统生产力增强的原因: 由于白蚁的垂向运动导致土壤渗水能力增强, 从而促进植物在白蚁丘附近定殖, 同时白蚁丘的六边形结构决定了植物种子从任一点出发到最邻近白蚁丘的平均距离最短, 这极大地减少了植物种子在传播上花费的代价, 从而增强了区域内生态系统的总生产力(Pringle et al, 2010)。

在海洋生态系统中, 潮间带贻贝床、潮间带底栖硅藻和海草的规则斑图亦被认为提高了系统的生产力(van de Koppel et al, 2005; van der Heide et al, 2010; Weerman et al, 2010)。潮间带贻贝床、潮间带

底栖硅藻和海草通过局部聚集减少被波浪侵蚀和被捕食的强度(图3), 而局部聚集的代价为: 贻贝群之间对捕食藻类的竞争增加从而导致贻贝个体从更大的斑块逃离, 底栖硅藻和海草的斑块导致水流对斑块侧面的剪切力大大增强从而导致这些区域不适合定殖。综合而言, 这些生态系统形成规则斑图的收益远高于其付出的代价, 从而提高了这些生态系统相对于其处于空间均匀或随机状态时的生产力。

2.1.2 恢复力

从动力系统的角度看, 系统的恢复力就是处于稳态的系统受到扰动后回到该稳态的能力, 而生态系统的规则斑图通常表征着生态系统的稳态, 所以对形成规则斑图的自组织过程进行研究可以定量地把握生态系统恢复力的方向与强弱。以贻贝床为例, 在个体尺度上, 贻贝个体通过密度依赖的运动在小斑块中聚集, 从而形成了斑块间距大约 15 cm 宽的网状斑图。在生态系统层次上, 贻贝在大于 1 m 的尺度上对食物(藻类)进行竞争, 而在小于 1 m 的尺度上通过聚集以拦截水流中的泥沙来减小水流对贻贝的扰动, 该“短程促进-长程竞争”耦合的生态过程导致了在 5–10 m 尺度上出现带状斑图(van de Koppel et al, 2005; de Paoli et al, 2017)。对贻贝床的多尺度规则斑图的理论研究表明, 多尺度规则斑图的存在极大地提高了贻贝床的恢复力, 相比于无斑图的贻贝床, 这种提升可达 10 倍, 在个体层次和生态系统层次的自组织过程的相互作用是决定贻贝生态系统功能和恢复能力的关键因素(Liu et al, 2014)。实验研究亦证明, 小尺度斑图可以增强贻贝

图3 贻贝聚集的涌现属性之一: 降低被海鸟捕食的可能性

Fig. 3 One of the emergent properties of mussel aggregation: reducing the likelihood of predation by seabirds

床对波浪侵蚀的抵抗力,对贻贝种群的生存至关重要,而大尺度的贻贝斑图有助于在贻贝遭遇较强的水动力事件后改善小尺度斑图的形态,从而增强贻贝种群的恢复力,这种自组织空间结构对贻贝种群的存续至关重要(de Paoli et al, 2017)。

2.1.3 突变预警信号

生物量通常被作为指示生态系统退化的直接指标。然而,由于绝大多数生态系统为强非线性系统,在外界环境变化的情况下,内部的相互作用(比如正反馈)会导致系统生物量在某些环境条件下出现多稳态的特征。当环境条件恶化时,这些多稳态中往往包含生物量为0的生态系统完全退化状态,这导致将生物量作为预测生态系统退化的指标会失效,换言之,生态系统不会线性地变化至生物量为0的稳态,而是在到达某个临界点之后突变为完全退化状态。由于生态系统的规则斑图大多代表了生态系统所处的稳态,因而对预警生态系统突变临界点而言,它极具发展潜力。

目前,该方法已成功应用于干旱-半干旱地区的植物生态系统(Rietkerk et al, 2004)。当环境条件恶化时(比如降水量逐渐降低),植物的斑图以一种连贯的、可预测的方式发生“均匀状态-缺口状-迷宫状-条纹状-点状-裸地”一系列变化,这些斑图均代表了生态系统的一种稳态,其中“点状”和“裸地”存在于相同的降水量参数区间,即植物的点状斑图可突变式地消失。同时,由于系统双稳态的存在,会导致系统难以从裸地自然逆转,这是由于这个区域的生态自组织过程存在“资源浓缩机制”,而这一机制需要植物来启动,所以植物一旦消失,即使区域内降水增加也无法启动这一机制,这会导致在无外界干扰的情况下系统无法恢复。虽然Meron (2016)认为点状与裸地之间的变化为渐“同宿蛇形”(homoclinic snaking)式变化,但我们认为同宿蛇形式变化在干旱-半干旱地区的植物生态系统的时间尺度上依然属于一种突变。然而,必须承认的是,目前这类基于图灵原理的依赖尺度的模型很少利用存在斑图的生态系统的原位测量数据进行参数化(Juergens (2015)进行了尝试),这既可以认为是这类理论模型的最大缺陷,也是目前难以定量地精确预测该类生态系统突变临界点的根本原因。

2.1.4 生物多样性

虽然从物种间竞争和食物网连结性这两方面

对生物多样性的研究由来已久(Paine, 1966),但由于生态系统自组织的概念相对年轻,目前很少有从自组织斑图的角度对生物多样性进行研究的报道。容易想象的是,生态系统的自组织过程必然会极大地改变资源的分配,比如上文反复提及的资源浓缩机制,因而必然对依赖这些资源的物种间关系产生影响(Meron, 2015)。此外,生物行为的自组织过程必然会直接影响物种间的关系。可以预见的是,自组织与生物多样性之间的关系会是一片丰饶的科学研究宝地。

在物种层次,生态系统的斑图类型往往决定了生境多样性与物种多样性(Cuddington, 2007)。“生态系统工程师”(ecosystem engineer)呈现规则斑图表征其处于单一稳态,而生境塑造物种的不规则马赛克斑图可能表征其处于多个稳态的叠加状态,在这种情况下,不规则的马赛克斑图可能代表了更高的生态位宽度(von Hardenberg et al, 2001),从而具备更高的生物多样性(Gilad et al, 2004)。另外,空间不稳定性导致的自组织斑图可以促进物种共存,在干旱-半干旱地区,资源浓度机制使富水的植物斑块吸引了竞争能力强(这里指该物种在均匀环境下竞争能力更强)的物种在附近定居,从而使得竞争能力弱的物种避免了竞争排除法则(Nathan et al, 2013)。必须强调的是,斑图形态与生物多样性之间可能产生违反直觉的变化。比如,在以色列Sayeret Shaked生态系统定位观测站附近的观测发现,随着降水量的下降,长期干旱发生后,土层深厚而无碎石的基质条件下,灌木*Noaea mucronata*发生了大量死亡,然而,在土层瘠薄且碎石覆盖的坡地系统几乎没有受到干旱影响。尽管其作用强度和机理尚不明确,但这种地貌形态差异可能导致物种多样性增加(Stavi et al, 2018)。

在群落层次,研究生态系统群落多样性的难点在于必须找出表征生态系统群落层次性质的变量,目前从自组织斑图视角对这些性质的研究依然极少。基于我们所查阅的文献,目前只有极少数利用理论方法对空间无斑图的多物种生态群落进行的研究发现在不同物种的生物量权重轴上的稳定脉冲解可以表征生态系统的功能多样性、群落丰度和群落组成(Nathan et al, 2016)。但是,当生态系统存在自组织斑图时会如何影响群落层次的多样性目前尚不清楚,有文献推测(Meron, 2016):生态系统

斑图往往代表生态系统中存在某种或某几种具备改造生境能力的功能组,因而这些功能组的存在至少可以在非生物的环境梯度上增进生态过程的多样性。此外,由于斑图通常代表多种生态功能组的耦合,因而从动力系统的角度来看系统可能存在大量的局部双稳态,这会导致存在至少两种功能组在空间上共存的大量混合状态。因而,虽然不同功能组在局部彼此排斥,但是没有哪个功能组可以在全局上取代其他功能组,从这个意义上讲,斑图的存在可以通过形成不同功能组之间稳定的组合嵌套来影响群落层次的多样性。

除了图灵原理以外,基于物种中性理论的生物性状在生态位上的自组织协同演化可以解释自然界存在许多相似物种的原因(Scheffer & van Nes, 2006);“石头-剪刀-布”这一类三物种循环取代的模型表明螺旋波是物种共存的一种稳定空间结构,且已有实验对该类模型进行了验证(Kerr et al, 2002);环境异质性导致不同物种的空间扩散率存在差异,进而在时间上形成了多物种共存的生态位组合,增加了物种多样性(Loreau et al, 2003),但最近的研究表明当考虑空间效应时,环境异质性与物种多样性之间存在复杂的反馈,环境异质性的增强并不一定带来物种多样性的增加,亦可导致物种多样性下降(Ben-Hur & Kadmon, 2020)。我们认为生物与其依存环境之间的自组织过程可以直接导致环境异质性的产生,进而影响生态位的宽度,并且物种行为的自组织可影响生态位的划分。尽管目前已经存在一些实验研究(Engelhardt & Ritchie, 2001),但在将来需要大量的理论和实验工作来揭开自组织过程在生物多样性领域的神秘面纱。

2.2 相分离原理

相分离原理在细胞生物学和生态学中均是近10年才被发现的(Brangwynne et al, 2009; Liu et al, 2013),虽然生态学中相分离的生态功能依然不得而知,但是细胞生物学对相分离在细胞中的功能已经有了许多新认识,下面我们将简要介绍这些认识。

毫无疑问,目前由“液-液”相分离所引发的细胞生物学认知革命正在进行中(Alberti & Dormann, 2019)。在细胞中,相分离指一种由大分子组分组成的均相液体溶液分离成两个不同密度相的过程,一

个相为大分子富集状态(即大分子浓度很高,也叫密相),另一个相为大分子稀疏的状态(即大分子浓度很低,也叫稀相),这个过程伴随着显著的“成核”现象(图2中标签为“2”的斑图,细胞生物学称之为“液滴”)(Shin & Brangwynne, 2017)。细胞生物学家很早就发现细胞可以通过调节蛋白质的溶解度来实现很多生物功能,但是他们很久以来都很好奇细胞如何通过这种简单的行为实现如此多且复杂的生物功能。直到最近10年细胞生物学家才逐渐明白细胞这种调节蛋白质浓度的行为会导致细胞内物质发生相分离,蛋白质分子在这一过程中可以选择性地凝聚某些成分且排除其他成分从而形成凝结物,其中有些凝结物会形成重要的无膜细胞器,比如核仁和卡哈尔体。当然,并不是所有的凝结物都具有特殊的生物功能,但这反过来也是细胞通过相分离这一普遍性机制而非很多特殊机制来形成无膜细胞器并实现复杂生物功能的例证。

研究发现,通过相分离形成的分子凝结物直接关系到细胞膜上的信号传递、细胞内降噪、DNA折叠包装、细胞骨架和超分子组装等生物过程与功能(Alberti et al, 2019)。举例而言,Bojia等(2018)发现不同的DNA结合域与中介物一起形成了相分离的凝结物,而不同的转录因子可以通过其DNA结合域的相分离能力与中介物相互作用,两者形成的凝结物参与了基因表达。此外,由于相分离是一种具有普遍性的物理机制,因而可以很自然地联想:细胞内的异常相分离是否会导致疾病的产生?目前已有生物医学研究发现许多不具有明显遗传性的神经性疾病,例如阿尔茨海默病、额颞叶痴呆和帕金森症等,均与患者大脑细胞内物质的异常相分离有关,利用相分离原理治疗这些疾病的药物与疗法已经在研发中(Alberti & Dormann, 2019)。

相比于细胞生物学界,无论是理论上还是实验上,生态学界对相分离的生态功能尚无认知,但毫无疑问,相分离一定有其独特的生态功能。例如,羚羊群、鹿群等群居性食草动物经常通过运动处于聚集状态,这种聚集行为是否受控于密度依赖的运动所产生的相分离(Liu et al, 2016)?这些种群是否利用相分离提高了种群的摄食效率抑或降低了种群在被捕食时的损失?这些问题的答案着实令人心驰神往。

图4 自组织在生态学中的发展趋势展望(英文版见附录1)。经过多年发展的图灵原理被发现并不能完全解释各种生态系统的多尺度斑图,新兴的相分离原理亦然,因而未来需要发展新的理论框架来理解生态系统的多尺度斑图;瞬态斑图由于可能具备独特的生态功能在未来将备受关注;生物对环境变化产生响应导致生物行为发生改变,这种响应如何涌现至生态系统层次对理解跨尺度的生态系统自组织至关重要。

Fig. 4 The predominant research ideas of self-organization ecology in the future (The English version see appendix 1). After years of development, Turing's principle was found to be unable to fully explain the multi-scale patterns of various ecosystems, as well as the phase separation principle. Therefore, a new theoretical framework needs to be developed in the future to understand the multi-scale patterns of ecosystems. Transient pattern will be paid more attention in the future due to its unique ecological functioning. The response of organisms to environmental change leads to changes in biological behavior, and how this response emerges to the ecosystem level is critical to understanding the self-organization of ecosystems across scales.

3 生态自组织研究的展望

生态自组织研究在近 30 年的发展历程中不断地进行范式转变,是极富活力的研究领域。目前生态自组织有 3 个主要的发展趋势:多尺度自组织斑图、瞬态斑图和生物个体尺度的自组织行为(图 4)。

人们对多尺度自组织斑图的兴趣来自两个方面。第一,许多尺度差异很大且生态过程差异很大的生态系统存在相似的斑图,这是否表明这些生态系统存在相似的底层机制?而在这其中尺度效应扮演了什么样的角色?第二,同一个生态系统在不同尺度上往往会呈现出差异化的斑图,这是否表明该生态系统在不同尺度上具有不同的生态过程?而其中自下而上与自上而下的跨尺度效应又如何整体与个体层次上影响生态系统的功能?对第一个方面,我们期望将两个理论框架应用到更多的生态系统,进行更多的实验研究,比如沼泽植物、海草、珊瑚以及草地放牧系统等。对第二个方面,虽然目前存在将两个尺度上的图灵原理相结合的理论

模型(Liu et al, 2014; Tarnita et al, 2017),但仅仅这些少量的理论模型远远不足以厘清多尺度的自组织斑图如何跨尺度地进行相互影响并实现生态系统的功能。多尺度自组织斑图是未来生态空间自组织理论发展的主要方向。

对瞬态斑图的兴趣来自非线性理论与实际应用两个方面。在生态动力学模型的发展史上,自从 Lotka-Volterra 模型被提出以来,对生态动力学模型的研究主要集中于对系统稳态性质的研究,自然地,稳态斑图成为生态自组织斑图的主要研究对象。然而,强非线性的复杂动力学行为(譬如混沌)往往会导致生态系统需要极长的时间才能到达稳态(Hastings et al, 2018),从这个意义上说,把握系统到达稳态之前的系统瞬态对理解生态系统的过程以及如何对生态系统进行保护更为重要。目前自组织斑图研究领域主要关注瞬态斑图的成因,比如干旱-半干旱地区的植物精灵环与潮间带海三棱藨草(*Scirpus mariqueter*)的精灵环(Zelnik et al, 2015; Zhao et al, 2021)。事实上,瞬态斑图的成因固然十

分有趣,但由于其不稳定,我们更应关注瞬态斑图具备的生态功能,比如其对生态系统恢复力、食物网结构、物种竞争以及生物进化的影响,这对进行生态保护与恢复可能具有难以想象的妙用。

对生物个体尺度的自组织行为的兴趣实际上由来已久。事实上,早在生态自组织研究开始之前,已有大量的研究报道过种内或种间生物个体之间的相互作用,但对自组织研究而言,我们更关心的是生物在个体层次的相互作用如何涌现至生态系统的层次,这里面包含两个方面:直接的相互作用(比如贻贝密度依赖的运动)及通过环境的间接相互作用(比如藻类利用流场改变营养输运)。相分离原理已经为基于生物行为的生态自组织研究打开了一扇窗,当前,厘清相分离原理在不同生态系统中的表现形式及其具备的生态功能是重中之重。

参考文献

- Alberti S (2017) Phase separation in biology. *Current Biology*, 27, R1097–R1102.
- Alberti S, Dormann D (2019) Liquid-liquid phase separation in disease. *Annual Review of Genetics*, 53, 171–194.
- Alberti S, Gladfelter A, Mittag T (2019) Considerations and challenges in studying liquid-liquid phase separation and biomolecular condensates. *Cell*, 176, 419–434.
- Anderson PW (1972) More is different. *Science*, 177, 393–396.
- Battle C, Broedersz CP, Fakhri N, Geyer VF, Howard J, Schmidt CF, MacKintosh FC (2016) Broken detailed balance at mesoscopic scales in active biological systems. *Science*, 352, 604–607.
- Ben-Hur E, Kadmon R (2020) Heterogeneity-diversity relationships in sessile organisms: A unified framework. *Ecology Letters*, 23, 193–207.
- Bergmann F, Rapp L, Zimmermann W (2018) Active phase separation: A universal approach. *Physical Review E*, 98, 020603.
- Bertalanffy L (1969) *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. Georges Braziller, Inc., New York.
- Boeynaems S, Alberti S, Fawzi NL, Mittag T, Polymenidou M, Rousseau F, Schymkowitz J, Shorter J, Wolozin B, van den Bosch L, Tompa P, Fuxreiter M (2018) Protein phase separation: A new phase in cell biology. *Trends in Cell Biology*, 28, 420–435.
- Boija A, Klein IA, Sabari BR, Dall'Agnese A, Coffey EL, Zamudio AV, Li CH, Shrinivas K, Manteiga JC, Hannett NM, Abraham BJ, Afeyan LK, Guo YE, Rimel JK, Fant CB, Schuijers J, Lee TI, Taatjes DJ, Young RA (2018) Transcription factors activate genes through the phase-separation capacity of their activation domains. *Cell*, 175, 1842–1855.
- Brangwynne CP, Eckmann CR, Courson DS, Rybarska A, Hoege C, Gharakhani J, Julicher F, Hyman AA (2009) Germline P granules are liquid droplets that localize by controlled dissolution/condensation. *Science*, 324, 1729–1732.
- Burke J, Knobloch E (2006) Localized states in the generalized Swift-Hohenberg equation. *Physical Review E*, 73, 056211.
- Cahn JW, Hilliard JE (1958) Free energy of a nonuniform system. I. Interfacial free energy. *The Journal of Chemical Physics*, 28, 258–267.
- Camazine S (2001) *Self-organization in Biological Systems*. Princeton University Press, Princeton.
- Cates ME, Marenduzzo D, Pagonabarraga I, Tailleur J (2010) Arrested phase separation in reproducing bacteria creates a generic route to pattern formation. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 107, 11715–11720.
- Cates ME, Tailleur J (2015) Motility-induced phase separation. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 6, 219–244.
- Cohen DS, Murray JD (1981) A generalized diffusion model for growth and dispersal in a population. *Journal of Mathematical Biology*, 12, 237–249.
- Coveney S (2015) *Fundamentals of Phase Separation in Polymer Blend Thin Films*. Springer International Publishing, Cham.
- Cuddington K (2007) *Ecosystem Engineers: Plants to Protists*. Academic Press, Boston.
- D'Odorico P, Laio F, Ridolfi L (2006) Patterns as indicators of productivity enhancement by facilitation and competition in dryland vegetation. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 111, G03010.
- de Jager M, Weissing FJ, Herman PMJ, Nolet BA, van de Koppel J (2011) Levy walks evolve through interaction between movement and environmental complexity. *Science*, 332, 1551–1553.
- de Paoli H, van der Heide T, van den Berg A, Silliman BR, Herman PMJ, van de Koppel J (2017) Behavioral self-organization underlies the resilience of a coastal ecosystem. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 114, 8035–8040.
- Engelhardt KAM, Ritchie ME (2001) Effects of macrophyte species richness on wetland ecosystem functioning and services. *Nature*, 411, 687–689.
- Franklin O, Harrison SP, Dewar R, Farrior CE, Brännström Å, Dieckmann U, Pietsch S, Falster D, Cramer W, Loreau M, Wang H, Mäkelä A, Rebel KT, Meron E, Schymanski SJ, Rovenskaya E, Stocker BD, Zaehle S, Manzoni S, van Oijen M, Wright IJ, Ciais P, van Bodegom PM, Peñuelas J, Hofhansl F, Terrer C, Soudzilovskaia NA, Midgley G, Prentice IC (2020) Organizing principles for vegetation dynamics. *Nature Plants*, 6, 444–453.
- Gilad E, von Hardenberg J, Provenzale A, Shachak M, Meron E (2004) Ecosystem engineers: From pattern formation to habitat creation. *Physical Review Letters*, 93, 098105.

- Guttal V, Jayaprakash C (2007) Self-organization and productivity in semi-arid ecosystems: Implications of seasonality in rainfall. *Journal of Theoretical Biology*, 248, 490–500.
- Haken H (1988) *Information and Self-organization: A Macroscopic Approach to Complex Systems*. Springer-Verlag, New York.
- Halatek J, Frey E (2018) Rethinking pattern formation in reaction-diffusion systems. *Nature Physics*, 14, 507–514.
- Hastings A, Abbott KC, Cuddington K, Francis T, Gellner G, Lai YC, Morozov A, Petrovskii S, Scranton K, Zeeman ML (2018) Transient phenomena in ecology. *Science*, 361, eaat6412.
- Hiemstra CA, Liston GE, Reiners WA (2006) Observing, modelling, and validating snow redistribution by wind in a Wyoming upper treeline landscape. *Ecological Modelling*, 197, 35–51.
- Juergens N (2015) Exploring common ground for different hypotheses on Namib fairy circles. *Ecography*, 38, 12–14.
- Kerr B, Riley MA, Feldman MW, Bohannan BJM (2002) Local dispersal promotes biodiversity in a real-life game of rock-paper-scissors. *Nature*, 418, 171–174.
- Klausmeier CA (1999) Regular and irregular patterns in semiarid vegetation. *Science*, 284, 1826–1828.
- Kondo S, Miura T (2010) Reaction-diffusion model as a framework for understanding biological pattern formation. *Science*, 329, 1616–1620.
- Levin SA (1992) The problem of pattern and scale in ecology. *Ecology*, 73, 1943–1967.
- Levin SA (2005) Self-organization and the emergence of complexity in ecological systems. *BioScience*, 55, 1075–1079.
- Liu QX, Doelman A, Rottschäfer V, de Jager M, Herman PMJ, Rietkerk M, van de Koppel J (2013) Phase separation explains a new class of self-organized spatial patterns in ecological systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 110, 11905–11910.
- Liu QX, Herman PMJ, Mooij WM, Huisman J, Scheffer M, Olf H, van de Koppel J (2014) Pattern formation at multiple spatial scales drives the resilience of mussel bed ecosystems. *Nature Communications*, 5, 6234.
- Liu QX, Rietkerk M, Herman PMJ, Piersma T, Fryxell JM, van de Koppel J (2016) Phase separation driven by density-dependent movement: A novel mechanism for ecological patterns. *Physics of Life Reviews*, 19, 107–121.
- Loreau M, Mouquet N, Gonzalez A (2003) Biodiversity as spatial insurance in heterogeneous landscapes. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 100, 12765–12770.
- Meinhardt H (2003) *The Algorithmic Beauty of Sea Shells*. Springer, Berlin.
- Meron E (2015) *Nonlinear Physics of Ecosystems*. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
- Meron E (2016) Pattern formation—A missing link in the study of ecosystem response to environmental changes. *Mathematical Biosciences*, 271, 1–18.
- Mistr S, Bercovici D (2003) A theoretical model of pattern formation in coral reefs. *Ecosystems*, 6, 61–74.
- Nathan J, Osem Y, Shachak M, Meron E (2016) Linking functional diversity to resource availability and disturbance: A mechanistic approach for water-limited plant communities. *Journal of Ecology*, 104, 419–429.
- Nathan J, von Hardenberg J, Meron E (2013) Spatial instabilities untie the exclusion-principle constraint on species coexistence. *Journal of Theoretical Biology*, 335, 198–204.
- Nicolis G, Prigogine I (1977) *Self-organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order Through Fluctuations*. Wiley, New York.
- Ouyang Q, Swinney HL (1991) Transition from a uniform state to hexagonal and striped Turing patterns. *Nature*, 352, 610–612.
- Paine RT (1966) Food web complexity and species diversity. *The American Naturalist*, 100, 65–75.
- Pereira ML, Sadras VO, Batista W, Casal JJ, Hall AJ (2017) Light-mediated self-organization of sunflower stands increases oil yield in the field. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 114, 7975–7980.
- Prigogine I (1967) On symmetry-breaking instabilities in dissipative systems. *Journal of Chemical Physics*, 46, 3542.
- Pringle RM, Doak DF, Brody AK, Jocque R, Palmer TM (2010) Spatial pattern enhances ecosystem functioning in an African savanna. *PLoS Biology*, 8, e1000377.
- Rietkerk M, Dekker SC, de Ruiter PC, van de Koppel J (2004) Self-organized patchiness and catastrophic shifts in ecosystems. *Science*, 305, 1926–1929.
- Rietkerk M, van de Koppel J (2008) Regular pattern formation in real ecosystems. *Trends in Ecology & Evolution*, 23, 169–175.
- Sabari BR, Dall'Agnese A, Boija A, Klein IA, Coffey EL, Shrinivas K, Abraham BJ, Hannett NM, Zamudio AV, Manteiga JC, Li CH, Guo YE, Day DS, Schuijers J, Vasile E, Malik S, Hnisz D, Lee TI, Cisse II, Roeder RG, Sharp PA, Chakraborty AK, Young RA (2018) Coactivator condensation at super-enhancers links phase separation and gene control. *Science*, 361, eaar3958.
- Scheffer M, van Nes EH (2006) Self-organized similarity, the evolutionary emergence of groups of similar species. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 103, 6230–6235.
- Schnitzer MJ (1993) Theory of continuum random walks and application to chemotaxis. *Physical Review E*, 48, 2553–2568.
- Schrödinger E (1962) *What is Life: The Physical Aspect of the Living Cell*. University Press Macmillan Co., New York.
- Shin Y, Brangwynne CP (2017) Liquid phase condensation in cell physiology and disease. *Science*, 357, eaaf4382.
- Speck T, Bialké J, Menzel AM, Löwen H (2014) Effective Cahn-Hilliard equation for the phase separation of active

- brownian particles. *Physical Review Letters*, 112, 218304.
- Stavi I, Rachmilevitch S, Hjazin A, Yizhaq H (2018) Geodiversity decreases shrub mortality and increases ecosystem tolerance to droughts and climate change. *Earth Surface Processes & Landforms*, 43, 2808–2817.
- Tarnita CE, Bonachela JA, Sheffer E, Guyton JA, Coverdale TC, Long RA, Pringle RM (2017) A theoretical foundation for multi-scale regular vegetation patterns. *Nature*, 541, 398–401.
- Tejedor A, Longjas A, Edmonds DA, Zaliapin I, Georgiou TT, Rinaldo A, Foufoula-Georgiou E (2017) Entropy and optimality in river deltas. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 114, 11651–11656.
- Tsimring L, Levine H, Aranson I, Ben-Jacob E, Cohen I, Shochet O, Reynolds WN (1995) Aggregation patterns in stressed bacteria. *Physical Review Letters*, 75, 1859–1862.
- Turing A (1952) The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences*, 237, 37–72.
- van de Koppel J, Gascoigne JC, Theraulaz G, Rietkerk M, Mooij WM, Herman PMJ (2008) Experimental evidence for spatial self-organization and its emergent effects in mussel bed ecosystems. *Science*, 322, 739–742.
- van de Koppel J, Rietkerk M, Dankers N, Herman PMJ (2005) Scale-dependent feedback and regular spatial patterns in young mussel beds. *The American Naturalist*, 165, E66–E77.
- van de Koppel J, Crain CM (2006) Scale-dependent inhibition drives regular tussock spacing in a freshwater marsh. *The American Naturalist*, 168, E136–E147.
- van der Heide T, Bouma TJ, van Nes EH, van de Koppel J, Scheffer M, Roelofs JGM, van Katwijk MM, Smolders AJP (2010) Spatial self-organized patterning in seagrasses along a depth gradient of an intertidal ecosystem. *Ecology*, 91, 362–369.
- Vicsek T, Czirók A, Ben-Jacob E, Cohen II, Shochet O (1995) Novel type of phase transition in a system of self-driven particles. *Physical Review Letters*, 75, 1226–1229.
- von Hardenberg J, Meron E, Shachak M, Zarmi Y (2001) Diversity of vegetation patterns and desertification. *Physical Review Letters*, 87, 198101.
- Weerman EJ, van de Koppel J, Eppinga MB, Montserrat F, Liu QX, Herman PMJ (2010) Spatial self-organization on intertidal mudflats through biophysical stress divergence. *The American Naturalist*, 176, E15–E32.
- Werdelin L, Olsson L (1997) How the leopard got its spots: A phylogenetic view of the evolution of felid coat patterns. *Biological Journal of the Linnean Society*, 62, 383–400.
- Yizhaq H, Gilad E, Meron E (2005) Banded vegetation: Biological productivity and resilience. *Physica A: -Statistical Mechanics and Its Applications*, 356, 139–144.
- Zelnik YR, Meron E, Bel G (2015) Gradual regime shifts in fairy circles. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 112, 12327–12331.
- Zhabotinskii AM (1964) Periodic course of the oxidation of malonic acid in a solution (studies on the kinetics of beolusov's reaction). *Biofizika*, 9, 306–311.
- Zhao L, Zhang K, Koen S, Li XZ, Liu QX, van de Koppel J (2021) Fairy circles reveal the resilience of self-organized salt marshes. *Science Advances*, 7, abe1100.

(责任编辑: 王少鹏 责任编辑: 黄祥忠)

附录 Supplementary Material

附录1 自组织在生态学中的发展趋势展望(英文版)

Appendix 1 The predominant research ideas of self-organization ecology in the future (English version)

<http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2020225-1.pdf>

附录1 自组织在生态学中的发展趋势展望(英文版)

Appendix 1 The predominant research ideas of self-organization ecology in the future (English version)