极濒危植物中华水韭休宁居群的遗传结构

陈媛媛 叶其刚 李作洲 黄宏文*

(中国科学院武汉植物园, 武汉 430074)

摘要: 采用超薄平板微型聚丙烯酰胺等电聚焦电泳方法对极濒危蕨类植物中华水韭(*Isoetes sinensis*)现存于安徽休宁的5个亚居群的等位酶多样性和遗传结构进行了研究。结果表明: 中华水韭居群每位点平均等位基因数 $A = 1.7$, 平均多态位点比率 $P = 55.56\%$, 平均预期杂合度 $H_e = 0.201$ 。居群中半数的多态位点表现为等位基因的“固定杂合”, 5个亚居群的遗传多样性无显著差异, 但都表现出严重偏离 Hardy-Weinberg 平衡的杂合子过量; 其遗传变异主要发生于亚居群内(94.27%), 亚居群之间的遗传分化较小($G_{st} = 0.0573$), 亚居群间遗传一致度较高($I = 0.960 - 0.999$)。我们推断这可能是由于居群构建之初的奠基者效应或者原种群曾经历了较为严重的遗传瓶颈所导致; 此外亚居群间便利的基因交流也可能起到了很大作用($Nm = 4.5062$)。取自休宁居群的75株样品由13个专一多位点基因型(18个位点等位酶基因型)组成, 亚居群及个体间高度遗传均质。本文还就中华水韭休宁野生居群濒危的遗传因素进行了探讨, 并提出了相应的保育策略。

关键词: *Isoetes sinensis*, 异源多倍体, 基因频率, 遗传多样性, 遗传均质化, 保育策略

中图分类号: Q16 文献标识码: A 文章编号: 1005 - 0094(2004)06 - 0564 - 08

Genetic structure of Xiuning population of *Isoetes sinensis*, a critically endangered species in China

CHEN Yuan-Yuan, YE Qi-Gang, LI Zuo-Zhou, HUANG Hong-Wen*
Wuhan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430074

Abstract: Allozymic variation and genetic structure of five subpopulations of *Isoetes sinensis* sampled from Xiuning, Anhui Province were investigated using isoelectric focusing in thin-layer polyacrylamid slab gels. Eighteen loci of 10 enzyme systems were examined and used for the analysis of population genetic parameters. A high genetic diversity was observed in the population, with mean number of alleles per loci (A) = 1.7, mean percentage of polymorphic loci (P) = 55.56%, and average expected heterozygosity (H_e) = 0.201. These parameters of genetic diversity were much higher than the average values in fern species. Excess fixed heterozygotes “*aabb*” found in the population were greatly responsible for deviation from Hardy-Weinberg equilibrium at some polymorphic loci. No significant difference in genetic variation was found among the five subpopulations. Partitioning the genetic diversity indicated that 94.27% of the genetic variation was within subpopulations and only 5.73% existed between subpopulations, which was explained by a genetic bottleneck or founder effect, as well as by the clonal reproduction of this species and “fixed heterozygosity”. Mean gene flow among subpopulations (Nm) was 4.5062 and genetic identities among subpopulations ranged from 0.960 to 0.999, which is suggestive evidence that the Xiuning population is panmictic in its current habitat. Furthermore, the sampled population with a total of 75 individuals consists of only 13 multi-locus genotypes, suggesting a high genetic uniformity within and among subpopulations. Finally, we discuss the risk of extinction of this species in the wild driven by population genetic factors, and conservation strategies.

Key words: allopolyploid, gene frequency, genetic diversity, genetic homogeneity, conservation strategy, *Isoetes sinensis*

中华水韭 (*Isoetes sinensis*) 为异孢型拟蕨类植物, 隶属于水韭科 (Isoetaceae) 唯一幸存的孑遗属——水韭属 (Takhtajan, 1956; Taylor & Hickey, 1992)。水韭属植物由于形态特征独特且在蕨类植物系统演化中具有重要地位而始终倍受植物学家关注 (Shukla *et al.*, 2002)。中华水韭适生于微酸性浅水池沼、塘边和山沟淤泥中, 在我国主要分布于长江流域和钱塘江流域。据报道, 江苏、安徽、浙江和江西的部分湿地中均有分布 (Fang & Cheng, 1992; 张朝芳和章绍尧, 1993; 陈家宽等, 1998)。近年来由于人为干扰日益严重, 其分布范围及自然居群正不断缩小, 破碎化程度逐渐加剧, 濒临灭绝, 已被列为国家一级重点保护野生植物 (于永福, 1999; 郝日明等, 2000)。2000–2003 年的野外调查结果表明, 中华水韭目前仅存安徽休宁、浙江松阳和建德 3 个较大的野外居群 (叶其刚和李建强, 2003; 庞新安等, 2003); 另外在广西桂林仅有零星个体分布 (薛跃规和黄云峰, 2002), 保护形势非常严峻。

制定濒危物种有效保育策略的前提是清楚地了解该物种的遗传多样性和居群遗传结构 (Hamrick *et al.*, 1991), 特别是要了解物种居群内遗传结构、时空分布、基因型结构特征和基因流动态及其与生境

有关的物种生物学影响因素 (Kang & Chung, 2000; Shea & Furnier, 2002; Epperson, 2003), 这些同时也是回归自然恢复重建居群的科学基础 (Escudero *et al.*, 2003)。近来, 国内对中华水韭遗传基础的研究已经展开 (陈媛媛等, 2003; 陈进明等, 2004), 陈进明等 (2004) 使用 RAPD 方法对我国中华水韭进行了遗传多样性研究。但 RAPD 作为一种显性标记, 无法直接用于基因型及与基因型相关问题的分析。本研究使用等位酶这一共显性标记对中华水韭安徽休宁居群进行了遗传多样性和遗传结构的研究, 从遗传学角度探讨了中华水韭的濒危原因并提出了相应保护策略。

1 材料和方法

1.1 居群概况及采样

中华水韭在安徽的分布仅限于休宁县五城西田林场璜茅林区, 其地理位置为 118° 9' 40" – 118° 10' 4"E、29° 30' 28" – 29° 30' 40"N。整个居群面积约为 300 m², 被水田分隔为 5 个亚居群, 其中亚居群 XN1 和 XN5 位于已弃耕 3–4 年的水田中, XN2、XN3 和 XN4 位于梯田的排水沟中 (图 1)。亚居群的海拔高度在 270–310 m 之间, 生境中水的 pH 值

图1 中华水韭安徽居群分布及取样图
Fig. 1 Sampling location and spatial distribution of the five subpopulations (XN1 – XN5) of *Isoetes sinensis* in Xiuning population of Anhui

均为 5.5。

2002 年 7 月,我们对整个居群进行了全面的生境及生态学调查(叶其刚,未发表资料),发现该居群大小约为 300 株(XN2 中有 100 余株,XN4 中 20 余株,其他 3 个亚居群中各约 40 株)。我们在该居群采集了 75 株个体用于迁地保护居群构建与遗传多样性检测,并于 2003 年春,取每植株的新生嫩叶 0.1 g 用于等位酶分析。

1.2 等位酶分析

等位酶的提取、电泳、染色采用超薄平板微型聚丙烯酰胺等电聚焦电泳方法(黄宏文,2000),经预实验对 22 个酶系统的筛选,检测到 10 种具清晰酶谱的酶系:ACP(酸性磷酸酶 E. C. 3. 1. 3. 2)、ADK(腺苷酸激酶 E. C. 2. 7. 4. 3)、ADH(乙醇脱氢酶 E. C. 1. 1. 1. 1)、DIA(还原型辅酶 I 心肌黄酶 E. C. 1. 6. 2. 2)、EST(脂酶 E. C. 3. 1. 1. -)、MDH(苹果酸脱氢酶 E. C. 1. 1. 1. 37)、PGI(磷酸葡萄糖异构酶 E. C. 5. 3. 1. 9)、PGM(磷酸葡萄糖变位酶 E. C. 5. 4. 2. 2)、PRX(过氧化物酶 E. C. 1. 11. 1. 7)。各酶系统的位点与等位基因是根据染色体的倍性($2n = 4x = 44$)(何子灿等,2002),进行了 2 个株系的后代遗传分离的酶谱分析结果而确定。

等位酶数据采用 Biosys-1 (Swofford & Selander, 1981) 和 Genestat-PC (Lewis & Whitkus, 1989) 软件分析。四倍体基因型先算出各等位基因频率,以基因频率的形式输入计算机进行居群遗传学参数分析。应用 Biosys-1 软件计算每位点等位基因数 (A)、多态位点比率 (P)、平均预期杂合度 (H_e)、基因频率均一性的卡平方 χ^2 检验、Nei's 遗传一致度 (1972) 和 Roger's 遗传距离 (Wright, 1978),并采用 Roger's 遗传距离进行 UPGMA 聚类分析。应用 Genestat-PC 软件计算居群总的遗传多样性 (H_t)、亚居群内的遗传多样性 (H_s)、亚居群间遗传多样性 (D_{st}) 和遗传分化度 (G_{st})。

平均观察杂合度 (H_o) 依据 $H_o = - \sum_{i=1}^n H_{oi} / n$ (H_{oi} 为第 i 位点上的实际杂合度; n 为测定的位点总数) 计算,固定指数 (F) 依据 $F = 1 - H_o / H_e$ 算出,居群每代迁移数 $Nm = (1 - G_{st}) / 4G_{st}$ (Wright, 1951)。使用 NTSYS 软件 (Rohlf, 1994) 进行了居群地理距离与遗传距离相关性的 Mantel 检验。

2 结果

2.1 等位酶分析及其遗传变异

本研究运用 10 个酶系统对中华水韭安徽休宁居群 5 个亚居群的 75 个个体的等位酶变异进行了检测,在 18 个位点上共检测到 31 个等位基因。*Acp-1*、*Acp-3*、*Adh*、*Adk*、*Dia-1*、*Dia-2*、*G3pdh* 和 *Mdh-4* 在该居群中表现为单态位点。其余 10 个位点均为多态位点,但其中 *Est-1*、*Est-2*、*Est-3*、*Pgi-3* 和 *Pgm-2* 表现出异源四倍体典型的等位基因“固定杂合性”,即在 5 个亚居群中均为“*aabb*”;其他 5 个多态位点中,*Acp-4*、*Mdh-3* 和 *Pgm-3* 各有 3 个等位基因,*Prx-2* 和 *Acp-2* 各有 2 个等位基因,*Acp-4^a*、*Mdh-3^c* 和 *Pgm-3ⁿ* 分别只存在于 XN5、XN1 和 XN2 亚居群中,且均为低频率(≤ 0.1)稀有等位基因。 χ^2 分析表明:5 个亚居群间的等位基因频率分布,除 *Acp-2*、*Acp-4* 和 *Prx-2* 为极显著差异外,其他位点均无显著差异(表 2)。

中华水韭安徽休宁居群的遗传多样性参数列在表 1。每位点平均等位基因数 $A = 1.7$,平均多态位点比率 $P = 55.56\%$,平均预期杂合度 $H_e = 0.201$ 。5 个亚居群之间遗传多样性差异不显著:平均每个位点的等位基因数(A)变异范围为 1.4 – 1.6;多态位点比率(P)为 38.89% – 50.00%;平均预期杂合度 (H_e) 为 0.180 – 0.202。5 个亚居群中,平均每个位点的实际杂合度 (H_o) 都远远高于其预期杂合度 (H_e),每个亚居群的固定指数 F 都接近 -1,说明各亚居群中的杂合子比例都严重超过预期比例,很大程度上偏离了 Hardy-Weinberg 平衡。

2.2 亚居群的遗传分化

5 个亚居群之间的遗传分化很小(表 2)。安徽休宁居群总的遗传多样性 $H_t = 0.1927$,其中亚居群内保持的遗传多样性 (H_s) 为 0.1816,亚居群间遗传多样性 (D_{st}) 为 0.0110,遗传分化度 $G_{st} = 0.0573$,表明总遗传多样性的 94.27% 来自于亚居群内部,5.73% 存在于亚居群之间。亚居群之间存在较大的基因流 ($Nm = 4.5062$)。在 5 个有差异的多态位点 (*Acp-2*, *Acp-4*, *Mdh-3*, *Pgm-3* 和 *Prx-2*) 中,*Prx-2* 的分化程度最大 ($G_{st} = 0.2744$),其次是 *Acp-2* ($G_{st} = 0.2059$)。

亚居群之间的遗传相似程度很高,亚居群间遗

表 1 中华水韭安徽休宁居群 5 个亚居群的遗传多样性(括号内为标准误)
Table 1 Genetic variation of the five subpopulations of *Isoetes sinensis* from Xiuning, Anhui Province. Standard errors in parentheses

亚居群 Subpopulation	<i>N</i>	<i>A</i>	<i>P</i> ¹⁾	<i>H_o</i>	<i>H_e</i> ²⁾	<i>F</i>
XN1	13	1.4(0.1)	38.89	0.329(0.027)	0.180(0.058)	-0.828
XN2	29	1.6(0.1)	50.00	0.347(0.030)	0.182(0.057)	-0.907
XN3	13	1.4(0.1)	44.44	0.363(0.037)	0.193(0.058)	-0.881
XN4	10	1.4(0.1)	44.44	0.372(0.027)	0.202(0.061)	-0.842
XN5	10	1.4(0.1)	38.89	0.328(0.018)	0.186(0.059)	-0.763
各亚居群平均 Mean of subpopulations	15	1.5(0.1)	43.33	0.348(0.028)	0.189(0.059)	-0.844
居群总水平 Total at population level	75	1.7(0.2)	55.56	0.350(0.032)	0.201(0.059)	-0.741

N: 实际取样数; *A*: 每位点的等位基因平均数; *H_o*: 平均观察杂合度; *H_e*: 平均预期杂合度; *F*: 固定指数; *P*: 多态位点比率; 1) 最常见等位基因频率不超过 0.99 的位点为多态性位点; 2) 无偏估计(Nei, 1978)。居群代号见图 1
N, Actual sampling size; *A*, Mean number of alleles per locus; *H_o*, Mean observed heterozygosity; *H_e*, Mean expected heterozygosity; *F*, Mean fixation index; *P*, Percentage of polymorphic loci; 1) A locus is considered polymorphic if the frequency of the most common allele does not exceed 0.99; 2) Un-biased estimate (Nei, 1978). Subpopulation codes are shown in Fig. 1

表 2 中华水韭安徽休宁 5 个亚居群的遗传结构
Table 2 Partitioning genetic diversity among the five natural subpopulations of *Isoetes sinensis* from Xiuning, Anhui Province

位点 Locus	<i>H_t</i>	<i>H_s</i>	<i>D_{st}</i>	<i>G_{st}</i>	<i>Nm</i>	χ^2
<i>Acp</i> -1	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—
<i>Acp</i> -2	0.4945	0.3927	0.1018	0.2059	0.9642	21.809**
<i>Acp</i> -3	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—
<i>Acp</i> -4	0.1920	0.1554	0.0366	0.1905	1.0623	49.553**
<i>Adh</i>	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—
<i>Adk</i>	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—
<i>Dia</i> -1	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—
<i>Dia</i> -2	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—
<i>Est</i> -1	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	—	0.000 ^{ns}
<i>Est</i> -2	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	—	0.000 ^{ns}
<i>Est</i> -3	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	—	0.000 ^{ns}
<i>G3pdh</i>	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—
<i>Mdh</i> -3	0.0296	0.0289	0.0008	0.0266	9.1485	2.291 ^{ns}
<i>Mdh</i> -4	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—
<i>Pgi</i> -3	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	—	0.000 ^{ns}
<i>Pgm</i> -2	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	—	0.000 ^{ns}
<i>Pgm</i> -3	0.0413	0.0396	0.0017	0.0413	5.8033	8.205 ^{ns}
<i>Prx</i> -2	0.2109	0.1503	0.0579	0.2744	0.6612	37.421**
Mean	0.1927	0.1816	0.0110	0.0573	4.5062	—

H_t: 总的遗传多样性; *H_s*: 亚居群内遗传多样性; *D_{st}*: 亚居群间遗传多样性; *G_{st}*: 遗传分化度; χ^2 : 等位基因频率在亚居群间分布差异的 χ^2 分析; ns, ** 分别代表不显著和在 0.01 水平下的显著性
H_t, Total genetic diversity; *H_s*, Genetic diversity within subpopulations; *D_{st}*, Genetic diversity among subpopulations; *G_{st}*, The relative magnitude of differentiation among subpopulations; χ^2 , The test of difference in distribution of allele frequencies among subpopulations; ns, Nonsignificant; **, Significant at 0.01 level

传一致度(*I*)为 0.960 – 0.999。采用 Roger’s 遗传距离对中华水韭休宁居群 5 个亚居群进行 UPGMA 聚类分析的结果显示(图 2):位于分布区中间的 3 个亚居群 XN1、XN2 和 XN3 先聚在一起,然后与位于分布区两端的 XN4 和 XN5 相聚,这表明分布区中间的 3 个亚居群之间基因交流更加频繁或起源上关系更近,从而导致其遗传特性更为相似。聚类结果与距离系数矩阵相关性检验表明其适合度非常低

图2 中华水韭安徽休宁居群5个亚居群的UPGMA遗传距离聚类图(根据Roger's遗传距离)
Fig. 2 UPGMA dendrogram of Roger's genetic distances among five *Isoetes sinensis* subpopulations (XN1 - XN5) from Xiuning of Anhui Province

(共表征相关系数 $r = 0.0419$, 显著性 $P = 0.5343$)。居群中许多个体具有完全一致的多位点基因型(18个位点复合基因型)。将整个居群的个体以等位酶基因型归并后,75个植株有13个多位点基因型,其中最优势多位点基因型有34个个体,占总取样数的45.3%。这一结果反映了我国现存中华水韭的一个主要居群中45.3%的个体是由一个基因型克隆而来。所有多位点基因型的任两种之间至多仅存3个有差异的单位点,这说明该居群中的个体遗传基础极为相似。

3 讨论

3.1 休宁居群的遗传多样性

与广布种相比,稀有种或特有种以及分布范围狭窄的植物物种的遗传多样性水平一般较低(Hamrick & Godt, 1990)。然而也有研究表明,稀有种或特有种可保持较高的遗传变异(Conser & Crawford, 1994; 葛颂和洪德元,1999)。在本研究中,中华水韭休宁居群显示出较高的遗传多样性水平($A = 1.7, P = 55.56\%, H_e = 0.201$),远高于北美的6种二倍体水韭居群(其中柔软水韭(*Isoetes flaccida*)的遗传变异最高: $A = 1.4, P = 22.9\%, H_e = 0.093$),也高于蕨类平均水平($A = 1.57, P = 33.9\%, H_e = 0.117$)(Caplen & Werth, 2000)。这主要是因为:(1)中华水韭为四倍体,可以容纳和积累更多的变异(Ohno, 1970),而且较二倍体物种更能有效降低

近交衰退对遗传多样性的不利影响(Frankham *et al.*, 2002);(2)中华水韭为异源多倍体起源(何子灿,私人通讯),异源多倍体植物的有性生殖过程通常是二体遗传方式,使其在很多位点产生固定杂合(Ohnishi & Asano, 1999; Comai, 2000);(3)中华水韭具有高度的克隆繁殖兼有性的孢子繁殖特性,因而由于变异、固定杂合及有性繁殖而产生的杂合性可以通过克隆繁殖而最终被有效固定下来。

3.2 居群中的杂合子过量和遗传均质化

已有研究表明,居群中短期内杂合子的大量丢失将会减少个体的适合度并降低居群的生活力(DeMauro, 1993; Buza *et al.*, 2000)。本实验中5个亚居群均表现出杂合子比例严重超过Hardy-Weinberg平衡的预期比率,居群中多数多态位点表现为等位基因的“固定杂合”,这是与中华水韭的异源四倍体起源和克隆生殖特性密切相关的。中华水韭为异源四倍体,故酶带中常呈现出二体遗传的固定杂合性,这些杂合子及自然突变产生的杂合又会被中华水韭无性克隆繁殖所固定和累积,而最终导致居群中杂合子过量。

杂合子在珍稀濒危小居群中对维持遗传多样性和保持居群对不良环境的适应能力具有重要意义(Frankham *et al.*, 2002)。虽然中华水韭是因为异源多倍体而产生杂合子固定,从而保持了相对较高的遗传多样性,但就其基因型多样性而言,多样性是极低的:75个个体分为13个多位点基因型,仅最优势

基因型就有 34 个个体,这说明居群中存在遗传均质性危险,从而会使物种的长期适应性进化能力下降,并增加了在不断变迁的环境中因随机事件而灭绝的风险。

3.3 休宁居群的遗传分化

影响植物种群内遗传分化的因素很多,微生境异质性而导致的差异和受限的基因流是导致植物居群内遗传分化的两个重要因素(Jain & Bradshaw, 1966; Antonovics, 1968)。本研究中,亚居群间的遗传分化度 $G_{st}=0.0573$,亚居群间遗传一致度 $I=0.960-0.999$,说明中华水韭居群内遗传分化很小。造成这种情况的原因主要有以下两点:(1)以往所研究的热带水韭(*Isoetes stokii*)及北美 6 种水韭在等位酶水平上其居群内外均显示出高度的遗传一致性,由此推断奠基者效应极有可能在水韭属植物种群构建中起了重要作用(Hickey *et al.*, 1989; Caplen & Werth, 2000)。中华水韭休宁居群的多数位点上基因型在所有个体中表现一致正体现了奠基者效应的影响。也许正是最初少数个体迁移至此后又经克隆繁殖和“固定杂合”而导致目前居群中仅有少数几个多位点基因型存在的现状,然而同时也不排除现存居群曾经历了严重的遗传瓶颈效应(Hickey *et al.*, 1989)。(2)亚居群之间存在较大的基因流($Nm=4.5062$),可以避免因遗传漂变而引起的遗传分化。中华水韭大小孢子叶的叶基近轴面分别着生大小孢子囊,孢子的散布依靠孢子囊壁腐烂后散发,并靠水流进行传播;受精的雌配子体和孢子体也可由水流传播(Caplen & Werth, 2000)。安徽休宁的 5 个亚居群都分布于水田或水田边缘的沟渠中,它们之间有水流相通,这将极大地便利亚居群之间的基因交流;此外放牧和人为除草等也可引起亚居群之间的基因交流。另外研究地点为典型的南方湿地的小生境,环境比较一致,因而环境异质性导致的选择差异不会很大。至于由微生境的细小差异而导致的选择差异的有无及其影响大小有待于进一步研究。

3.4 休宁居群的保育及复壮策略

关于物种濒危的机制一直是遗传学家和生态学家争论的焦点。遗传学家偏重遗传基础,而生态学家则强调生态环境的作用(Hamrick & Godt, 1996)。近 10 年来,大量的研究证明,珍稀濒危小居群物种的遗传基础与小居群的适应性进化和生存潜力以及

灭绝风险直接相关(Godt *et al.*, 1996; Peakall *et al.*, 2003)。以往的生态学调查研究表明,中华水韭的濒危与污染而造成的生境丧失以及它在自然群落中处于竞争劣势两大因素有关(庞新安等, 2003; 叶其刚和李建强, 2003)。本研究进一步揭示了中华水韭安徽休宁居群的遗传基础可能对其濒危状况和该野外居群的可持续生存能力具潜在影响。

野外调查中发现,休宁居群受人为干扰较为严重,加之近些年来气候等自然因素的变化,如年际间的干旱和雨季变化所导致的湿地面积波动等,都会增加中华水韭居群的生存压力。虽然本研究揭示了由于异源四倍体的固定杂合作用,休宁居群的总体遗传多样性仍然较高,但亚居群间及个体间高度的遗传均质性对该居群应对环境变化的潜力可能有不利影响:一旦遇到极端干旱或多雨的年份,很难想象由少量几个基因型组成的居群会成功应对环境灾难而幸存。这种由于居群基因型组成单一而导致小居群在自然灾变中灭绝的情况时常发生(Godt *et al.*, 1997; Galeuchet *et al.*, 2002)。从目前中华水韭居群的现状看,迁地保护是非常必要的。在我们的迁地保护居群中,经过近两年的观察发现,中华水韭有较强的有性及无性繁殖能力,扩大繁殖相对容易。因而通过进一步严格鉴定其基因型指纹标记并综合其繁育健康度性状,对中华水韭所有特有基因型进行取样和迁地扩繁,该物种的回归引种和自然居群恢复最终是可以实现的。

同时我们还建议,为了避免仅存的中华水韭野生居群的灭绝,目前采取如下保护措施是非常必要和紧迫的:(1)将安徽休宁居群的这块湿地生境保护起来,停止作为农业用地。因为耕作、除草、放牧及施农药、化肥等生产活动都会对中华水韭及其生境造成伤害;(2)疏通沟渠,注意旱季补水,以满足中华水韭有性繁殖及其生长发育所需的条件;(3)将其竞争物种如灯心草(*Juncus* spp.)、谷精草(*Eriocaulon* spp.)等剔除,同时防止不法采集和虫畜啃食;(4)鉴于本研究揭示的其居群遗传分化很小和基因型鉴定的结果,可适当考虑亚居群间的基因型引种以缓解居群中遗传均质性危机,整体提高居群的遗传多样性。

参考文献

Antonovics, J. 1968. Evolution in closely adjacent plant popu-

- lations. IV. Manifold effects of gene flow. *Heredity*, **23**: 507 – 524.
- Buza, L., Young, A. and Thrall, P. 2000. Genetic erosion, inbreeding and reduced fitness in fragmented populations of the endangered tetraploid pea *Swainsona recta*. *Biological Conservation*, **93**: 177 – 186.
- Caplen, C. A. and Werth, C. R. 2000. Isozymes of the *Isoetes riparia* complex. I. Genetic variation and relatedness of diploid species. *Systematic Botany*, **25**: 235 – 259.
- Chen, J. K. (陈家宽), Wang, H. Y. (王海洋) and He, G. Q. (何国庆). 1998. A survey on the habitats of *Oryza rufipogon* and *Isoetes sinensis* in Jiangxi Province. *Chinese Biodiversity* (生物多样性), **6**: 260 – 266. (in Chinese with English abstract)
- Chen, J. M. (陈进明), Wang, J. Y. (王晶苑), Liu, X. (刘星), Zhang, Y. W. (张彦文) and Wang, Q. F. (王青锋). 2004. RAPD analysis for genetic diversity of *Isoetes sinensis*. *Biodiversity Science* (生物多样性), **12**: 348 – 353. (in Chinese with English abstract)
- Chen, Y. Y. (陈媛媛), Ye, Q. G. (叶其刚) and Huang, H. W. (黄宏文). 2003. Preliminary study on allozyme analysis for *Isoetes sinensis* Palmer. *Journal of Wuhan Botanical Research* (武汉植物学研究), **21**: 91 – 94. (in Chinese with English abstract)
- Comai, L. 2000. Genetic and epigenetic interactions in allopolyploid plants. *Plant Molecular Biology*, **43**: 387 – 399.
- Conser, M. E. and Crawford, D. L. 1994. Comparisons of isozyme diversity in three rare species of *Coreopsis* (Asteraceae). *Systematic Botany*, **19**: 350 – 358.
- DeMauro, M. M. 1993. Relationship of breeding system to rarity in the lakeside daisy (*Hymenoxys acaulis* var. *glabra*). *Conservation Biology*, **7**: 542 – 550.
- Epperson, B. K. 2003. *Geographical Genetics*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2 – 11.
- Escudero, A., Eriondo, J. M. and Forres, M. E. 2003. Spatial analysis of genetic diversity as a tool for plant conservation. *Biological Conservation*, **113**: 351 – 365.
- Fang, Y. Y. and Cheng, C. Z. 1992. *Isoetes sinensis* Palmer. In: Fu, L. G. and Jin, J. M. (eds.), *China Plant Red Data Book – Rare and Endangered Plants*. Science Press, Beijing, 17.
- Frankham, R., Ballou, J. D. and Briscoe, D. A. 2002. *Introduction to Conservation Genetics*. Cambridge University Press, New York.
- Galeuchet, D. J., Holderegger, R., Rutishauser, R. and Schneller, J. J. 2002. Isozyme diversity and reproduction of *Typha minima* populations on the upper River Rhine. *Aquatic Botany*, **74**: 19 – 22.
- Ge, S. (葛颂) and Hong, D. Y. (洪德元). 1999. Studies of morphological and allozyme variation of the endangered *Adenophora lobophylla* and its widespread congener *A. potaninii*. *Acta Genetica Sinica* (遗传学报), **26**: 410 – 417. (in Chinese with English abstract)
- Godt, M. J. W., Johnson, B. R. and Hamrick, J. L. 1996. Genetic diversity and population size in four rare southern Appalachian plant species. *Conservation Biology*, **10**: 796 – 805.
- Godt, M. J. W., Race, T. and Hamrick, J. L. 1997. A population genetic analysis of *Ziziphus celata*, an endangered Florida shrub. *Journal of Heredity*, **88**: 531 – 533.
- Hamrick, J. L. and Godt, M. J. W. 1990. Allozyme diversity in plant species. In: Brown, A. D. H., Clegg, M. T., Kahler, A. L. and Weir, B. S. (eds.), *Plant Population Genetics, Breeding and Genetic Resources*. Sinauer, Sunderland, 43 – 63.
- Hamrick, J. L. and Godt, M. J. W. 1996. Conservation genetics of endemic plant species. In: Avise, J. C. and Hamrick, J. L. (eds.), *Conservation Genetics: Case History from Nature*. Chapman and Hall, New York, 281 – 304.
- Hamrick, J. L., Godt, M. J. W., Murawski, D. A. and Loveless, M. D. 1991. Correlations between species traits and allozyme diversity: implications for conservation biology. In: Falk, D. A. and Holsinger, K. E. (eds.), *Genetics and Conservation of Rare Plants*. Oxford University Press, New York, 75 – 86.
- Hao, R. M. (郝日明), Huang, Z. Y. (黄致远), Liu, X. J. (刘兴剑), Wang, Z. L. (王中磊), Xu, H. Q. (徐惠强) and Yao, Z. G. (姚志刚). 2000. The natural distribution and characteristics of the rare and endangered plants in Jiangsu, China. *Chinese Biodiversity* (生物多样性), **8**: 153 – 162. (in Chinese with English abstract)
- He, Z. C. (何子灿), Cai, Q. (蔡清), Liu, H. T. (刘宏涛), Li, J. Q. (李建强) and Huang, H. W. (黄宏文). 2002. Chromosome number of *Isoetes sinensis* Palmer, a rare and endangered pteridophyta plant. *Journal of Wuhan Botanical Research* (武汉植物学研究), **20**: 241 – 242. (in Chinese with English abstract)
- Hickey, R. J., Taylor, W. C. and Luebke, N. T. 1989. The species concept in pteridophyta with special reference to *Isoetes*. *American Fern Journal*, **79**: 78 – 89.
- Huang, H. W. (黄宏文). 2000. Ultra-thin slab IEF-PAGE method—an effective bio-analytic method for isozyme analysis. *Journal of Wuhan Botanical Research* (武汉植物学研究), **18**: 224 – 228. (in Chinese with English abstract)
- Jain, S. K. and Bradshaw, A. D. 1966. Evolutionary divergence among adjacent plant populations. I. The evidence and its theoretical analysis. *Heredity*, **21**: 407 – 441.

- Kang, S. S. and Chung, M. G. 2000. High levels of allozyme variation within populations and low allozyme divergence within and among species of *Hemerocallis* (Liliaceae). *American Journal of Botany*, **87**: 1634 – 1646.
- Lewis, P. and Whitkus, R. 1989. GENESTAT for microcomputers. *American Society of Plant Taxonomists Newsletter*, **2**: 15 – 16.
- Nei, M. 1972. Genetic distance between populations. *American Naturalist*, **106**: 283 – 292.
- Ohnishi, O. and Asano, N. 1999. Genetic diversity of *Fagopyrum homotropicum*, a wild species related to common buckwheat. *Genetic Resources and Crop Evolution*, **46**: 389 – 398.
- Ohno, S. 1970. *Evolution by Gene Duplication*. Springer-Verlag, New York.
- Pang, X. A. (庞新安), Liu, X. (刘星), Liu, H. (刘虹), Wu, C. (吴翠), Wang, J. Y. (王晶苑), Yang, S. X. (杨书香) and Wang, Q. F. (王青锋). 2003. The geographic distribution and habitat of the *Isoetes* plants in China. *Biodiversity Science* (生物多样性), **11**: 288 – 294. (in Chinese with English abstract)
- Peakall, R., Ebert, D., Scott, L. J., Meagher, P. F. and Offord, C. A. 2003. Comparative genetic study confirms exceptionally low genetic variation in the ancient and endangered relictual conifer, *Wollemia nobilis* (Araucariaceae). *Molecular Ecology*, **12**: 2331 – 2343.
- Rohlf, F. J. 1994. NTSYS-PC. Version 2.10. Applied Biostatistics Inc., New York.
- Shea, K. L. and Furnier, G. R. 2002. Genetic variation and population structure in central and isolated populations of Balsam fir, *Abies balsamea* (Pinaceae). *American Journal of Botany*, **89**: 783 – 791.
- Shukla, P. K., Srivastava, G. K. and Shukla, S. K. 2002. The quillworts (*Isoetes*) of India: distribution, endemism and species radiation. *Biodiversity and Conservation*, **11**: 959 – 973.
- Swofford, D. F. and Selander, R. B. 1981. *Biosys-1 (release 1) Users Manual*. University of Illinois, Urban-Champaign.
- Takhtajan, A. Л. (translated by Kuang, K. R. (匡可任)). 1963. *Te. lomophyta I* (高等植物). Science Press, Beijing, 99 – 108. (in Chinese)
- Taylor, W. C. and Hickey, R. J. 1992. Habitat, evolution, and speciation in *Isoetes*. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, **79**: 613 – 621.
- Wright, S. 1951. The genetic structure of populations. *Annual Eugenics*, **15**: 323 – 354.
- Wright, S. 1978. *Evolution and the Genetics of Populations*, (Vol. 4). *Variability within and among Natural Populations*. University of Chicago Press, Chicago, 79 – 103.
- Xue, Y. G. (薛跃规) and Huang, Y. F. (黄云峰). 2000. Rediscovery of *Isoetes sinensis* Palmer in suburb of Guilin. *Journal of Guangxi Normal University* (Natural Science) [广西师范大学学报(自然科学版)], **2**: 42 – 42. (in Chinese)
- Ye, Q. G. (叶其刚) and Li, J. Q. (李建强). 2003. Distribution status and causation of endangerment of *Isoetes sinensis* Palmer in Zhejiang Province. *Journal of Wuhan Botanical Research* (武汉植物学研究), **21**: 216 – 222. (in Chinese with English abstract)
- Yu, Y. F. (于永福). 1999. A milestone of wild plant conservation in China. *Plants* (植物杂志), (5): 3 – 11. (in Chinese)
- Zhang, C. F. (张朝芳) and Zhang, S. Y. (章绍尧). 1993. *Flora of Zhejiang* (浙江植物志) Vol. 1. Zhejiang Science and Technology Press, Hangzhou, 17 – 18.

(责任编辑: 时意专)