论武夷山在中国生物多样性保护中的地位

陈昌笃

(北京大学生态学中心, 北京 100871)

摘 要 武夷山位于福建省西北部。其主峰黄岗山海拔 2158 m, 是中国大陆东南部最高峰。山岭纵横, 气候温润, 生物种类繁多。已知有高等植物 2615 种, 动物 5249 种, 而且有不少特有和古老、孑遗、珍稀种类。分布到这里的种类有些还出现变异, 是国内外闻名的动物新种模式标本产地。是中国东南部重要的物种形成和分化中心, 生物的“避难所”。生态系统也很多样。存在不少树龄在 200 年以上, 甚至上千年的古树名木, 因而在《中国生物多样性国情研究报告》中被列为中国陆地 11 个生物多样性保护的“关键区”之一。此外, 该地现尚存清康熙和乾隆年间的禁止捕鱼和砍伐林木的刻碑, 说明它是中国境内有保护生物多样性优良传统的地区之一。

关键词 生物多样性, 生物多样性保护关键区, 武夷山

Biodiversity in the Wuyi Mountains and its importance in China/CHEN Chang-Du

Abstract The Wuyi Mountains are located in northwestern Fujian Province, and contain the Huanggangshan, the highest peak in southeastern China, at an elevation of 2158 m. In this mountainous district, with warm and moist climate, the species diversity is high. The known species of higher plants reaches 2615, and animals 5249. The endemic, ancient, relic, and rare species are plentiful. Some of them distributed here emerge variations. It is famous for large number of animal type specimens. So it is an important center for speciation, as well as “refuge” in southeastern part of China. Ecosystems are also diverse. Some old and famous trees, aged more than 200, even 1000 years can be found. Therefore, in *China's Biodiversity: A Country Study*, the Wuyi Mountains are listed as one of the eleven terrestrial critical regions for biodiversity conservation in China. Besides, on the bank of Giuqu Stream, there exists two steles recording the proclamations of Emperors Kangxi and Qianlong, which laid prohibitions againsting felling trees and fishing in the stream. It indicates that this is one of the regions with old tradition to protect biodiversity.

Key words biodiversity, critical regions for biodiversity conservation, the Wuyi Mountains

Author's address Center for Ecology, Peking University, Beijing 100871

武夷山位于福建省西北部, 其主峰黄岗山及周围地区是它的核心部分, 位于 $27^{\circ}33' - 27^{\circ}54'N, 117^{\circ}21' - 117^{\circ}51'E$ 。黄岗山海拔 2158 m, 是我国大陆东南部最高峰, 有“华东屋脊”之称。周围海拔超过 1500 m 的山峰有 110 余座, 山岭纵横, 河谷深切。因地处亚热带, 又距海较近, 气候温润多雨。山区年平均气温 $8.5 \sim 18^{\circ}C$, 年平均降雨量 1486~2150 mm, 年平均相对湿度 78~84%, 全年多云雾, 因而生物种类繁多。1979 年经国务院批准, 在其核心部分成立了武夷山国家级自然保护区, 并于 1987 年被联合国教科文组织《人与生物圈》国际协调理事会接纳为世界生物圈保护区。保护区面积 565 km²。

在新近出版的, 经国务院环境委员会讨论通过向世界公布的《中国生物多样性国情研究报告》中, 武夷山地区被确定为全国陆地 11 个具有全球意义的生物多样性保护的关键区之一^[1], 而且是整个中国东南部唯一的一个关键区, 也就是说它在中国东南部的生物多样性保护中最

具有关键意义,是优先保护的對象。

为什么武夷山有这样的地位?我们确定生物多样性保护的关键区的标准是:物种丰富度高、特有种多、是物种形成和分化的中心。这与国际上生物多样性保护的“热点”(hot spot)意义相近。

从已有资料看,武夷山地区(以保护区所在部分为代表)在生物多样性方面至少有以下特点:

1 动、植物种类繁多

武夷山居中亚热带,有大量亚热带的种类,也有从北方温带分布到这里的种类和从南方热带延伸到这里种类。在面积约 500 km² 的武夷山核心部分,据刘初铤的统计,有高等植物 2615 种(包括亚种、变种)。其中苔藓植物 366 种,蕨类植物 282 种,种子植物 1976 种(160 科,778 属)。此外有藻类 239 种(73 科,191 属),真菌 503 种(38 科,83 属),地衣 93 种^[2~4]。

动物方面已鉴定出 5249 种。其中哺乳类 71 种,鸟类 256 种,爬行类 73 种,两栖类 35 种,鱼类 40 种,贝类 27 种,寄生蠕虫 112 种。据汪家社统计,昆虫纲 33 个目中,除缺翅目、蜚蠊目外,其余 31 个目均有代表。经整理鉴定的昆虫已有 28 目,341 科,4557 种。估计武夷山地区昆虫,至少在 10 000 种以上^[3,5,6]。

这些数字表明,武夷山地区的生物多样性在中国东南部是首屈一指的。

2 特有种不少

在评价一个地区的生物多样性保护价值时,最具意义的是本身所具有的特有类别。据刘初铤的统计,数十年来国内外植物学者在武夷山地区采集研究的结果,共发表新种(包括亚、变种)50 多个。其中 41 种为武夷山地区特有^{[7]*}。它们是:

蕨类

武夷粉背蕨 *Aleuritopteris wuyishanensis*

福建铁角蕨 *Asplenium fujianensis*

武夷铁角蕨 *A. wuyishanensis*

圆片蹄盖蕨 *A. rotundilobum*

光盖毛蕨 *Cyclosorus decipiens*

永田鳞毛蕨 *Dryopteris changii*

光泽鳞毛蕨 *D. decipiens* var. *subbipinnata*

黄岗山鳞毛蕨 *D. huangongshanensis*

假同型鳞毛蕨 *D. pseudouniformis*

挂墩鳞毛蕨 *D. quatanensis*

武夷鳞毛蕨 *D. wuyishanensis*

密果瓦苇 *Lepisorus myriosorus*

福建剑蕨 *Loxogramme fujianensis*

武夷凸轴蕨 *Metathelypteris wuyishanica*

建阳鳞盖蕨 *Microlepia jiyangensis*

福建假瘤蕨 *Phymatopsis fukienensis*

武夷假瘤蕨 *P. wuyishanica*

武夷瘤足蕨 *Plagiogyria chinensis*

尖头耳蕨 *Polystichum acutipinnulum*

图1 武夷山位置图

Fig.1 Location of Wuyi Mountain

据刘初铤先生原先统计,其中 48 种为武夷山地区特有。但后经有关专家仔细审查,其中有 2 种为同物异名,1 种后被归并,4 种近年来在武夷山以外其他地方发现有分布,故为 41 种。

无盖耳蕨 <i>P. gymnocarpum</i>	福建杜鹃 <i>Rhododendron fukienense</i>
小檗科	武夷杜鹃 <i>R. wuyishanicum</i>
武夷小檗 <i>Berberis wuyiensis</i>	唇形科
蔷薇科	崇安鼠尾草 <i>Salvia chunganensis</i>
福建假稠李 <i>Maddenia fujianensis</i>	菊科
福建樱桃 <i>Prunus fukienensis</i>	武夷华千里光 <i>Sinosenecio wuyiense</i>
武夷山石楠 <i>Photinia wuyishanensis</i>	竹类
尾叶悬钩子 <i>Rubus caudifolius</i>	武夷山苦竹 <i>P. wuyishanensis</i>
福建悬钩子 <i>R. fujianensis</i>	长鞘茶杆竹 <i>Pseudosasa tongivaginata</i>
武夷悬钩子 <i>R. jiangxiensis</i>	斑箨茶杆竹 <i>P. notata</i>
无刺空心泡 <i>R. rosaeifolius</i> var. <i>wuyishanensis</i>	毛杆玉山竹 <i>Yushania hirticaulis</i>
铅山悬钩子 <i>R. yanshanensis</i>	撕裂玉山竹 <i>Y. lacera</i>
武夷山花楸 <i>Sorbus amabilis</i> var. <i>wuyishanensis</i>	长鞘玉山竹 <i>Y. longissima</i>
杜鹃花科	武夷玉山竹 <i>Y. wuyishanensis</i>

可见蕨类和竹类特有种很多是其特点。野生动物方面,武夷山地区以两栖、爬行类和昆虫分布众多闻名于世。崇安髭蟾(角怪)(*Vibrissaphora liui*)、崇安地蜥(*Platyplacopus sylvatica*)、崇安斜鳞蛇(*Pseudoxenodon bambusicola*)和鸟纲的挂墩鸦雀(*Paradoxornis davidianus*)为武夷山所特有。

百余年来,中外学者根据在武夷山地区的采集,共发表了 799 种昆虫新种,仅天敌昆虫就发现 687 种,水生昆虫 144 种^[2]。它们之中应该有相当数量的特有种,可惜在这方面尚没有专家进行分析统计。

3 古老、孑遗、珍稀种类众多

由于第四纪冰川对本区影响很小,加上复杂的地质地貌和小气候条件,使本区成为许多古老、孑遗、珍稀动植物种类的“避难所”。植物方面,在系统演化上原始或孤立的类别不少。例如:裸子植物中的银杏(*Ginkgo biloba*)、金钱松(*Pseudolarix amabilis*)、南方铁杉(*Tsuga chinensis* var. *tchekiangensis*)、江南油杉(*Keteleeria cyclolepis*)、水松(*Glyptostrobus pensilis*)、柳杉(*Cryptomeria fortunei*)、红豆杉(*Taxus chinensis*)*、长叶榧(*Torreya jackii*)、白豆杉(*Pseudotaxus chienii*)、罗汉松(*Podocarpus macrophylla*)、竹柏(*P. nagi*)等;被子植物中的短萼黄连(*Coptis chinensis* var. *brevise-pala*)、鹅掌楸(*Liriodendron chinense*)、凹叶厚朴(*Magnolia biloba*)、观光木(*Tsoongiodendron odorum*)、乐东拟单性木兰(*Parakmeria lotungensis*)、黄山木兰(*Magnolia cylindrica*)、小花木兰(*M. sieboldii*)、钟萼木(*Bretschneidera sinensis*)、半枫荷(*Semiliquidamba cathayensis*)、细柄半枫荷(*S. chingii*)、黄山花楸(*Sorbus amabilis*)、竹节人参(*Panax pseudoginseng* var. *japonicum*)、银钟树(*Halesia macgregorii*)、香果树(*Emmenopterys henryi*)、延龄草(*Trillium tschonoskii*)和润边草(*Peltoboykinia tellimoides*)等,总数在 100 种以上。兰科植物多也是本区的特点,已知有 32 属 78 种。宽距兰(*Yoania japonica*)、多花宽距兰(*Y. amagiensis*)为中国新记录种。此外,存在一定数量的古老的离生心皮类植物,如木兰科、八角科、五味子科、木通科的种类,以及单型和少型科属如大血藤科、防己科、腊梅科、胡椒科、三白草科、杨梅科、胡桃科的代表,也是本区植物区系的特点^[3]。

初步统计武夷山地区的孑遗种、古老离生心皮类和茱萸花序类型的植物共有 181 种、12

· 据傅立国和李楠在 *Novon* 7:263,1991 将该名称并入 *T. wallichian* Zutt. 作异名

变种。其中有 31 种列入《中国植物红皮书》(第一卷)。

保护区内共采集到兰科植物 50 种,其中不少为珍稀濒危种类。例如,近年来在本区发现的中国大陆新分布记录种的宽距兰(*Yuania japonica*)、多花宽距兰(*Y. amagiensis*)、带叶兰(*Taeniophyllum aphyllum*)、黄赤箭(*Gastrodia javanica*)等,而细茎石斛(*Dendrobium moniliforme*)、托山石斛(*D. tosaense*)、绒叶斑叶兰(*Goodyera velutina*)、天麻(*Gastrodia elata*)等则为稀有或濒危^[2]。

由于气候温湿,叶附生苔类发达,也是本区特色。在区内已采集到叶附生苔类植物 7 科, 12 属, 26 种。其中有 9 种为我国叶附生苔类植物新记录。斯氏合叶苔(*Scapania stephanii*)、日本羽苔(*Plagiochila japonica*)、毛边光萼苔齿边变种(*Porella perothetiana*)等 3 种是我国已知叶附生苔类植物中植株最大的种类。株长可达 2~4.5 cm,叶宽可达 0.3~0.5 cm。在其它地区这些种类仅见于树基或石块上,而在本区却能附生于植物叶上,且生长良好^[2]。

武夷山保护区的动物有 9 种列入国家一级保护, 48 种列入二级保护, 83 种列入中日、中澳候鸟保护协定规定加以保护。一级保护的有黑麂(*Muntiacus crinifrons*)、黄腹角雉(*Tragopan caboli*)、金斑喙凤蝶(*Teinopalpus aureus*)等;二级保护的有短尾猴(*Macaca arcoides*)、白鹇(*Lophura nycthemera*)、黑熊(*Selenarctos thibetanus*)、金猫(*Felis temmincki*)、苏门羚(*Capricornis sumstaensis*)、大灵猫(*Viverra zibetha*)、小灵猫(*Viverricula indica*)等,它们在保护区还有一定数量存在。此外,栖息于武夷山地区的珍稀种类还有鱼类中的厚唇鱼(*Acrossocheilus labiatulus*)、武夷厚唇鱼(*A. wuyianensis*)、半刺厚唇鱼(*A. hemispinus*)和扁尾薄鱼鳅(*Leptobotia tienaiensis*)等;两栖类中的中国小鲵(*Hynobius chinensis*)、挂墩角蟾(*Megophrys boettgeri*)、经浦树蛙(*Rhacophorus chenfui*)和红吸盘小树蛙(*Rhilautes rhododiscus*)等;爬行类的丽棘蜥(*Acanthosaura lepidogaster*)、脆蛇蜥(*Ophisaurus harli*)和挂墩后棱蛇(*Ophithotropis kuatunensis*)等;鸟类有白额山鹧鸪(*Arborophila gingica*)、淡绿鸚鵡(*Pteruthius xanthochlorus*)和黄眉林雀(*Sylviparus modestus*);哺乳类有猪尾鼠(*Typhlomys cinereus*)、黑腹绒鼠(*Eothenomys melanogaster*)、棕鼯鼠(*Petaurista petaurista rufipes*)、毛冠鹿(*Elaphodus cephalophus*)和豹猫(*Felis bengalensis*)等。区内还有过华南虎(*Panthera tigris amoyensis*)的记录。4557 种昆虫中包括 20 种珍稀昆虫,如金斑喙凤蝶、长臂金龟(*Cheirotonus jansonii*)等。

4 种内变异丰富

一些广布于福建或邻近省份的种,在本区内常发生种内分化,而形成变种或变型。例如,广布于华东、华中及西南的软枣猕猴桃(*Actinidia arguta*),在福建仅见于本区,但同时又出现紫果软枣猕猴桃(*A. a. var. purpurea*);广布于华东、中南和西南的多花勾儿茶(*Berehemia floribunda*)在福建也较为常见,而在本区内又出现一种矩叶勾儿茶(*B. f. var. oblongifolia*);豆梨(*Pyrus callergana*)也是福建及华东、华中和华南的广布种,在本区的黄岗山顶又多了一个绒毛豆梨(*P. c. var. callergana f. tomentella*)等等。

动物方面,啮齿目的波氏长吻松鼠福建亚种(*Dremomys pernyi calidior*)和黑腹绒鼠福建亚种(*Eothenomys melanogaster colurnus*);昆虫纲的 *Spilaretea obligua* ssp. *fukieni* 和 *Gomphidia kruegeri fukienensis*。特新蚤闽北亚种(*Neopsylla specialis minpiensis*)等等在本区的出现属于同一性质。

5 著名的模式标本产地

武夷山保护区的挂墩、大竹岚一带是闻名国内外的动物新种模式标本产地。从 1873 年

10月法国人 P. A. David 进入武夷山挂墩一带采集动物标本,并发表了若干脊椎动物新种开始,随后英国的 La Touche(1896~1898),美国的 Pope(1925~1926)、德国的 Klapperich(1937~1938)等曾先后到此采集了大量生物标本,使这里成为世界脊椎动物和昆虫新种的重要模式标本产地。Pope 在 1931 年发表的《福建省两栖动物》一文中统计了挂墩发现的脊椎动物新种达 62 种之多,其中哺乳类新种 15 种,鸟类新种 27 种,爬行类新种 14 种,两栖类新种 8 种。其中鸟类模式标本,1940 年已增至 39 种。在这样一个小区域中采集发表的脊椎动物新种模式标本数量如此之多,在其他地方是很少见到的。挂墩因此被动物学家称之为“研究亚洲两栖爬行动物的钥匙”。根据现存资料,迄今采集发现于武夷山的动物新种(包括新亚种)的模式标本种类达 1000 多种,其中昆虫新种模式标本就达 779 种,脊椎动物新种模式标本近 100 种。武夷山地区作为大量动物新种模式标本的产地,说明它在动物分类学上的意义,也说明它在生物多样性保护上的价值。

6 生态系统类型多样

武夷山最高峰黄岗山海拔 2158 m,植被有明显的垂直分带现象。山下部为常绿阔叶林(1400 m 以下),占面积最广,向上依次出现针阔混交林(1100~1700 m)、针叶林[1200~1900 m,由南方铁杉(*Tsuga chinensis* var. *tchekiangensis*)、黄山松(*Pinus taiwanensis*)和柳杉(*Cryptomeria fortunei*)分别或混交组成],再上为山地矮曲林(1700~1990 m)、山地草甸(1800 m 以上至山顶)。大致在 1200 m 以下的低山和丘陵,大多数地方原生植被遭到破坏而被人工的马尾松(*Pinus massoniana*)林、杉木(*Cunninghamia lanceolata*)林、竹林所覆盖。在 550~1300 m 还有次生性的常绿落叶阔叶混交林^[2]。

虽然生态系统的划分国际上尚没有统一的标准,但在武夷山地区我们可以以植物群丛来划分陆地生态系统。各种植被类型所包含的群丛数如下:

常绿阔叶林	12
针阔叶混交林	4
针叶性林(马尾松林、杉木林或其混交林也包括在内)	11
常绿落叶阔叶混交林	2
竹林	14
山地矮曲林	8
山地草甸	2
总计	53

在 565 km² 的面积内,能看到 53 个植物组合,说明武夷山地区生态系统也是复杂多样的。

7 古树名木众多

到目前为止,在武夷山自然保护区内已发现古树、树王 40 株,计 24 个树种,隶属于 18 个科,24 个属。如南方红豆杉(高 34.2 m,胸围 476 cm,树龄约 980 年)是中国大陆至今发现的最大的南方红豆杉树王。银杏(高 38 m,胸围 524 cm,树龄约 500 年)、杉木(最大树高 32 m,胸围 298 cm,树龄 200~300 年,该地有近千株古杉木构成的群落)、钟萼木(一处两株,树高近 30 m,胸围 200 cm;另一处一株,树高 23 m,胸围 230 cm)、鹅掌楸(树高 24 m,胸围 215 cm)、香榧(*Torreya grandis*)(大约树高 28 m,胸围 670 cm)、柳杉(树高 42 m,胸围 665 cm,树龄在 1000 年以上)、檫树(*Sassafras tzumu*)(树高 34 m,胸围 466 cm,为福建省内发现的最高大的檫树王,1986 年遭雷击致死)等,还有树龄 880 年的桂花(*Osmanthus fragrans*)(五夷宫),树龄

- 9 McNeely J A. Conserving the World's Biological Diversity. IUCN, WRI, CI, WWF and World Bank, Washington, D C. 1990
- 10 UNEP: Global Biodiversity Assessment. Cambridge University Press, 1995

第16届国际植物学大会在美国召开

由国际生物科学联盟(IUBS)主办,美国密苏里植物园等单位承办,每6年举办一次的国际植物学大会于1999年8月1~7日在美国圣路易斯市(St. Louis, Missouri)召开。来自世界各国的5000多位代表(包括100多位来自中国大陆各大学、研究所和有关机构的专家和学者)参加了这届盛会。与往届大会基本相同,本届大会仍然分成不同的学科组进行活动,包括:1) 植物多样性:系统学和进化;2) 生态学、环境和保护;3) 结构、发育和细胞生物学;4) 遗传学和基因组学;5) 生理学和生物化学;6) 人类对植物的利用:经济植物学和生物技术。整个大会包括45分钟的大会报告(Plenary lecture)、由30分钟报告组成的主题讨论会(Keynote Symposium)和由20分钟报告组成的一般讨论会(General Symposia)。

尽管大会没有专门划分出“生物多样性或保护生物学”方面的学科组,但该领域的研究受到了普遍重视。在大会专门设立的以“走向下个千年(Toward the next millennium)”为主题的大会报告上,本届大会主席、密苏里植物园主任 Peter H Raven 教授作了题为“面临威胁的植物:何去何从?(Plants in Peril: What Should We Do?)”的大会报告。他从人类生存和发展的宏观角度上强调了植物多样性的重要性,同时以一系列具体的数据和事实展示出当前植物多样性所面临的严重威胁,呼吁全社会都应尽快行动起来关注和保护与人类生存息息相关的植物,并提出了行动步骤和措施。在大会设立的主题讨论会上,有不少涉及生物多样性研究、保护和利用等方面的议题。例如,在题为“生物多样性:过去、现在和未来(Biodiversity: Past, Present, Future)”的主题讨论会上,英国牛津大学的 R. May 对当前真核生物的物种数目及其未来的变化进行了预测,着重强调了国际合作在该领域研究中的重要作用;阿根廷 Buenos Aires 大学的 O. E. Sala 则生动地描绘了2100年全球生物多样性的远景,包括当时的气候、二氧化碳、氮的沉积、植被、土地的利用以及不同生物群落的敏感性等等。此外, J. Mayr, A. L. Scopel 和 P. R. Crane 还分别就哥伦比亚的生物多样性保护、温带地区生物多样性的现状以及被子植物的多样性及其历史作了介绍。在“植物保护生物学(Plant Conservation Biology)”主题讨论会上,澳大利亚 Kings Park & Botanical Garden 的 K. Dixon 分析了濒危物种的现状以及植物园在其保护中的作用;芬兰 Oulu 大学的 O. Savolainen 阐述了遗传变异在温带森林多样性中的重要作用,从而强调了遗传多样性保护在北方森林生态系统中的重要意义;美国华盛顿州立大学的 J. N. Thompson 则介绍了植物与其天敌之间的协同进化关系以及互惠共生在维持生物多样性中的价值。此外, A. Teshome 和 A. Gomez-Pompa 还分别介绍了作物遗传多样性在全球农业发展中的重要性以及民族传统在生物多样性保护中的积极意义。有关的主题讨论会还有“生物地理和多样性的式样”,“自然系统的破碎化”等。

此外,还有许多有关的专题讨论会被安排在第2和第6等学科组中。如“全球变化和生物多样性”,“生命实验室:服务于保护的植物园”,“Greater Antilles 的稀有和濒危植物”,“抢救植物多样性中心:IUCN 物种生存委员会植物计划”,“热带雨林的区系成分及其保护”,“海洋岛屿植物的保护生物学”,“重要经济植物的利用和保护”,“生境片段化和种群遗传结构”,“民族植物学和生物文化多样性的保护”等等。总之,“生物多样性及其保护”这一主题贯穿在本届大会的各个学科和领域的报告和讨论中,是未来植物学研究领域中的重要内容。而且,一个明显的趋势是,生物多样性研究已逐步从现象的描述走向机理的探讨,这大概是未来生物多样性研究的发展趋势。