

附录1 BEF-China树种丰富度实验样地树种组成

Appendix 1 Tree species composition in BEF-China tree diversity experiment

中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	中文代码 C_Code	数字代码 NO_Code	中文及数字代码 C_NO_Code	样地 Site
青榨槭	<i>Acer davidii</i>	榨	27	榨 27	A
米楮	<i>Castanopsis carlesii</i>	米	10	米 10	A
南酸枣	<i>Choerospondias axillaris</i>	南	4	南 4	A
细叶青冈	<i>Cyclobalanopsis myrsinifolia</i>	细	9	细 9	A
复羽叶栎树	<i>Koelreuteria bipinnata</i>	复	18	复 18	A
枫香	<i>Liquidambar formosana</i>	枫	6	枫 6	A
苦楝	<i>Melia azedarach</i>	楝	26	楝 26	A
蓝果树	<i>Nyssa sinensis</i>	蓝	20	蓝 20	A
麻栎	<i>Quercus acutissima</i>	麻	25	麻 25	A
白栎	<i>Quercus fabri</i>	白	24	白 24	A
短柄枹栎	<i>Quercus serrata</i>	短	8	短 8	A
盐肤木	<i>Rhus chinensis</i>	盐	23	盐 23	A
无患子	<i>Sapindus mukorossi</i>	无	19	无 19	A
山乌柏	<i>Sapium discolor</i>	山	22	山 22	A
乌柏	<i>Sapium sebiferum</i>	乌	21	乌 21	A
锥栗	<i>Castanea henryi</i>	锥	1	锥 1	A
甜楮	<i>Castanopsis eyrei</i>	甜	13	甜 13	A&B
苦楮	<i>Castanopsis sclerophylla</i>	苦	14	苦 14	A&B
香樟	<i>Cinnamomum camphora</i>	香	17	香 17	A&B
杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i>	杉	28	杉 28	A&B
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	青	11	青 11	A&B
虎皮楠	<i>Daphniphyllum oldhamii</i>	虎	16	虎 16	A&B
浙江柿	<i>Diospyros glaucifolia</i>	浙	15	浙 15	A&B
石栎	<i>Lithocarpus glaber</i>	石	12	石 12	A&B
马尾松	<i>Pinus massoniana</i>	马	2	马 2	A&B
木荷	<i>Schima superba</i>	木	3	木 3	A&B
臭椿	<i>Ailanthus altissima</i>	臭	29	臭 29	B
拟赤杨	<i>Alniphyllum fortunei</i>	拟	30	拟 30	B
光皮桦	<i>Betula luminifera</i>	光	31	光 31	B
丝栗栲	<i>Castanopsis fargesii</i>	丝	32	丝 32	B
黄果朴	<i>Celtis biondi</i>	朴	33	朴 33	B
华杜英	<i>Elaeocarpus chinensis</i>	华	34	华 34	B
秃瓣杜英	<i>Elaeocarpus glabripetalus</i>	秃	35	秃 35	B
薯豆	<i>Elaeocarpus japonicus</i>	豆	36	豆 36	B
山桐子	<i>Idesia polycarpa</i>	桐	37	桐 37	B
黄绒润楠	<i>Machilus grijsii</i>	黄	39	黄 39	B
红楠	<i>Machilus thunbergii</i>	红	40	红 40	B
华东楠	<i>Machilus leptophylla</i>	东	41	东 41	B
乳源木莲	<i>Manglietia yuyuanensis</i>	乳	42	乳 42	B
垂枝泡花树	<i>Meliosma flexuosa</i>	胡	38	胡 38	B
闽楠	<i>Phoebe bournei</i>	闽	43	闽 43	B
乌冈栎	<i>Quercus phillyraeoides</i>	乌	44	乌 44	B