

附录2 不同火后恢复时间森林边缘和森林内部观察到的鸟类物种及数量

Appendix 2 Bird species and numbers observed in forest edge (FE) and forest interior (FI) under different recovery time post-fire

物种	学名	火后 5 年 5 years post-fire			火后 15 年 15 years post-fire		火后 50 年 50 years post-fire		
		FE 1	FI 1	FI 2	FE 2	FI 3	FE 3	FI 4	FI 5
北长尾山雀	<i>Aegithalos caudatus</i>	0	0	3	0	0	0	0	6
树鹀	<i>Anthus hodgsoni</i>	1	6	0	0	1	2	0	1
厚嘴尾莺	<i>Arundinax aedon</i>	1	0	0	0	0	0	0	0
普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>	6	0	0	0	0	6	0	0
长尾雀	<i>Carpodacus sibiricus</i>	4	2	1	0	0	1	0	0
金翅雀	<i>Chloris sinica</i>	1	0	0	0	0	1	0	0
小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>	3	1	2	0	0	4	3	0
大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>	8	7	0	1	5	0	2	1
白背啄木鸟	<i>Dendrocopos leucotos</i>	1	0	0	0	0	0	0	0
大斑啄木鸟	<i>Dendrocopos major</i>	0	4	0	0	2	0	0	0
黑啄木鸟	<i>Dryocopus martius</i>	0	0	0	0	0	0	1	1
灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>	18	0	0	34	10	0	4	2
白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>	0	24	10	0	1	0	11	0
红喉姬鹀	<i>Ficedula parva</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>	0	0	3	0	0	9	7	0
白眉地鸫	<i>Geokichla sibirica</i>	0	0	1	0	1	1	1	0
红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>	8	0	0	2	7	1	0	0
红尾歌鸲	<i>Luscinia sibilans</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
白鹡鸰	<i>Motacilla alba</i>	1	0	0	1	0	0	0	0
灰鹡鸰	<i>Motacilla cinerea</i>	0	1	1	0	0	1	2	0
北灰鹡鸰	<i>Muscicapa dauurica</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
灰纹鹡鸰	<i>Muscicapa griseisticta</i>	0	1	2	0	0	0	0	0
欧亚大山雀	<i>Parus major</i>	0	2	0	0	4	6	0	8
北红尾鸲	<i>Phoenicurus auroreus</i>	3	1	1	2	1	0	2	1
极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>	0	0	0	0	0	0	0	1
褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	3	0	0	1	0	0	0	0
黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>	0	1	0	0	0	0	0	0
双斑绿柳莺	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	0	2	0	1	0	0	2	2
黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>	4	2	1	1	2	1	1	1
巨嘴柳莺	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	0	0	0	1	1	0	2	1
淡脚柳莺	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	0	0	2	0	1	0	0	2
褐头山雀	<i>Poecile montanus</i>	0	31	5	16	4	3	2	16
普通鸺	<i>Sitta europaea</i>	0	4	2	3	1	0	8	3
黄雀	<i>Spinus spinus</i>	2	3	1	2	2	2	0	0
山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>	1	2	2	0	0	0	2	0
红胁蓝尾鸲	<i>Tarsiger cyanurus</i>	0	4	2	2	1	0	4	1

李发扬, 李滢钰, 蒋文妮, 刘曙光, 霍超, 孙巧奇, 邹红菲 (2023) 火后恢复时间影响大兴安岭寒温带森林内部与边缘鸟类多样性. 生物多样性, 31, 22665. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022665>

物种	学名	火后 5 年 5 years post-fire			火后 15 年 15 years post-fire		火后 50 年 50 years post-fire		
		FE 1	FI 1	FI 2	FE 2	FI 3	FE 3	FI 4	FI 5
花尾榛鸡	<i>Tetrastes bonasia</i>	0	0	0	0	0	0	0	2
白腰草鹨	<i>Tringa ochropus</i>	3	0	0	0	0	1	0	0
白腹鸫	<i>Turdus pallidus</i>	0	0	0	0	0	0	3	0
戴胜	<i>Upupa epops</i>	1	0	0	0	0	0	0	0
红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>	0	1	0	0	0	0	0	0