

附录II 井冈山地区重要珍稀濒危木本植物分布及群落特征概况

Appendix II Distribution and community characteristics of some important rare and endangered woody plants in Mount Jinggangshan region

序号 No.	种 Species	分布及样地情况 Distribution and sample plot	伴生种 Accompanying species
1	资源冷杉 <i>Abies beshanzuensis</i> var. <i>ziyuanensis</i>	桃源洞大院香菇棚、老棚下、绵羊龙、牛石坪 高度1 m以上植株不足500株，南风面不足30株，坪水胡杨塔老树4株。 ①桃源洞牛石坪，海拔1,472 m，在1,600 m ² 样地中有70种（记为：70种/1,600 m ² ，下同），郁闭度0.75，资源冷杉63株，最高32 m，最大胸径67 cm，平均高15.8 m。 ②南风面东南坡，海拔1,752 m，69种/1,600 m ² ，郁闭度0.85，资源冷杉8株，最高25 m，最大胸径36 cm，平均高18.0 m。	①鹿角杜鹃(<i>Rhododendron latoucheae</i>)、华东山柳(<i>Clethra barbinervis</i>)、马银花(<i>Rhododendron ovatum</i>)、毛竹(<i>Phyllostachys heterocycla</i>)、柿树(<i>Diospyros kaki</i>)、杉木(<i>Cunninghamia lanceolata</i>)、窄基红马尾松(<i>Pinus massoniana</i>)、椤木石楠(<i>Photinia davidsoniae</i>)、窄基红皮马尾松(<i>Pinus massoniana</i> var. <i>attenuata</i>)、柃木(<i>Eurya japonica</i>)；瘤足蕨(<i>Plagiogyria adnata</i>)、肥肉草(<i>Fordiophyton fordii</i>)、兔儿风(<i>Ainsliaea fragrans</i>)。 ②毛柄连蕊茶(<i>Camellia fraterna</i>)、多脉青冈(<i>Cyclobalanopsis multinervis</i>)、南方铁杉(<i>Tsuga chinensis</i> var. <i>tchekiangensis</i>)、石木姜子(<i>Litsea elongata</i> var. <i>faberi</i>)、南方红豆杉(<i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i>)、假地枫皮(<i>Illicium jiadifengpi</i>)、厚叶红淡比(<i>Cleyera pachyphylla</i>)、红岩杜鹃(<i>Rhododendron haouf</i>)、水青冈、榕叶冬青(<i>Ilex ficoidea</i>)、黄丹木姜子(<i>Litsea elongata</i>)、窄基红褐柃；仙茅(<i>Curculigo orchiooides</i>)、宽叶薹草(<i>Carex siderosticta</i>)、井冈山寒竹(<i>Gelidocalamus stellatus</i>)。
2	马尾松 <i>Pinus massoniana</i>	纯林，多为次生性群落，分布龙市、拿山、湘州以东、黄坳、南风面海拔800 m以下山脊和陡坡。郁闭度0.4–0.6。 天然混交林，属人为干扰后的残存天然次生林，全区900 m以下丘陵、山地。	青冈(<i>Cyclobalanopsis glauca</i>)、苦槠(<i>Castanopsis sclerophylla</i>)、木荷(<i>Schima superba</i>)、枫香(<i>Liquidambar formosana</i>)；櫟木(<i>Loropetalum chinense</i>)、柃木、山胡椒(<i>Lindera glauca</i>)；狗脊(<i>Woodwardia japonica</i>)、芒萁(<i>Dicranopteris dichotoma</i>)、里白(<i>Diplopterygium glaucum</i>)。
3	台湾松 <i>Pinus taiwanensis</i>	单优林分布在黄洋界、双马石、五指峰、严岭嶂、南风面等海拔900–1,560 m土层较薄的山坡、山脊。 针阔混交林分布在全区海拔840–1,400 m土层较厚的山地和沟谷上源。	①马银花、圆锥绣球(<i>Hydrangea paniculata</i>)；交让木(<i>Daphniphyllum macropodium</i>)、蝶花荚蒾(<i>Viburnum hanceanum</i>)、山胡椒(<i>Lindera glauca</i>)、柃木、鹿角杜鹃(<i>Rhododendron latoucheae</i>)；狗脊、里白、多种薹草。 ②甜槠、红楠(<i>Machilus thunbergii</i>)、银木荷(<i>Schima argentea</i>)、杉木、马尾松、多脉青冈、交让木(<i>Daphniphyllum macropodium</i>)、小叶青冈0.75，台湾松13株，最高21 m，最大胸径65 cm，(<i>Cyclobalanopsis myrsinifolia</i>)、伯乐树；狗脊、金花树(<i>Blastus dunnianus</i>)、朱砂根(<i>Ardisia crenata</i>)。
4	杉木 <i>Cunninghamia lanceolata</i>	天然单优林，五指峰南坡海拔800–1,000 m的山坡，湘州东部有较大面积。 ①五指山北坡，海拔850 m，106种/1,600 m ² ，郁闭度0.7–0.8，杉木87株，最高27 m，最大胸径70 cm，平均高18.8 m。 针阔混交林，五指山、河西垅、小溪洞左江上游，荆竹山、利洲、严岭嶂、大井、南风面东源、南坡等地海拔600–1,450 m阳坡。 ②五指山北坡，海拔950 m，103种/1,600 m ² ，叶青冈、细枝柃(<i>Eurya loquaiana</i>)、赤杨叶(<i>Alniphyllum fortunei</i>)；襄荷(<i>Zingiber mioga</i>)、狗脊、郁闭度0.7–0.8，杉木37株，最高24 m，最大胸径67 cm，平均高16.9 m。 ③五指峰，海拔1,411 m，63种/1,600 m ² ，杉木16株，最高25 m，最大胸径71 cm，平均高19.5 m。	①细枝柃(<i>Eurya loquaiana</i>)、深山含笑(<i>Michelia maudiae</i>)、黄丹木姜子、格药柃(<i>Eurya muricata</i>)、罗浮锥(<i>Castanopsis fabri</i>)、硬叶冬青(<i>Ilex fuscipes</i>)、赤杨叶(<i>Alniphyllum fortunei</i>)；襄荷(<i>Zingiber mioga</i>)、狗脊、杜茎山(<i>Maesa japonica</i>)、金花树。 ②甜槠、日本杜英(<i>Elaeocarpus japonicus</i>)、云山青冈(<i>Cyclobalanopsis sessilifolia</i>)、深山含笑(<i>Michelia maudiae</i>)、赤杨叶(<i>Alniphyllum fortunei</i>)；腺萼马银花(<i>Rhododendron bachii</i>)、硬叶冬青(<i>Ilex fuscipes</i>)、红楠(<i>Machilus thunbergii</i>)、马银花、黄丹木姜子(<i>Litsea elongata</i>)、小叶青冈、细枝柃(<i>Eurya loquaiana</i>)、褐毛杜英(<i>Elaeocarpus duclouxii</i>)；杉木37株，最高24 m，最大胸径67 cm，平均高16.9 m。 ③黄杨(<i>Buxus bodinieri</i>)、多脉青冈、尖叶四照花(<i>Dendrobenthamia angustata</i>)、格药柃、南方红豆杉、青榨槭(<i>Acer davidi</i>)、福建假卫矛(<i>Microtropis fokienensis</i>)、蓝果树(<i>Nyssa sinensis</i>)、秃柄连蕊茶(<i>Camellia dubia</i>)；鳞毛蕨(<i>Dryopteris chinensis</i>)、狗骨柴(<i>Diplosora dubia</i>)。
5	福建柏 <i>Fokienia hodginsii</i>	五指峰、笔架山、南风面、桃源洞(牛角垄、策源洪水江、暗垄尾)海拔1,200 m以上中山坡地，最优胜。 ①笔架山，海拔1,378 m，81种/1,600 m ² ，郁闭度0.85，福建柏32株，最高26 m，最大胸径84 cm，平均高15.7 m。 ②笔架山，海拔1,395 m，132种/1,600 m ² ，郁闭度0.80，福建柏43株，最高10 m，最大胸径53 cm，平均高4.43 m。	①甜槠、小叶青冈、台湾冬青(<i>Ilex formosana</i>)、腺萼马银花、猴头杜鹃(<i>Rhododendron simiarum</i>)、香桂(<i>Cinnamomum subavenium</i>)、窄基红褐柃、马银花、鹿角杜鹃、日本杜英、美丽新木姜子(<i>Neolitsea pulchella</i>)；薹草、狗脊、光叶铁仔(<i>Myrsine stolonifera</i>)。 ②猴头杜鹃(<i>Rhododendron simiarum</i>)、多脉青冈、白豆杉、南方铁杉、台湾松、小叶青冈、厚叶红淡比(<i>Cleyera pachyphylla</i>)、凹叶冬青(<i>Ilex championii</i>)、金叶含笑(<i>Michelia foveolata</i>)、毛柄连蕊茶(<i>Camellia fraterna</i>)、合轴荚蒾(<i>Viburnum sympodiale</i>)、交让木、香桂(<i>Cinnamomum subavenium</i>)；灯台兔儿风(<i>Ainsliaea macroclinidioides</i>)、东南长蒴苣苔(<i>Didymocarpus hancei</i>)、毛蕨(<i>Cyclosorus interruptus</i>)、掌叶覆盆子(<i>Rubus chingii</i>)、蔓赤车(<i>Pellionia scabra</i>)。
6	竹柏 <i>Nageia nagi</i>	林中散生，偶见。仅井冈山下七乡洪坪村附近丘陵、河谷存约1,000 m ² 天然林，现已破碎化。 ①下七乡，海拔210–280 m，16种/200 m ² ，竹柏7株，鳞始蕨(<i>Lindsaea odorata</i>)、薹草(<i>Carex sp.</i>)。最高18 m，胸径48 cm，1株高12 m，5株高1–4 m。	①人工种植的毛竹(<i>Phyllostachys heterocycla</i>)和油茶(<i>Camellia oleifera</i>)、油桐(<i>Vernicia fordii</i>)；櫟木、桃叶石楠(<i>Photinia prunifolia</i>)；

附录II(续) Appendix II (continued)

序号 No.	种 Species	分布及样地情况 Distribution and sample plot	伴生种 Accompanying species
7	南方红豆杉 <i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i>	林中散生, 常见。小面积极分布于上井、大井、老井冈、行洲下角岽、下庄、七溪岭狗熊冲、南风面、桃源洞西坑、梨树洲下洲海拔560–1,700 m山地、沟谷溪旁。 ①大井风水林, 海拔950 m, 125种/1,600 m ² , 郁闭度0.80, 南方红豆杉47株, 最高30 m, 最大直径95 cm, 6株20 m以上大树平均高23.6 m, 总平均高8.8 m。	①甜槠、银木荷(<i>Schima argentea</i>)、缺萼枫香(<i>Liquidambar acalycina</i>)、油茶、红楠、鹿角杜鹃、台湾松、吴茱萸五加(<i>Acanthopanax evodiaefolius</i>)、乌药(<i>Lindera aggregata</i>)、山橿(<i>Lindera reflexa</i>)、杉木、赤杨叶、毛竹、榕叶冬青; 里白、光叶山矾(<i>Symplocos lancifolia</i>)、黄
8	白豆杉 <i>Pseudotaxus chienii</i>	笔架山、五指峰、河西垅轿子石林中, 偶见。 ①笔架山, 海拔1,395 m, 132种/1,600 m ² , 郁闭度0.80, 白豆杉86株, 最高5.6 m, 最大胸径33 cm, 平均高2.9 m。	①猴头杜鹃、多脉青冈、南方铁杉、福建柏、台湾松、小叶青冈、厚叶红淡比、凹叶冬青、金叶含笑(<i>Michelia foveolata</i>)、毛柄连蕊茶、合轴荚蒾、交让木、香桂; 灯台兔儿风(<i>Ainsliaea macroclinidioides</i>)、东南长蒴苣苔、毛蕨、掌叶覆盆子、蔓赤车。
9	穗花杉 <i>Amentotaxus argotaenia</i>	南风面、湘州锡坪、七溪岭、桃源洞牛角垄等 ①南风面西北坡, 海拔1,635 m, 81种/1,600 m ² , 郁闭度0.8, 穗花杉97株, 最高16 m, 最大胸径49 cm, 平均高度5.2 m。 ②湘州锡坪沟, 海拔770 m, 94种/1,600 m ² 样地, 郁闭度0.8, 穗花杉45株, 最高9 m, 最大胸径76 cm, 平均高3.8 m。	①水青冈、伯乐树; 灰柯(<i>Lithocarpus henryi</i>)、多脉青冈、枫香、交让木、杨桐(<i>Adinandra millettii</i>); 木姜子(<i>Litsea pungens</i>); 柳叶绣球(<i>Hydrangea stenophylla</i>)、鳞毛蕨、蔓赤车(<i>Pellonia scabra</i>)。 ②深山含笑、细枝柃、赤杨叶、栓叶安息香(<i>Styrax suberifolius</i>)、皂莢(<i>Gleditsia sinensis</i>)、日本杜英、云山青冈、野生茶(<i>Camellia sinensis</i>)、马银花、伯乐树、细叶连蕊茶(<i>Camellia parviflora</i>); 宽叶薹草、赤车地, 郁闭度0.8, 穗花杉45株, 最高9 m, 最大胸径76 cm, 平均高3.8 m。
10	华榛 <i>Corylus chinensis</i>	荆竹山、双溪口、水口、桃源洞林中散生, 偶见。 ①桃源洞帽子窝海拔1,150 m存数公顷混交林。 ①源洞帽子窝, 海拔1,150 m, 85种/2,000 m ² , 郁闭度0.8, 华榛31株, 最高40 m, 最大胸径116 cm, 平均高21.2 m。	①杉木、多脉青冈、小叶青冈、灯台树(<i>Cornus controversa</i>)、旌节花(<i>Stachyurus chinensis</i>)、水丝梨(<i>Syccopsis sinensis</i>)、油茶、窄基红褐柃、尖叶四照花、格药柃、黄丹木姜子、红枝柴(<i>Meliosma oldhamii</i>); 星蕨(<i>Microsorium punctatum</i>)、冷水花(<i>Pilea cadierei</i>)、金线草(<i>Antennorion filiforme</i>)、箬竹、楼梯草(<i>Elatostema umbellatum</i>)、盾蕨(<i>Neolepisorus ovatus</i>)。
11	黄山木兰 <i>Magnolia cylindrica</i>	坪水山、荆竹山、五指峰、南风面海拔900–1,700 m针阔叶常绿林中散生, 偶见。 ①五指峰, 海拔950 m, 5种乔灌木/100 m ² , 黄山木兰1株, 高10 m, 胸径24 cm。 ②荆竹山山顶, 海拔1,600 m, 58种/1,600 m ² , 黄山木兰18株, 最高8 m, 最大胸径36 cm, 平均高6.6 m。	①厚叶冬青、山橿、大果卫矛(<i>Euonymus myrianthus</i>)、秃梗连蕊茶(<i>Camellia dubia</i>)。 ②井冈山杜鹃、秃梗连蕊茶、多脉青冈、交让木、云锦杜鹃(<i>Rhododendron fortunei</i>)、合轴荚蒾、鹿角杜鹃、雷公鹅耳枥(<i>Carpinus viminea</i>)、黄山木兰、格药柃、石灰花楸(<i>Sorbus folgneri</i>)、显脉冬青(<i>Ilex editicostata</i>); 井岗寒竹、高秆珍珠茅(<i>Scleria terrestris</i>)、薹草、猕猴桃(<i>Actinidia chinensis</i>)。
12	观光木 <i>Tsoongiodendron odorum</i>	湘州拱桥、河西垅380–700 m林中散生、稀少。 ①湘州河谷, 海拔384 m, 104种/1,600 m ² , 郁闭度0.85、观光木3株, 最高23 m, 最大胸径59 cm, 平均高9.0 m。	①鹿角锥(<i>Castanopsis lamontii</i>)、钩锥(<i>Castanopsis tibetana</i>)、密花山矾(<i>Symplocos congesta</i>)、枫香、罗浮柿(<i>Diospyros morrisiana</i>)、南酸枣(<i>Choerospondias axillaris</i>); 狗脊、江南卷柏(<i>Selaginella moellendorffii</i>)、草珊瑚(<i>Sarcandra glabra</i>)。
13	闽楠 <i>Phoebe bournei</i>	河西垅、下庄村、行洲竹头坪、桃源洞老庵里低山、沟谷及村落风水林, 常见。 ①河西垅石洞, 海拔675 m, 109种/1600 m ² , 郁闭度0.85, 闽楠35株, 最高10m, 最大胸径37 cm, 平均高5.9 m。 ②行洲竹头坪风水林, 海拔420 m, 16种/800 m ² 样地, 闽楠9株, 最高24 m, , 最大胸径65 cm, 平均高22.2 m。	①钩锥、猴欢喜(<i>Sloanea sinensis</i>)、鹿角锥、乐昌含笑(<i>Michelia chapensis</i>)、罗浮槭(<i>Acer fabri</i>)、缺萼枫香、台湾冬青、枫香、粗糠柴(<i>Mallotus philippensis</i>)、木犀(<i>Osmanthus fragrans</i>)、宜昌润楠(<i>Machilus ichangensis</i>); 线蕨(<i>Colysis elliptica</i>)、杜茎山(<i>Maesa japonica</i>)、野茫茫(<i>Boehmeria siamensis</i>)。 ②苦槠、椤木石楠、南方红豆杉、野桂花(<i>Osmanthus yunnanensis</i>)、枳椇(<i>Hovenia acerba</i>)、樟树(<i>Cinnamomum camphora</i>)、臭椿(<i>Ailanthus altissima</i>)、无患子(<i>Sapindus saponaria</i>)。
14	长柄双花木	林中散生, 常见。龙市东上乡有小面积群落。 ①市东上乡七里船沟谷, 海拔560 m, 97种/1,600 m ² , 郁闭度0.45, 长柄双花木111株, 最高7 m, 最大胸径26 cm, 平均高3.7 m。	①甜槠、赤杨叶、杉木、尖叶四照花、四川山矾(<i>Symplocos setchuensis</i>)、毛竹、树参(<i>Dendropanax dentiger</i>)、厚叶红山茶(<i>Camellia crassissima</i>)、日本杜英、櫟木、凤凰润楠(<i>Machilus phoenicis</i>); 里白、狗脊、乌药、莎草(<i>Cyperus rotundus</i>)、大竹节(<i>Indosasa crassifolia</i>)。
15	水青冈 <i>Disanthus cercidifolius</i> subsp. <i>longipes</i>	梨树洲、松毛埢、游击洞、荆竹山、老井冈、湘州锡坪谷、南风面高兴村、桃源洞大丫口下横岗等700–1,400 m林中, 丰盛。 ①锡坪沟, 海拔830, 74种/1,600 m ² , 郁闭度0.8, 水青冈8株, 最高8 m, 最大胸径64 cm, 平均高6.8 m。 ②黄洋界电塔后山, 海拔1,340 m, 98种/1,600 m ² , 郁闭度0.8, 水青冈8株, 最高12 m, 最大胸径55 cm, 平均高10.0 m。 ③南风面高兴村, 海拔960 m, 57种乔灌木/800 m ² , 郁闭度0.85, 乔木第一层15–25 m, 仅有水青冈和赤杨叶。	①甜槠、厚叶折柄茶(<i>Hartia crassifolia</i>)、鹿角杜鹃、马银花、日本杜英、黄丹木姜子、米心水青冈(<i>Fagus longipetiolata</i>)、云山青冈、美丽新木姜子; 里白、金花树、朱砂根、狗脊。 ②多脉青冈、天目紫茎(<i>Stewartia gemmata</i>)、青榨槭、细尖连蕊茶(<i>Camellia parvifusipida</i>)、猴头杜鹃、雷公鹅耳枥、鹿角杜鹃、马银花、厚叶红淡比、香桂、黄丹木姜子; 华东瘤足蕨(<i>Plagiogyria japonica</i>)、莎草、光里白(<i>Diplopterygium laevissimum</i>)。 ③赤杨叶、细叶青冈(<i>Cyclobalanopsis gracilis</i>)、红楠、马银花、香港四照花(<i>Dendrobenthamia hongkongensis</i>)、香桂; 淡竹叶(<i>Lophatherum gracile</i>)、鸡血藤(<i>Millettia dielsiana</i>)、南蛇藤(<i>Celastrus orbiculatus</i>)、三叶木通(<i>Akebia trifoliata</i>)等。

附录II(续) Appendix II (continued)

序号 No.	种 Species	分布及样地情况 Distribution and sample plot	伴生种 Accompanying species
16	毛红椿 <i>Toona ciliata</i> var. <i>pubescens</i>	龙潭、河西垄、桃源洞狮子岩林中散生, 常见。①龙潭, 海拔760 m, 32种/300 m ² , 郁闭度0.35, <i>pannosa</i> 、山矾(<i>Symplocos sumuntia</i>)、腺蜡瓣花(<i>Corylopsis glandulifera</i>)、红楠、罗浮槭、青冈、尖叶四照花、黄丹木姜子; 狹翅铁角蕨(<i>Asplenium wrightii</i>)、少花柏拉木(<i>Blastus pauciflorus</i>)、大竹节、常春藤(<i>Hedera nepalensis</i>)。	
17	伯乐树 <i>Bretschneidera sinensis</i>	龙潭、湘州锡坪、石溪、石垅坪、长古岭大丫口、南风面、桃源洞黑潭林中散生, 常见。 ①南风面西北坡, 海拔1,635 m, 81种/1,600 m ² , ②穗花杉、深山含笑、细枝柃、赤杨叶、栓叶安息香、皂荚、日本杜英、云山青冈、野生茶、马银花、细叶连蕊茶; 宽叶薹草(<i>Carex siderosticta</i>)、赤车(<i>Pellionia radicans</i>)、蔓赤车。 ②湘州锡坪沟, 海拔770 m, 94种/1,600 m ² 样地, 郁闭度0.8, 伯乐树4株, 最高23 m, 最大胸径68 cm, 平均高度21.5 m。 ③湘州锡坪沟, 海拔770 m, 94种/1,600 m ² 样地, 郁闭度0.8, 伯乐树4株, 最高17m, 最大胸径56 cm, 平均高9.5 m。	
18	马醉木 <i>Pieris japonica</i>	林中, 优胜。 ①南风面西北坡, 海拔1,737 m, 61种/1,600 m ² , 郁闭度0.8, 马醉木49株, 最高21 m, 最大胸径45 cm, 平均高8.5 m。	①南方铁杉、猴头杜鹃、杨桐、凹叶冬青、厚叶红淡比、银木荷、香丽新木姜子、日本杜英、鹅耳枥(<i>Carpinus turczaninowii</i>); 大竹节、扁枝越桔(<i>Vaccinium japonicum</i>)、朱砂根、瘤贯众(<i>Cyrtomium caryotideum</i>)、华东瘤足蕨(<i>Plagiogyria japonica</i>)。
19	井冈山杜鹃 <i>Rhododendron jinggangshanicum</i>	大井水口、龙潭、桃源洞林中散生, 常见。五指山西北坡、坪水山、荆竹山、南风面海拔900–1,700 m山顶或山坡分布有小面积群落。 ①荆竹山山顶, 海拔1,600 m, 58种/1,600 m ² , 井冈山杜鹃37株, 最高8 m, 最大胸径44 cm, 平均高4.4 m。	①秃梗连蕊茶(<i>Camellia dubia</i>)、多脉青冈、交让木、云锦杜鹃、合轴芋蓬、鹿角杜鹃、雷公鹅耳枥、黄山木兰、格药柃、石灰花楸、显脉冬青; 井岗寒竹、高杆珍珠茅、薹草、猕猴桃。
20	江西杜鹃 <i>Rhododendron kiangsiense</i>	大井水口、五指峰、小井、行洲海拔500–1,400 m林中散生, 常见。 ①黄洋界、八面山、桐岗沟谷落石堆海拔1,330–1,400 m小面积灌丛群落。	①青江藤(<i>Celastrus hindsii</i>)、雀梅藤(<i>Sageretia thea</i>)、多花勾儿茶(<i>Berchemia floribunda</i>)、蜡瓣花(<i>Corylopsis sinensis</i>)、櫟木、鲫鱼胆(<i>Maesa perlaria</i>)、山苍子(<i>Litsea cubeba</i>)、山菅兰(<i>Dianella ensifolia</i>)、乌毛蕨(<i>Blechnum orientale</i>)、马银花。
21	银钟花 <i>Halesia macgregorii</i>	龙潭、湘州锡坪、桃源洞黄茅奇山脊林中散生, ①龙潭, 海拔875 m, 40种/300 m ² , 郁闭度0.70, 银钟花5株, 最高10 m, 最大胸径29 cm, 平均高8.8 m。 ②龙潭, 海拔810 m, 43种/300 m ² , 郁闭度0.70, 银钟花2株, 最高8 m, 最大胸径31 cm, 平均高7.5 m。 ③湘洲锡萍风水林, 海拔637 m, 89种/1,600 m ² , 郁闭度0.80, 银钟花5株, 最高17m, 最大胸径23 cm, 平均度11.0 m。	①青冈、钩锥、日本杜英、深山含笑、黄丹木姜子、甜槠、马银花、包果柯(<i>Lithocarpus cleistocarpus</i>)、红楠、五裂槭(<i>Acer oliverianum</i>); 美丽新木姜子、榕叶冬青、五裂槭、黄丹木姜子; 金花树、蔓赤车。 ②罗浮锥、云山青冈、厚皮香(<i>Ternstroemia gymnanthera</i>)、甜槠、华南桂(<i>Cinnamomum austrosinense</i>)、金叶含笑、香桂、台湾冬青、日本杜英; 树参、山血丹(<i>Ardisia punctata</i>)、淡竹叶。
22	香果树 <i>Emmenopterys henryi</i>	海拔600–1,200 m林中散生, 偶见。湘洲寨子 ①风面东南坡谷, 海拔1,000 m, 乔木层20种/800 m ² , 郁闭度0.9, 乔木第一层高18 m, 仅有香果树和青榨槭。	①青榨槭、交让木、浙江红山茶(<i>Camellia Chekiangoleosa</i>); 箬竹、腊里、堆子坑、上茶园和南风面等地有较集中的莲绣球(<i>Hydrangea strigosa</i>)、冷水花、虎耳草(<i>Saxifraga stolonifera</i>)、黑鳞耳蕨(<i>Poystichum makinoi</i>)、蕗蕨(<i>Mecodium badium</i>)。